







NATIONAL INSTITUTES OF NATURAL SCIENCES

# IMS [Institute for Molecular Science]

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構

分子科学研究所





## 分子と対話し、その豊かな知恵を活かす

分子は物質の基本構成単位であり、物質の示す性質や機能を担う根源です。物質の機能を深く知り、これを高度に利用するためには、原子・分子レベルで物質を理解すること、さらには、分子から構成されるシステムの階層を超えた機能を理解することが不可欠です。分子科学は、分子の持つ特性と機能を物理及び化学的な手法で体系づけようとする物理学と化学の境界領域の科学で、その対象は個々の分子から宇宙・生命科学まで広い範囲にわたります。分子科学研究所は設立以来40年以上にわたり、研究の中核拠点として、実験研究と理論研究の両面から我が国の分子科学分野を先導する研究に関与してきました。その背景には、関連研究分野の研究者コミュニティーの支持が不可欠であり、総合的な共同利用研究所としての機能を維持するには、今後も関連研究者の共同研究の場、研究者の交流や国際学術交流の場を提供すること、さらには、専門的な基盤に立つ高度な研究者の養成のミッションを継続して、国際的な研究センターとしての機能を維持し続けることが分子科学研究所の使命です。

現在の分子科学研究所は、光分子科学研究領域、物質分子科学研究領域、生命・錯体分子科学研究領域そして、理論・計算分子科学研究領域の4研究領域と、それらを繋ぐ協奏分子システム研究センターとメソスコピック計測研究センターを加えて4つの領域と2つの研究センターが研究基盤を構成しています。さらに極端紫外光研究施設(UVSOR)、計算科学研究センター、機器センター、装置開発室などの研究施設を擁し、分子の構造と反応そして機能に関する基礎研究を推進しています。新たな計測手法の開発と普及は大事なミッションです。自然科学研究機構の生命創成探求センターとも協力して、分子科学研究所は、学術研究の基本を踏まえ、科学分野を先導する研究を推進し、新しい科学領域を拓く挑戦を続けています。

分子科学の世界的なCenter of Excellenceとして、分子科学研究所は世界の人材循環の要として、これからも発展し続けることを目指します。


Molecule is a fundamental unit of materials, origin to form their properties and functions. Molecular functions are in variety of systems, from individual molecules to molecules in the cosmos, in biology systems and in man-made devices. To understand the molecular functions and to highly utilize the systems, Molecular Science now requires bold strides across chemistry, materials and biological sciences.

IMS has served as a center of excellence to lead molecular science activities over four decades long. With the support from the community of related research fields, IMS will continue standing as a comprehensive open-use laboratory, providing a place of joint-research, exchanging global researchers and nurturing young scientists.

IMS has six cores to shape its research activities: Department of Theoretical and Computational Molecular Science, Photo-Molecular Science, Materials Molecular Science, and Life and Coordination-Complex Molecular Science; Research Center of Integrative Molecular Systems is an interdisciplinary playground exploring molecular-hierarchy systems; Center of Mesoscopic Science propels methodological and functional studies of molecular systems. IMS houses open-use research facilities including UVSOR to promote discovery of molecular behaviors. Our challenge continues. Exploratory Research Center on Life and Living Systems, integrating knowledge of three institutes of NIBB, NIPS and IMS, on the quest of the secret keys to life and living.


Keeping its foundation on basic research, IMS will never stop being at the forefront of future Molecular Science.

Institute for Molecular Science  
Director General KAWAI, Maki



## 新しい科学領域を拓く中核的研究拠点として —

Core research sites to grow new scientific fields



分子科学における最先端の研究を  
推進しています。 P.5

We promote frontier research in  
the field of Molecular Science.

## 分子科学研究所とは What is IMS?

## 大学共同利用機関として —

Inter-University Research Institute



大型研究施設や測定装置等を国内外の  
大学研究者に広く利用いただいている。 P.39

We offer open access to researchers from Japan and  
abroad to both our facilities and equipment.

## 若手研究者の育成の場として —

Fostering of Young Researchers



学生の教育を行い、明日の分子科学を  
担っていく人材を育成しています。 P.44

We commit ourselves to educating students and fostering  
the next generation of Molecular Scientists.



## 組織図 Organization

自然科学研究機構  
National Institutes of Natural Sciences

- 国立天文台  
National Astronomical Observatory of Japan
- 核融合科学研究所  
National Institute for Fusion Science
- 基礎生物学研究所  
National Institute for Basic Biology
- 生理学研究所  
National Institute for Physiological Sciences
- 分子科学研究所**  
Institute for Molecular Science



理論・計算分子科学研究領域  
Department of Theoretical and Computational Molecular Science

光分子科学研究領域  
Department of Photo-Molecular Science

物質分子科学研究領域  
Department of Materials Molecular Science

生命・錯体分子科学研究領域  
Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science

協奏分子システム研究センター  
Research Center of Integrative Molecular Systems

メソスコピック計測研究センター  
Center for Mesoscopic Sciences

特別研究部門  
Division of Advanced Molecular Science

社会連携研究部門  
Division of Research Innovation and Collaboration

極端紫外光研究施設  
UVSOR Synchrotron Facility

機器センター  
Instrument Center

装置開発室  
Equipment Development Center

計算科学研究センター(岡崎共通研究施設)  
Research Center for Computational Science (Okazaki Research Facilities)

安全衛生管理室  
Safety Office

生命創成探求センター  
Exploratory Research Center on Life and Living Systems

新分野創成センター  
Center for Novel Science Initiatives

アストロバイオロジーセンター  
Astrobiology Center



分子科学研究所の研究職員は研究領域あるいは特別研究部門、社会連携研究部門、研究施設に所属しています。技術課に属する技術職員は主に研究施設に配置されています。安全衛生管理や広報・研究者支援・国際化などの活動は、専任職員を配置して、組織化しています。また、同じく大学共同利用機関法人自然科学研究機構に属する基礎生物学研究所、生理学研究所とともに、岡崎共通研究施設を設置しています。平成30年には自然科学研究機構に生命創成探求センターが発足し、岡崎3研究機関がその運営に協力しています。岡崎共通研究施設のうち、計算科学研究センターに属する2研究グループ、及び生命創成探求センターに属する4研究グループは、分子科学研究所に併任しており、分子科学研究所の一員として等しく大学等の研究者の共同研究・共同利用を推進・支援する体制をとっています。

Each research staff of Institute for Molecular Science (IMS) belongs to a department or to a research facility. Majority of the technical staffs are assigned to Research Facilities. Supporting activities such as safety, public affairs, international affairs, and so forth are organized by dedicated staffs. We also have facilities (including Research Center for Computational Science, RCCS) shared with two other institutes (National Institute for Basic Biology, National Institute for Physiological Sciences) in the same campus. In 2018, Exploratory Research Center on Life and Living Systems has been launched as a new Research Center belonging to National Institutes of Natural Sciences, with which three Okazaki Research Institutes cooperate. Some research groups in these Centers are appointed also as those of IMS, and promote and support collaborations with researchers in universities or other research organizations as well.

## 沿革 History

昭和50年4月	分子科学研究所創設(昭和50年4月22日) 機器センター設置(～平成9年3月) 装置開発室設置	Apr. 1975	Institute for Molecular Science founded (April 22, 1975) Instrument Center established (-March 1997) Equipment Development Center established
昭和51年5月	化学試料室設置(～平成9年3月)	May 1976	Chemical Materials Center established (-March 1997)
昭和52年4月	電子計算機センター設置(～平成12年3月) 極低温センター設置(～平成9年3月)	Apr. 1977	Computer Center established (-March 2000) Low-Temperature Center established (-March 1997)
昭和56年4月	岡崎国立共同研究機構創設(～平成16年3月)	Apr. 1981	Okazaki National Research Institutes (ONRI) founded (-March 2004)
昭和57年4月	極端紫外光実験施設設置	Apr. 1982	UVSOR Facility established
昭和59年4月	錯体化学実験施設設置(～平成19年3月)	Apr. 1984	Coordination Chemistry Laboratories established (-March 2007)
昭和63年10月	総合研究大学院大学開学 数物科学研究科(～平成16年3月、以降は 物理科学研究科) 構造分子科学専攻、機能分子科学専攻	Oct. 1988	Graduate University of Advanced Studies founded School of Mathematical and Physical Science, Department of Structural Molecular Science/Department of Functional Molecular Science established
平成9年4月	分子制御レーザー開発研究センター設置 (～平成29年3月) 分子物質開発研究センター設置(～平成14年3月)	Apr. 1997	Laser Research Center for Molecular Science established (-March 2017) Research Center for Molecular Materials established (-March 2002)
平成12年4月	共通研究施設設置(岡崎統合バイオサイエンス センター(～平成30年3月)、計算科学研究センター)	Apr. 2000	Research facilities (Okazaki Institute for Integrative Bioscience (-March 2018) and Research Center for Computational Science) established
平成14年4月	分子スケールナノサイエンスセンター設置 (～平成25年3月)	Apr. 2002	Research Center for Molecular-scale Nanoscience established
平成16年4月	大学共同利用機関法人自然科学研究機構創設	Apr. 2004	National Institutes of Natural Sciences founded as one of the four Inter-University Research Institute Corporations
平成19年4月	4研究領域に研究組織再編、機器センター再設置	Apr. 2007	7 Departments reorganized to 4 Departments Instrument Center re-established
平成25年4月	協奏分子システム研究センター設置	Apr. 2013	Research Center of Integrative Molecular Systems established
平成29年4月	メソスコピック計測研究センター設置	Apr. 2017	Center for Mesoscopic Sciences established
平成30年4月	生命創成探求センター(自然科学研究機構)設置	Apr. 2018	Exploratory Research Center on Life and Living Systems established

## 人員・予算 Personnel and Budget

人員 (令和2年4月1日現在)		(単位:人)							平成31年度/ 令和元年度決算額		平成31年度/ 令和元年度外部資金受入状況 <sup>*1</sup>		(単位:千円)	
区分	所長	教授	准教授	主任研究員	助教	小計	技術職員	合計	区分	決算額	区分	合計	合計	
所 長	1	—	—	—	—	1	—	1	人 件 費	1,077,605	科学研究費助成事業等 <sup>*2</sup>	375,452		
研究 領 域	—	13(8)	11(6)	—	24	48(14)	—	48(14)	運営費・設備費	2,363,342	共同研究(民間企業からの受入を含む)	30,904		
研究 施 設	—	4	5	1	13	23	—	23	施 設 費	602,790	戦略的創造研究推進事業等(JST)	232,668		
技 術 課	—	—	—	—	—	—	36	36	合 計	4,043,737	科学技術振興調整費等(文科省)	554,664		
合 計	1	17(8)	16(6)	1	37	72(14)	36	108(14)	(単位:千円)		その他	115,463		

\* ( )内は客員及び兼任の合計で外数。※ 年俸制職員及び機構内併任は現員数に含む。

※ 休職者は現員数に含む。

\* 1 左記決算額に含む。 \* 2 間接経費を含む。

\* 3 受託事業及び間接経費を含む。共通研究施設を除く。

Staff (as of April, 2020)		Budget (FY 2019) (Thousand yen)		Grants-in-Aid (FY 2019)*		(Thousand yen)	
Director General	1	Personnel	1,077,605	Grant-in-Aid Scientific Research(KAKENHI, MEXT and JSPS)**	375,452		
Professors	17(8)			Joint Research	30,904		
Associate Professors	16(6)	Research	2,363,342	CREST, PRESTO, others(JST)***	232,668		
Senior Researcher	1			Special Coordination Funds for Promoting Science and Technology from MEXT***	554,664		
Assistant Professors	37	Facility	602,790	Others***	115,463		
Technical Staff	36			Total	1,309,151		
Total	108(14)	Total	4,043,737				

\* Included in the left table \*\* Including indirect expenses

\*\*\* Including contract-based research and indirect expenses

# 「分子」についての知識を深め、 卓越した機能を持つ分子系を創成すること

## 理論・計算分子科学研究領域 Theoretical and Computational Molecular Science

見えない複雑な分子を描き出す Describing invisible and intricate molecules

分子およびその集合体(気相、液相、固相)、さらには生体分子やナノ物質など複雑系や複合系に関する構造および機能を量子力学、統計力学、分子シミュレーションを中心とした理論・計算分子科学の方法により解明します。

## 光分子科学研究領域 Photo-Molecular Science

光を造る、光で観る、光で制御する Create, observe and control with light

分子に光をあてると様々な興味深い性質を現したり、化学反応を起こしたりします。分子科学研究所では、分子の構造や性質を光で調べ、反応や物性を光で制御する研究を行っています。そのために必要となる高度な光源の開発も行っています。

## 物質分子科学研究領域 Materials Molecular Science

物質創成、機能制御、新しい観測手法の開発 Materials development, functional control and developing new measurement techniques

新たな現象や有用な機能の発見を目指して、新規分子の開発やそれらの高次集積化と、電気・光物性、反応性、触媒能などの研究を行っています。

## 生命・錯体分子科学研究領域 Life and Coordination-Complex Molecular Science

生体機能の実現と無駄のない化学反応へ Realizing vital functions and efficient chemical reactions

生物が示す多彩な生体機能の発現が、どのような機構で行われているか分子レベルで解明するための研究を行っています。中心金属と配位子の組み合わせで金属錯体は多種多彩な機能を発現します。その特色を生かしてエネルギー・環境問題軽減のための高効率エネルギー変換、水中での有機化合物の分子変換、無機小分子の活性化を行っています。

## 協奏分子システム研究センター Research Center of Integrative Molecular Systems

分子システムの解析と創成 Analysis & Design of Sophisticated Molecular Systems

分子がシステムとして組織化され、卓越した機能を発現する仕組みを研究しています。1つの分子と分子システムを結ぶ階層構造を理解し、その原理に基づいた分子システムのデザインに取り組んでいます。

## メソスコピック計測研究センター Center for Mesoscopic Sciences

新しい計測で分子システムのありのままの姿を解析 Innovative measurements to approach the nature of molecular systems

分子が集まって機能するシステムでは、ミクロとマクロを繋ぐ階層間の情報・物質のやりとりがその特性発現に役割を担っていると考えられます。その現場をできる限りありのままの姿で捉え、新しい分子の能力を引き出すための極限的計測法の研究を行います。

## 特別研究部門 Advanced Molecular Science

分子科学分野のトップレベル研究の支援と、研究者層の厚みを増強するための支援を行います。

## 社会連携部門 Division of Research Innovation and Collaboration

分子研と企業などからの資金によって運営するオープンイノベーション拠点とし産官学の共同研究を実施します。



## ■理論分子科学第一研究部門 Theoretical Molecular Science I

# 凝縮系における反応、機能、物性を生み出す ダイナミクスの理論研究

Theoretical Studies on Dynamics behind Reactions, Functions,  
and Glass Transitions in Many-Body Molecular Systems

斎藤 真司(教授)  
SAITO, Shinji

1988年慶應義塾大学理工学部卒、1990年京都大学大学院工学研究科修士課程修了、1995年博士(理学)(総研大)。1990年分子科学研究所技官、1994年名古屋大学理学部助手、1998年助教授を経て2005年10月より現職。1999年基礎生物学研究所、2000年岡崎統合バイオサイエンスセンター、2005年東京大学客員助教授、2006年から2010年東京大学、2008年国立情報学研究所客員教授、2020年から2022年Indian Institute of Technology Kanpur客員教授。


TEL: 0564-55-7300  
mail: shinji@ims.ac.jp

1988 B.S. Keio University  
1990 M.Eng.KyotoUniversity  
1995 Ph.D. The Graduate University for Advanced Studies  
1990 Technical Associate, Institute for Molecular Science  
1994 Research Associate, Nagoya University  
1998 Associate Professor, Nagoya University  
2005 Professor, Institute for Molecular Science  
2006 Professor, The Graduate University for Advanced Studies

〈Keywords〉

Fluctuations,  
Reactions,  
Functions,  
Glass Transitions

水の特異的な熱力学的性質やタンパク質の機能などはどのように生まれるのでしょうか?溶液や生体分子などの系は凝縮系と呼ばれます。このような凝縮系には、フェムト秒( $10^{-15}$ 秒)という非常に速い時間スケールの分子振動から、マイクロ秒( $10^{-6}$ 秒)からミリ秒( $10^{-3}$ 秒)そしてさらに遅い時間スケールの分子の集団的な運動やタンパク質の構造変化が存在します。これらの運動は広い時間スケールにわたっているだけでなく、異なる空間スケールをもち複雑に絡み合っています。さらに、温度や圧力により運動の様相も大きく変化します。このような複雑な運動により、分子集合体としての構造は絶えず変化しています。また、そのような揺らぎの中で、様々な化学反応が進行し、それらの結果として、物質の様々な物性やタンパク質の機能につながります。また、これまでに多くの分子の集団的な平均として反応が調べられていました。しかし、実験の進展により、個々の分子の構造変化や反応を追跡することも可能になってきました。その結果、集団平均された結果には見られない複雑な様相も明らかになってきました。私達は統計力学や量子力学に基づく独自の理論計算・解析手法の開発とシミュレーションの活用により分子運動を解析し、物質の性質やタンパク質の機能がどのように生み出されるのか、また、化学反応がどのように進行するのかなどを理論・計算科学的に研究しています。




Scheme of enzymatic reaction. Reactions rapidly take place through 'conformational excited states' on a two-dimensional surface expressed by fast and slow variables.

## 参考文献

- 1) T. L. C. Jansen, S. Saito, J. Jeon, and M. Cho, "Theory of Coherent Two-dimensional Vibrational Spectroscopy," *J. Chem. Phys. (Perspective)* **150** 100901 (17 pages) (2019)(Invited).
- 2) K. Kim and S. Saito, "Multiple Length and Time Scales of Dynamic Heterogeneities in Model Glass-Forming Liquids: A Systematic Analysis of Multi-Point and Multi-Time Correlations," *J. Chem. Phys. (Special Topic: Glass Transition)* **138**, 12A506 (13 pages) (2013) (Invited).
- 3) J. Ono, S. Takada, and S. Saito, "Couplings between Hierarchical Conformational Dynamics from Multi-Time Correlation Functions and Two-Dimensional Lifetime Spectra: Application to Adenylate Kinase," *J. Chem. Phys. (Special Topic: Multidimensional Spectroscopy)* **142**, 212404 (13 pages) (2015)(Invited).
- 4) T. Mori and S. Saito, "Conformational excitation and non-equilibrium transition facilitate enzymatic reactions: Application to Pin1 peptidyl-prolyl isomerase," *J. Phys. Chem. Lett.* **10**, 474-480 (2019).
- 5) S. Saito and B. Bagchi, "Thermodynamic picture of vitrification of water through complex specific heat and entropy: A journey through "No Man's Land"," *J. Chem. Phys.* **150**, 054502 (14 pages) (2019).

Many-body molecular systems such as liquids and biomolecules show dynamics over a wide range of spatiotemporal scales and yield various thermodynamic and dynamic properties. For example, in supercooled liquids, spatiotemporal non-uniform motions are found. The motions known as dynamic heterogeneity are now considered to be a crucial clue to understand supercooled liquids and glass transition. The heterogeneous dynamics also affect reaction dynamics. Furthermore, recent experimental and theoretical studies have demonstrated that reactions and conformational dynamics at the single-molecule level are described by non-Poisson processes. In addition to these examples, it is known that conformational changes with proper time scales are essential to protein functions. Thus, understanding of spatiotemporal heterogeneous dynamics in the many-body molecular systems is required for the elucidation of thermodynamics and dynamic properties, reactions, and functions. So far, we have studied the complicated dynamics in these systems using multidimensional spectroscopy and multi-time correlation functions. As the development of these studies, we theoretically and computationally investigate how reactions proceed and biological functions are generated in fluctuating environment and how conformational dynamics yield interesting thermodynamic properties and change toward glass transition.



Schematic figure of low- (blue) and high- (red) density local structures in supercooled water. Local density fluctuations generate thermodynamic and dynamic anomalies of water.



## ■理論分子科学第一研究部門 Theoretical Molecular Science I

# 量子多体効果が織りなす新奇固体物性の理論研究

Theoretical Studies on Novel Physical Properties Arising from Many-Body Interaction

### 南谷 英美(准教授)

MINAMITANI, Emi

2005年大阪大学工学部応用自然学科卒業、2010年大阪大学大学院工学研究科博士課程修了、博士(工学)、2010年日本学术振興会特別研究員(PD)、2011年理化研究所基礎科学特別研究員、2013年東京大学大学院工学系研究科助教、2015年東京大学大学院工学系研究科講師を経て、2019年4月より現職。2017年科学技術振興機構さきかけ研究者兼務。

TEL: 0564-55-7301

mail: minamitani@ims.ac.jp

2005 B.S. Osaka University

2010 Ph.D. Osaka University

2010 Postdoctoral Fellow, Osaka University

2011 Special Postdoctoral Researcher, RIKEN

2013 Assistant Professor, The University of Tokyo

2015 Lecturer, The University of Tokyo

2019 Associate Professor, Institute for Molecular Science

Associate Professor, The Graduate University for Advanced Studies

### 〈Keywords〉

Quantum Many-Body Interaction,

Density Functional Theory, Quantum Field Theory,

Electron-Phonon Interaction,

Magnetism

固体の様々な驚くべき物性は、電子や固体振動の量子であるフォノンといった様々な素励起間の量子的な相互作用によって生じています。私達のグループでは、電子エレクトロニクス・スピントロニクスといった応用にも結びつく、ナノスケールでの磁性とエネルギー散逸の学理解明を目指して、場の量子論や第一原理計算を組み合わせた研究手法の開発や、実験グループと密接に連携した共同研究を進めています。


ナノスケールの磁性に関しては、近藤効果やスピン軌道相互作用に着目しています。近藤効果は、局在スピンと伝導電子が相互作用し、近藤1重項と呼ばれる特徴的な量子多体状態を形成する現象です。スピン軌道相互作用は、スピンを持った電子が異方的な軌道運動をすることで生じる相対論的な効果で、スピンが特定の方向を向きやすくなります。私達はとくに、表面上のナノ構造や吸着分子における新奇現象の可能性を探っています。

エネルギー散逸については、特に電子フォノン相互作用に注目した研究を進めています。格子振動の量子、フォノンと電子の相互作用は、電気抵抗、熱電効果から超伝導に至るまで固体物理の随所にあらわれる最も基本的な相互作用の一つですが、相互作用強度の見積もりは簡単ではありません。私達のグループでは密度汎関数理論に基づく第一原理計算を応用了した電子フォノン相互作用の精密計算を駆使して、各種表面分光法に現れる電子フォノン相互作用のシグナルを捉えることや、電子フォノン相互作用に由来する熱物性への解明に取り組んでいます。

Quantum many-body interaction is a source of novel physical properties in the condensed matters. In our group, we develop theoretical methods by combining quantum field theory and density functional theory, and carry out collaborative research with experimental groups. As specific targets, we focus on magnetism in nanostructure and energy dissipation.

For magnetism in nanostructure, we are interested in the Kondo effect and spin-orbit interaction. The Kondo effect arises from the interaction between the localized spin and conduction electrons, which forms a characteristic many-body state so called the Kondo singlet state. The spin-orbit interaction originating from relativistic effect constrains the direction of magnetic moment to specific direction. We investigate the possibility of novel physical phenomena induced by these interactions in the nanostructure and molecules on surfaces.

For energy dissipation, we focus on the effect of electron-phonon interaction. The electron-phonon interaction is one of the most fundamental interactions in the condensed matter physics, and the quantitative evaluation in realistic materials is highly demanding. We adopt the ab-initio calculation to analyze the signal of electron-phonon coupling in surface spectroscopy and thermal properties in various kind of solids.



Schematic image of the theoretical method developed in our group

### 参考文献

- 1) Emi Minamitani, Noriyuki Tsukahara, Daisuke Matsunaka, Yousoo Kim, Noriaki Takagi, Maki Kawai, "Symmetry-driven novel Kondo effect in a molecule", *Phys. Rev. Lett.*, **109** (2012) 086602.
- 2) Emi Minamitani, Ryuichi Arafune, Noriyuki Tsukahara, Yoshitaka Ohda, Satoshi Watanabe, Maki Kawai, Hiromu Ueba, Noriaki Takagi, "Surface phonon excitation on clean metal surfaces in scanning tunneling microscopy", *Phys. Rev. B*, **93**, 085411 (2016).
- 3) E. Minamitani, N. Takagi, S. Watanabe, "Model Hamiltonian approach to the magnetic anisotropy of iron phthalocyanine at solid surfaces", *Phys. Rev. B*, **94**, 205402 (2016).
- 4) R. Hiraoka, E. Minamitani, R. Arafune, N. Tsukahara, S. Watanabe, M. Kawai, and N. Takagi, "Single-Molecule Quantum Dot as a Kondo Simulator", *Nat. Commun.*, **8** 16012 (2017).
- 5) Emi Minamitani, Ryuichi Arafune, Thomas Frederiksen, Tetsuya Suzuki, Syed Mohammad Fakruddin Shahed, Tomohiro Kobayashi, Norifumi Endo, Hirokazu Fukidome, Satoshi Watanabe, Tadahiro Komeda, "Atomic-scale characterization of the interfacial phonon in graphene/SiC" *Phys. Rev. B*, **96**, 155431 (2017).



## ■理論分子科学第二研究部門 Theoretical Molecular Science II

# 凝縮相分子系における量子動力学現象の理論 Theoretical Studies of Quantum Dynamics in Condensed Phase Molecular Systems

### 石崎 章仁(教授)

ISHIZAKI, Akihito

2008年京都大学大学院理学研究科博士課程修了、博士(理学)。2008年カリフォルニア大学バークレー校化学部化学科にて日本学術振興会海外特別研究員、2010年ローレンス・バークレー国立研究所物理生物科学部門博士研究員、2012年3月分子科学研究所特任准教授を経て、2016年4月より現職。2016年名古屋大学大学院理学研究科客員教授兼任。

TEL: 0564-55-7310

FAX: 0564-53-4660

mail: ishizaki@ims.ac.jp

2008 D.Sc. Kyoto University

2006 JSPS Research Fellow, Kyoto University

2008 JSPS Postdoctoral Fellow for Research Abroad, University of California, Berkeley

2010 Postdoctoral Fellow, Lawrence Berkeley National Laboratory

2012 Research Associate Professor, Institute for Molecular Science

2013 Fellow 2012–2013, Wissenschaftskolleg zu Berlin

2016 Professor, Institute for Molecular Science

### 〈Keywords〉

Quantum Dynamics,  
Energy/Charge Transfer,  
Photosynthetic Light Harvesting

我々が量子力学現象を議論するとき、実のところ、いかなる量子系も純粹な孤立系とは見なすことはできません。常に何らかの外界と接触することで、ときに量子性が破壊され、ときには量子性が頑健に保持される——複雑な分子系においては量子性の維持と崩壊のバランスが化学ダイナミクスの様態に大きな影響を及ぼし得るため「多自由度ゆえに生じる揺らぎや摩擦に曝されながら量子効果はどのような影響を受けるのか」を理解することは、重要な課題となります。

そのような量子散逸現象の顕著な例として、私たちが最近10年ほど取り組んでいる光合成初期過程における電子エネルギー移動や電荷分離過程があります。光合成は光という物理エネルギーを細胞が利用可能な化学エネルギーに変換する分子過程であり、糖の生成を通して地球上の全ての生命活動を維持しています。近年は再生可能エネルギーの観点からも注目され、エネルギー資源問題に応える緊急課題として光合成機構の仕組みを取り入れた分子素子の研究開発が進められています。太陽光の強度が弱い場合には、捕獲された光エネルギーは色素分子の電子励起エネルギーとなりほぼ100%の量子収率で反応中心タンパク質へ輸送され一連の電子移動反応を駆動しますが、広大な物理空間にありながら、また絶え間ない分子運動と揺らぎの中にありながら電子励起エネルギーはどのようにして反応中心へ迷子にもならず一意的に辿り着きエネルギー変換に用いられるのでしょうか？

私たちは、超高速レーザー一分光などの実験研究者と密に連携しながら、量子散逸系動力学理論・非線形光学応答理論を駆使することで光合成初期過程におけるエネルギー輸送やエネルギー変換過程などの凝縮相分子系における量子力学現象の解明に取り組んでいます。


### 参考文献

- 1) A. Ishizaki & G. R. Fleming, "Unified treatment of quantum coherent and incoherent hopping dynamics in electronic energy transfer," *J. Chem. Phys.* **130**, 234111 (2009); (10 pages).
- 2) A. Ishizaki & G. R. Fleming, "Theoretical examination of quantum coherence in a photosynthetic system at physiological temperature," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **106**, 17255-17260 (2009).
- 3) A. Ishizaki & G. R. Fleming, "Quantum coherence in photosynthetic light harvesting," *Annu. Rev. Condens. Matter Phys.* **3**, 333-361 (2012).
- 4) G. S. Schulz-Cohen, A. Ishizaki, Tessa R. Calhoun, Naomi S. Ginsberg, Matteo Ballottari, Roberto Bassi & Graham R. Fleming, "Elucidations of timescales and origins of quantum electronic coherence in LHCII," *Nature Chemistry* **4**, 389-395 (2012).
- 5) G. D. Scholes et al. "Using coherence to enhance function in chemical and biophysical systems," *Nature* **543**, 647-656 (2017).

Essentially, any quantum systems can never be regarded as "isolated systems." Quantum systems are always in contact with "the outside world" and hence, their quantum natures are sometimes sustained and sometimes destroyed. In condensed phase molecular systems, especially, quantum systems are affected by the huge amount of dynamic degrees of freedom such as solvent molecules, amino acid residues in proteins, and so on. Balance between robustness and fragility of the quantum natures may dramatically alter behaviors of chemical dynamics.

One of the notable examples of such quantum dynamical phenomena is the energy transport and energy conversion processes in photosynthetic systems. Photosynthesis provides the energy source for essentially all living things on Earth, and its functionality has been one of the most fascinating mysteries of life. The conversion starts with the absorption of a photon of sunlight by one of the light-harvesting pigments, followed by transfer of electronic excitation energy to the reaction center, where charge separation is initiated. At low light intensities, surprisingly, the quantum efficiency of the transfer is near unity. A longstanding question in photosynthesis has been the following: How does light harvesting deliver such high efficiency in the presence of disordered and fluctuating dissipative environments? Why does not energy get lost? At high light intensities, on the other hand, the reaction center is protected by regulation mechanisms that lead to quenching of excess excitation energy in light harvesting proteins. The precise mechanisms of these initial steps of photosynthesis are not yet fully elucidated from the standpoint of molecular science.

Our group is investigating quantum dynamical phenomena in condensed phase molecular systems such as energy transport and conversion processes in photosynthetic systems through the use of quantum dissipative theories and nonlinear optical response theories in close collaboration with experimental researchers of optical spectroscopy.



The crystal structure of LHCII isolated from spinach, which is the most abundant photosynthetic antenna complex in plants containing over 50% of the world's chlorophyll molecules.



## 高度な電子状態理論に基づく複雑系の基礎化学 Fundamental Chemistry of Complex Systems using Advanced Electronic Structure Theories

### 江原 正博(教授)

EHARA, Masahiro

1988年京都大学卒業、1993

年同大学院博士課程修了、

博士(工学)。基礎化学研究所

博士研究員、ハイデルベルグ

大学博士研究員、1995年京都

大学助手、2002年同助教授を

経て、2008年6月より現職。

TEL: 0564-55-7461

FAX: 0564-55-7025

mail: ehara@ims.ac.jp

1988 B.S. at Kyoto Univ.  
Faculty of Engineering

1993 Ph.D. at Kyoto Univ.  
Graduate School of  
Engineering

1994 Japan Society for the  
Promotion of Science  
(JSPS) Postdoctoral  
Fellow

Visiting Researcher at  
Heidelberg Univ.

1995 Assistant Professor at  
Kyoto Univ. Graduate  
School of Engineering

2002 Associate Professor at  
Kyoto Univ. Graduate  
School of Engineering

2008 Professor, Institute for  
Molecular Science

2012 Professor at Element  
Strategy for Catalysis  
and Battery (ESICB),  
Kyoto Univ. (additional  
post)

### 〈Keywords〉

Quantum Chemistry,  
Photophysical Chemistry,  
Heterogeneous Catalysis

自然界の様々な化学事象は分子の電子状態に基づいて発現しています。私たちは、複雑な化学事象の原理を明らかにし、化学概念を構築することを目的として、高度な電子状態理論を開発し、光化学や触媒化学の基礎研究を行っています。現在の主な研究テーマは以下のとおりです。

#### (1) 複雑系の高精度電子状態理論の開発

分子の電子状態や化学反応には複雑な電子構造をもつ状態が存在します。これらの複雑系の電子状態に適用できる高度な量子状態理論や計算アルゴリズムを開発し、基礎化学から応用化学に亘る広い分野の化学事象を研究しています。例えば、励起状態や化学反応の溶媒効果を記述するPCM SAC-CI法、準安定な共鳴状態を計算するCAP/SAC-CI法やACCC SAC-CI法、複雑な電子状態を精密に記述するSAC-CI general-R法、分子の電子状態や化学反応の圧力効果を研究するXP-PCM法を開発し、応用研究を実施しています。

#### (2) 不均一系触媒の理論研究

金属酸化物や凝縮相高分子に担持された金属ナノ粒子は、高効率な触媒反応を実現します。私たちは、これらの複雑・複合系である金属ナノ粒子の触媒活性を量子化学計算を用いて、担体効果や合金効果に注目して研究しています。最近の研究では、凝縮相金・パラジウム合金微粒子の低温C-Cl活性化、金クラスターの様々な触媒反応、アルミナ担持銀クラスターの水素活性化などのメカニズムを理論的に明らかにしました。実験と協働し、触媒・電池の元素戦略拠点のプロジェクトにおいて、高度な触媒活性を持つ不均一系触媒の研究開発に挑戦しています。

#### 参考文献

- 1) M. Ehara, T. Sommerfeld, "CAP/SAC-CI Method for Calculating Resonance States of Metastable Anions," *Chem. Phys. Lett.* **537**, 107-112 (2012).
- 2) R. Cammi, R. Fukuda, M. Ehara, H. Nakatsuji, "SAC-CI Method in the Polarizable Continuum Model-Theory for Solvent Effect on Electronic Excitation of Molecules in Solution," *J. Chem. Phys.* **133**, 024104-1-24 (2010).
- 3) R.N. Dhital, C. Kamonsatikul, E. Somsook, K. Bobuatong, M. Ehara, S. Karanjit, H. Sakurai, "Low-Temperature Carbon-Chlorine Bond Activation by Bimetallic Gold/Palladium Alloy Nanoclusters: An Application to Ullmann Coupling," *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 20250-20253 (2012).
- 4) P. Hirunsit, K. Shimizu, R. Fukuda, S. Namuangruk, Y. Morikawa, M. Ehara, "Cooperative H<sub>2</sub> Activation at Ag Cluster/ $\theta$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(110) Dual Perimeter Sites: A Density Functional Theory Study," *J. Phys. Chem. C* **118**, 7996-8006 (2014).

Various chemical phenomena in nature appear originating in molecular electronic states. We develop the advanced electronic structure theories to investigate the photochemistry and catalysis. Our current research subjects are as follows.

#### (1) Advanced electronic structure theories for large complex systems

Complex electronic structure exists in molecular electronic states and chemical reactions. We develop the advanced electronic structure theories and their efficient computational algorithm applicable to large complex systems and investigate various phenomena in fundamental and applied chemistry; for example, PCM SAC-CI for the solvent effects on excited states and chemical reactions, CAP/SAC-CI and ACCC SAC-CI for metastable resonance states, SAC-CI general-R for complex electronic states, and XP-PCM for high pressure effects on electronic states and reactions.

#### (2) Heterogeneous catalysts

Metal nanoclusters (NC) supported by metal oxides or colloidal phase polymers achieve highly efficient catalytic reactions. We study the catalytic activity of these complex systems in view of metal support interaction and alloy effects using quantum chemical calculations. For example, we elucidated the mechanism of the low-temperature C-Cl activation on Au-Pd NC:PVP, various catalytic reactions on Au NC:PVP, and the H<sub>2</sub> activation of Ag NC/alumina. We challenge the development of advanced heterogeneous catalysts in the project of Elements Strategy Initiative for Catalysts and Batteries (ESICB) collaborating with experimental groups.




Fig. 1 Electronic resonance states of DNA/RNA nucleobases




Fig. 2 Solvation dynamics of Au/Pd alloy nanocluster



■計算分子科学研究部門 Computational Molecular Science

## 生体分子動力学シミュレーション: タンパク質の折りたたみ、変性、凝集、アミロイド線維

Biomolecular Dynamics Simulation:  
Protein Folding, Denaturation, Aggregation, and Amyloid Fibril

奥村 久士(准教授)

OKUMURA, Hisashi

1998年慶應義塾大学理工学部卒業、2002年同大学大学院理工学研究科博士課程修了、博士(理学)。東京大学工学系研究科日本学術振興会特別研究員(PD)、分子科学研究所助手、名古屋大学大学院理学研究科COE特任講師、ラトガース大学研究助教授を経て2009年5月より現職。  
TEL: 0564-59-5213  
FAX: 0564-55-7025  
mail: hokumura@ims.ac.jp

1998 B.S. Keio University

2002 Ph.D. Keio University

Postdoctoral Fellow,  
The University of Tokyo

Research Associate,  
Institute for Molecular  
Science

2004 Research Associate,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

2006 Research Lecturer,  
Nagoya University

2008 Research Assistant,  
Rutgers University

2009 Assistant Research  
Professor, Rutgers  
University

Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

2018 Associate Professor,  
Exploratory Research  
Center on Life and  
Living Systems

〈Keywords〉

Molecular Dynamics  
Simulation,  
Protein,  
Amyloid

タンパク質は、多数のアミノ酸がペプチド結合によりつながったもので、そのアミノ酸の並び方(一次元配列)はタンパク質の立体構造を決める重要な要素となります。アミノ酸の一次元配列情報をもとにタンパク質の立体構造を予測する問題をタンパク質の折りたたみ問題といいます。この問題が難しい理由は、通常のシミュレーション手法では多くのタンパク質構造を探索するために非常に長い時間シミュレーションを行わなければならないからです。

この問題を解決するためこれまでに有力な手法がいくつか提案されてきました。そのうちの1つであるレプリカ交換法では系のコピー(レプリカ)を複数用意し、シミュレーションの途中で2つのレプリカ間で温度を交換し、各レプリカの温度を上下させることで効率的な構造空間のサンプリングを実現します。最近、我々はより強力なレプリカ置換法を考案しました。この方法を使ってCペプチドの折りたたみシミュレーションを行い、このペプチドが $\alpha$ -ヘリックス構造を形成し折りたむ過程を図1のように明らかにしました。

さらに医療への応用にも関心を持っています。タンパク質が間違って折りたたまれることによってひき起こされるフォールディング病という病気があります。アルツハイマー病やハンチントン病がその例です。これらの病気はタンパク質が間違って折りたたまれ凝集し、アミロイドという針状の物質を作ってしまうことが原因ですが、アミロイドが形成されるしくみはまだよくわかっていません。レプリカ置換分子動力学法を使ってアミロイドの形成メカニズムの解明に取り組んでいます。またアミロイド線維は超音波を使って破壊することができるのですが、その過程を非平衡分子動力学シミュレーションにより初めて解明しました(図2)。




Fig. 1 (a) Free-energy landscape and (b) typical structures at local-minimum free-energy states of C-peptide.

Biomolecules such as proteins and peptides have complicated free-energy landscape with many local minima. The conventional canonical-ensemble molecular dynamics (MD) simulations tend to get trapped in a few of the local-minimum states. To overcome these difficulties, we have proposed new generalized-ensemble algorithms, such as replica-permutation method. We apply these methods to proteins and peptides and try to predict the native structures of proteins as in Figure 1.

We are also interested in amyloid fibrils, which are insoluble aggregates of misfolded fibrous proteins and associated with more than 20 human neurodegenerative diseases (Figure 2). For example, Alzheimer's disease is related to amyloid- $\beta$  (A $\beta$ ) peptides. To overcome these diseases, it is essential to understand amyloid genesis and disruption. We perform such MD simulations of amyloid fibrils.

### 参考文献

- 1) H. Okumura and S. G. Itoh, "Structural and fluctuational difference between two ends of A $\beta$  amyloid fibril: MD simulation predicts only one end has open conformations", *Sci. Rep.* **6**, 38422 (9 pages) (2016).
- 2) S. G. Itoh and H. Okumura, "Oligomer formation of amyloid- $\beta$ (29-42) from its monomers using the Hamiltonian replica-permutation molecular dynamics simulation", *J. Phys. Chem. B* **120**, 6555-6561 (2016).
- 3) H. Okumura and S. G. Itoh, "Amyloid fibril disruption by ultrasonic cavitation: Nonequilibrium molecular dynamics simulations", *J. Am. Chem. Soc.* **136**, 10549-10552 (2014).
- 4) S. G. Itoh and H. Okumura: "Replica-permutation method with the Suwa-Todo algorithm beyond the replica-exchange method", *J. Chem. Theory Comput.* **9**, 570-581 (2013).




Fig. 2 Disruption process of an amyloid fibril of A $\beta$  peptides by supersonic wave. The amyloid fibril is disrupted when a bubble collapses.



## 分子集合体の光電子物性とダイナミクス

### Theoretical Studies on Molecular Aggregates

藤田 貴敏(特任准教授)  
FUJITA, Takatoshi

2006年神戸大学発達科学部  
卒業、2011年同大学大学院  
人間発達環境学研究科博士  
課程修了、博士(理学)。日本  
学術振興会特別研究員、ハーバード大学博士研究員、京都大学博士研究員を経て、2016年  
4月より現職。

TEL: 0564-55-7260  
FAX: 0564-53-4660  
mail: tfujita@ims.ac.jp

2006 B.H.D. Faculty of  
Human Development,  
Kobe University

2008 M.S. Graduate School  
of Cultural Studies and  
Human Science, Kobe  
University

2011 Ph.D. Graduate School of  
Human Development and Environment, Kobe  
University

2010 JSPS Research  
Fellow (DC2)

2011 JSPS Research  
Fellow (PD)

2012 Postdoctoral Fellow,  
Department of Chemistry  
and Chemical Biology,  
Harvard University

2015 Postdoctoral Fellow,  
Department of Chemistry,  
Graduate School of  
Science, Kyoto University

2016 Research Associate  
Professor, Institute for  
Molecular Science

〈Keywords〉

Exciton,

Energy and  
Charge Transfer,

Organic Semiconductors

近年のエネルギー問題から、太陽光エネルギーをいかに効率よく収集・利用するかは非常に重要な問題です。電気を流す有機分子—有機半導体の発見以来、様々な分子を使って光エネルギーを収集・制御する試みが行われてきました。代表的なものが有機薄膜太陽電池で、シリコン太陽電池と比べてフレキシブル・低コストといった利点があります。他方、超分子化学の発展や自己組織化の利用により、分子からボトムアップでナノ構造体を作る研究も盛んに行われています。具体的には構造制御を利用した物性・機能のコントロールや、独特な物性を持つソフトマターのデザインが進められています。

多数の有機分子が集積した分子集合体の物性は、孤立分子の物性と比べてどう違っているでしょうか?凝集した多数の分子は分子間相互作用のため協同的に振る舞うことができ、光吸収に伴って集団的な電子励起状態を形成できるようになります。電子励起状態をある種の準粒子—電子と正孔が対になった励起子と考えると、相互作用によって励起子波動関数が分子間に非局在化するともいえます。分子集合体の光物性の特徴としては、J会合体で見られるような吸収スペクトルのレッドシフトや、ある分子から別の分子へ電子励起状態が移動する蛍光共鳴エネルギー移動などがあります。また、分子間距離が近くなつて各分子の分子軌道が重なる場合には、電子や正孔が分子間を移動する電荷移動や、励起子が電子と正孔に分かれれる電荷分離が起きることもあります。このような分子集積の結果として現れる光電子物性が我々の研究テーマです。



当研究室では、分子結晶からソフトマターを含めた様々な分子集合体を研究の対象にして理論的・計算科学的研究を行っています。具体的には分子が多数集積した系の光電子物性やエネルギー移動・電荷移動のダイナミクス、さらにはエネルギー変換機構や構造物性相関を理解することを目標にしています。

#### 参考文献

- 1) T. Fujita, J. Huh, S. K. Saikin, J. C. Brookes, A. Aspuru-Guzik, "Theoretical characterization of excitation energy transfer in chlorosome light-harvesting antennae from green sulfur bacteria," *Photosynth. Res.* **120**, 273-289 (2014).
- 2) T. Fujita, S. Atahan-Evrenk, N. P. D. Sawaya, A. Aspuru-Guzik, "Coherent Dynamics of Mixed Frenkel and Charge Transfer Excitons in Dinaphtho[2,3-b:2'3'-f] thieno[3,2-b]-thiophene Thin Films: The Importance of Hole Delocalization," *J. Phys. Chem. Lett.* **7**, 1374-1380 (2016).

Organic molecules can assemble into an ordered structure by non-covalent interactions, forming various types of aggregates. Molecular aggregates exhibit characteristic optical and electronic properties that are not observed in isolated molecules; those optoelectronic properties are desirable for producing flexible and low-cost devices. For example, a large number of molecules can behave cooperatively due to their intermolecular interactions, and they can form a collective electronic excited state by light absorption. Another characteristic photophysical process of molecular aggregates is fluorescence resonant energy transfer, where an electronic excited state is transferred from one molecule to another. In addition, when the intermolecular distance is so close that the intermolecular orbital overlaps become significant, charge separation can take place. Our research targets are optoelectronic properties and photophysical processes that emerge as a result of the molecular aggregation.

We study optoelectronic properties and quantum dynamics of molecular aggregates. More specifically, we focus on energy and charge transfer dynamics, energy conversions, and structure-property relationship. We currently investigate electronic structures and exciton dynamics in organic optoelectronic materials, such as an organic/organic interface. We also develop an ab initio theory suitable to treat electronically excited states of large systems with reasonable accuracy, on the basis of a fragment-based theory and a many-body perturbation theory.





■理論・計算分子科学研究部門 Theoretical and Computational Molecular Science

## 生体分子マシンの機能ダイナミクスを理論的手法で解明し、デザインする

Functional Dynamics of Biomolecular Machines Revealed by Theoretical Methods

岡崎 圭一(特任准教授)

OKAZAKI, Kei-ichi

2004年京都大学理学部卒。

2009年神戸大学大学院自然

科学研究科博士課程修了、理

学博士。日本学術振興会特別

研究員(DC2,PD)、同海外特別

研究員、米国国立衛生研究所

博士研究員、マックスプランク

生物物理学研究所博士研究員

を経て、2016年6月より現職。

TEL: 0564-55-7303

mail: keokazaki@ims.ac.jp

2004 B.S. Kyoto University

2006 M.S. Kobe University

2009 Ph.D. Kobe University

2007 JSPS Research Fellow (DC2)

2009 JSPS Postdoctoral Fellow (PD)

Postdoctoral Fellow,  
Waseda University

2010 Part-time Lecturer,  
Waseda University

2011 Postdoctoral Fellow,  
National Institutes of Health, USA

2012 JSPS Postdoctoral Fellow for Research Abroad

2013 Postdoctoral Fellow,  
Max Planck Institute of Biophysics, Germany

2016 Research Associate Professor, Institute for Molecular Science

(Keywords)

Theoretical Biophysics,  
Molecular Motors,  
Molecular Simulations

機能ダイナミクスは、生体分子マシンが働く仕組みを理解する上で必要不可欠です。例えば、モータータンパク質は、ATP加水分解エネルギーを用いて、レールの上を歩いたり、固定子に対して回転したりします。膜輸送タンパク質は、生体膜に対して内側に開いた構造と外側に開いた構造との間で構造変化することで、基質分子を膜の内外へ輸送しています。このように自然が作り上げた精巧かつダイナミックなナノマシンの働く仕組みを原子・分子レベルで解明し、そのデザイン原理を学ぶことが目標です。

生体分子マシンの機能ダイナミクスは、幅広い階層の動き・反応が複雑にからみあっています。このようなダイナミクスを理解するには、多階層な(マルチスケールな)モデルを駆使する必要があります。従来の全原子分子動力学シミュレーションのみでは、とても太刀打ちできません。なぜなら、生体分子マシンは巨大複合体で、溶媒分子も含めると全原子数は数十万以上になる上に、典型的な機能時間スケールはミリ秒以上であるからです(1兆回時間ステップの繰り返し計算に相当)。私たちは、全原子・粗視化モデルを用いた分子シミュレーションや、速度論モデルなどを駆使してこの問題に取り組んでいます。

私たちはこれまで、細胞内の主なエネルギー供給源であるATP合成酵素に取り組んできました<sup>1-3)</sup>。その酵素部分であるF<sub>1</sub>-ATPaseは、ATP加水分解エネルギーを使って中心軸を回転させる回転分子モーターです。その回転力を生み出す重要なステップである、ATP加水分解後のリン酸解離について、全原子分子動力学シミュレーションに基づいて解離の時定数を見積もり実験値と比較することで、そのタイミングと経路を明らかにしました<sup>1)</sup>。また、共通の回転軸を介してF<sub>1</sub>とF<sub>0</sub>の2つのモーターが協同して働く仕組みを、ねじれ弾性や摩擦といった力学的特性に基づいたマスター方程式を用いて明らかにしました<sup>2)</sup>。このように、生体分子マシンは様々な階層で面白い問題が満載です<sup>3)</sup>。

### 参考文献


- 1) K. Okazaki & G. Hummer, "Phosphate release coupled to rotary motion of F<sub>1</sub>-ATPase." *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **110**:16468-16473 (2013).
- 2) K. Okazaki & G. Hummer, "Elasticity, friction, and pathway of gamma-subunit rotation in F<sub>0</sub>F<sub>1</sub>-ATP synthase." *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **112**:10720-10725 (2015).
- 3) 岡崎圭一 "F<sub>1</sub>-ATPaseの機能的運動のマルチスケールな解析: リン酸解離からγサブユニット回転の弾性・摩擦まで." 生物物理 **55**:208-209 (2015).

Functional dynamics plays an important role when biomolecular machines fulfill their functions. For example, motor proteins walk on the rail or rotate relative to the stator by using ATP hydrolysis energy. Transporter proteins transport their substrates across the membrane by changing their conformation between inward-open and outward-open conformations. We aim to understand design principles of these precise, yet dynamic nano-machines developed by nature.

Functional dynamics of biomolecular machines involve wide spectrum of intricate motions. In order to understand such dynamics, we need a multiscale approach to cover full range of these motions. Conventional atomistic molecular dynamics simulations alone cannot cover millisecond-long functional dynamics, especially for a large system like biomolecular machines. Thus, we use both atomistic and coarse-grained molecular simulations, as well as kinetic model, to tackle this problem.

We have been particularly focusing on ATP synthase that produces most of ATP required for living activities. The ATP synthase is composed of two rotary motors, F<sub>0</sub> and F<sub>1</sub>. The F<sub>1</sub> motor (F<sub>1</sub>-ATPase) use ATP hydrolysis energy to rotate the central stalk in one direction. By using atomistic molecular dynamics simulations, we clarified timing and pathway of P<sub>i</sub> release that produces torque<sup>1)</sup>. We also clarified the coupling mechanism of two rotary motors F<sub>0</sub> and F<sub>1</sub>, based on a master-equation model<sup>2)</sup>.

All-atom molecular dynamics simulation



Molecular dynamics simulations of F<sub>1</sub>-ATPase. Torque on central stalk or biasing potential for P<sub>i</sub> are applied to speed up functional dynamics.



## ■光分子科学第二研究部門 Photo-Molecular Science II

# アト秒量子エンジニアリング Exploring Quantum-Classical Boundary

### 大森 賢治(教授)

OHMORI, Kenji

1987年東京大学卒業、1992年同大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。東北大学助手・助教授を経て2003年9月より現職。2001年～2016年JST CREST事業併任、2004年～2005年東北大学客員教授、2007年～2008年東京工業大学客員教授、2009年～2011年東京大学客員教授、2012年～ハイレベルブルグ大学客員教授、2014年～2016年ストラスブル大学客員教授。2007年日本学術振興会賞、2009年米国物理学会フェロー表彰、2012年独フンボルト賞、2017年宅間宏記念学術賞、2018年文部科学大臣表彰。

TEL: 0564-55-7361  
FAX: 0564-54-2254  
mail: ohmori@ims.ac.jp

1987 Graduated from Faculty of Engineering, The University of Tokyo  
1992 Ph.D. The University of Tokyo  
Research Associate, Tohoku University  
2001 Associate Professor, Tohoku University  
2003 Professor, Institute for Molecular Science, The Graduate University for Advanced Studies  
2004- Visiting Professor,  
2005 Tohoku University  
2007- Visiting Professor, Tokyo  
2008 Institute of Technology  
2009- Visiting Professor,  
2011 The University of Tokyo  
2007- Director, Laser Research  
2010 Center for Molecular Science, IMS  
2014- Visiting Professor,  
2016 University of Strasbourg  
2010- Chairman, Department present of Photo-Molecular Science, IMS  
2012- Humboldt Awardee, present University of Heidelberg

〈Keywords〉

Attosecond,

Quantum Simulation,

BEC

「物質は見方によって粒子になつたり波になつたりする。」量子の世界の本質はここにあります。量子力学が生まれて100年、コンピュータやCDプレーヤー等、量子力学の応用製品はなくてはならない存在になりました。しかし、人類はまだ量子の世界をよく理解しておらず、その応用の余地も膨大に残されています。私たちは、量子の世界をより良く理解するために、物質の波を光で完全に制御するというテーマに挑戦しています<sup>1-9</sup>。

私たちは、電子や原子の波にアト秒(アト=10<sup>-18</sup>)レベルで制御されたレーザー光の情報を転写することで、それらをピコメートル(ピコ=10<sup>-12</sup>)・フェムト秒(フェムト=10<sup>-15</sup>)レベルの時空間精度で加工し可視化することに成功しました<sup>1,2</sup>。さらに、この技術を用いて、世界最速レベルのスパコンの1000倍以上の速さで計算する分子コンピュータを開発しました<sup>3,4</sup>。つい最近では、世界最速スパコンでも計算不可能な多数の電子の集団運動をアト秒レベルでシミュレートできる全く新しい超高速量子シミュレータの開発に成功しています<sup>6-9</sup>。これらの成果は、朝日新聞や中日新聞を始めとする多数の新聞各紙で取り上げられた他、英米の科学雑誌Nature、Science、Nature Physics、Nature Photonics、米国物理学会Physics、英国物理学会PhysicsWorld、ドイツ物理学会Pro-Physik、あるいはScienceDaily、PhysOrg、PopSciなど各国のメディアで大きく報道される等、世界的な注目を集めています。

今後、私たちの研究の途上で、「物質の波と粒子の性質がどんなふうに共存しているのか?」そんな100年の謎を解くためのヒントが見つかることかもしれません。

### 参考文献

- 1) "Visualizing picometric quantum ripples of ultrafast wave-packet interference," H. Katsuki et al. *Science* **311**, 1589-1592 (2006).
- 2) "Actively tailored spatiotemporal images of quantum interference on the picometer and femtosecond scales," H. Katsuki et al. *Phys. Rev. Lett.* **102**, 103602 (2009).
- 3) "Ultrafast Fourier transform with a femtosecond laser driven molecule," K. Hosaka et al. *Phys. Rev. Lett.* **104**, 180501 (2010).
- 4) Selected for "Editors' Suggestions" in PRL.
- 5) Covered by "Viewpoints" in Physics; Physics **3**, 38 (2010).
- 6) Covered by "Research Highlights" in Nature; Nature **465**, 138-139 (2010).
- 7) "Strong-laser-induced quantum interference," H. Goto et al. *Nature Physics* **7**, 383-385 (2011).
- 8) Highlighted by "News and Views" in Nature Phys. **7**, 373-374 (2011).
- 9) "All-optical control and visualization of ultrafast two-dimensional atomic motions in a single crystal of

It is observed in the double-slit experiment by Akira Tonomura and coworkers that single electrons recorded as dots on a detector screen build up to show an interference pattern, which is delocalized over the screen. This observation indicates that a delocalized wave function of an isolated electron interacts with the screen, which is a bulk solid composed of many nuclei and electrons interacting with each other, and becomes localized in space. This change, referred to as "collapse" in quantum mechanics, is often accepted as a discontinuous event, but a basic question arises: When and how the delocalized wave function becomes localized? Our dream is uncovering this mystery by observing the spatiotemporal evolution of a wave function delocalized over many particles interacting with each other. Having this dream in mind, we have developed coherent control with precisions on the picometer spatial and attosecond temporal scales. Now we apply this ultrafast and ultrahigh-precision coherent control to delocalized wave functions of macroscopic many-particle systems such as an ensemble of ultracold Rydberg atoms and a bulk solid, envisaging the quantum-classical boundary connected smoothly.




Fig.1. Spatiotemporal images of a wave function, which has been designed and visualized in the iodine molecule with precisions on the picometer spatial and attosecond temporal scales. Adopted from ref. 2).

- bismuth," H. Katsuki et al. *Nature Commun.* **4**, 2801 (2013).
- 6) "Direct observation of ultrafast many-body electron dynamics in an ultracold Rydberg gas," N. Takei et al. *Nature Commun.* **7**, 13449 (2016).
- 7) "Ultrafast coherent control of condensed matter with attosecond precision," H. Katsuki et al., *Acc. Chem. Res.* **51**, 1174-1184 (2018).
- 8) "Attosecond control of restoration of electronic structure symmetry," C. Liu et al., *Phys. Rev. Lett.* **121**, 173201 (2018).
- 9) "Ultrafast creation of overlapping Rydberg electrons in an atomic BEC and Mott-insulator lattice," *Phys. Rev. Lett.*, in press (2020).



## 機能性分子材料の電子物性評価 Electronic Property of Functional Organic Materials

### 解良 聰(教授)

KERA, Satoshi

1996年千葉大学工学部卒。  
1998年日本学術振興会特別研究員、2001年千葉大学大学院自然科学研究科修了(博士(理学))、千葉大学大学院助手、ブルツブルグ大学ポスドク研究員、千葉大学大学院融合科学研究科准教授を経て、  
2014年4月より現職。

TEL: 0564-55-7413  
mail: kera@ims.ac.jp

1996 B.S. Chiba University  
1998 M.E. Chiba University  
2001 Ph.D. Chiba University  
1998 Research Fellowships for Young Scientists (JSPS)

2001 Assistant Professor, Chiba University  
2003 Research Associate, Institute for Molecular Science  
Postdoctoral Fellow, Wuerzburg University

2004 Assistant Professor, Chiba University  
2007 Associate Professor, Chiba University

2009 Visiting Associate Professor, Institute for Molecular Science

2013 Adjunct Lecturer, The Open University of Japan

Visiting Associate Professor, Soochow University

2014 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

Visiting Professor, Chiba University

〈Keywords〉

Photoelectron Spectroscopy,

Molecular Film,

Electronic State


エネルギー・環境問題に対応すべく、有機半導体と呼ばれる機能性を示す分子群を利用したソフトデバイス(太陽電池やフレキシブル照明など)の研究が賑わいを見せ、多彩な構造の分子材料が日夜設計・開発されています。しかし依然として個々の分子の特徴を区別し、要望されるデバイスの中で適切な材料として自在に活用することができていません。これは本来の特性として絶縁物たる分子群が「有機半導体」として材料機能を示す理由とその真の特徴を認識できていないことに帰ります。具体的には、デバイスにおける無機物(金属電極等)が接する界面における分子の変性はもちろんのこと、構造異方性の高い凸凹した分子界面の原子レベルでの相互作用についての理解が全く不十分であるということです。また諸物性の発現機構や原理(相関や因果)、その制御のための量子論的な理解が不十分で、適切なガイドラインが構築されぬまま手探り状態の応用研究が続けられていることを意味します。

光電子分光法による電子状態測定は「分子の中の電子の姿」を量子論的に明らかにする上で極めて有効ですが、分子材料に対する実験的な難しさ(試料作製方法、光損傷や帯電回避法など測定技術)などから、電気伝導特性の中身とリンクさせることができないままでした。近年ようやく技術が成熟し、高感度角度分解紫外光電子分光(ARUPS)の実現による研究成果が積み重ねられ、有機半導体の電子の特徴が見え始めています。分子集合体における電子と振動の協奏現象が電子の“局在性の度合い”を大きく操作し物理現象を支配します。こうした弱い相互作用に特徴づけられる電子物性について重要な話題を提供していきたいと考えています。


### 参考文献

- 1) S. Kera, H. Yamane, N. Ueno, "First principles measurements of charge mobility in organic semiconductors: Valence hole-vibration coupling in organic ultrathin films", *Prog. Surf. Sci.* **84**, 135-154 (2009).
- 2) F. Bussolotti, S. Kera, K. Kudo, A. Kahn, N. Ueno, "Gap states in pentacene thin film induced by inert gas exposure", *Phys. Rev. Lett.* **110**, 267602-1-5 (2013).
- 3) F.Bussolotti, J.Yang,T.Yamaguchi,Y.Nakayama, M.Matsunami, H. Ishii, N. Ueno, S. Kera, "Hole-phonon coupling effect on the band dispersion of organic molecular semiconductors", *Nat. Commun.* **8** 173-179 (2017).
- 4) M. Schwarze et. al., "Molecular Parameters Responsible for Thermally Activated Transport in Doped Organic Semiconductors", *Nature Materials* **18**, 242-248 (2019).
- 5) Y. Nakayama et. al., "Widely Dispersed Intermolecular Valence Bands of Epitaxially Grown Perfluoropentacene on Pentacene Single Crystals", *J. Phys. Chem. Lett.* **10**, 1312-1318 (2019).

Functional organic materials (FOM) have recently attracted considerable attention both for fundamental research and device applications because of peculiar properties not found in inorganics and small molecules. However the mechanisms and its origin of various device characteristics are still under debate. Scientific mysteries are raised because people have believed that electronic structure of FOM would be conserved as in an isolated molecule for solid phases due to van der Waals interaction. To reveal characteristics of FOM the key investigation is precise experiments on the electronic structure at various interfaces, including organic-organic and organic-inorganic (metal/semiconductor) contacts. In these systems, the impacts of weak interaction on the electronic structure would appear as small intensity modulation of photoelectron-emission fine features depending on adsorption and aggregation on the surface. By recent development in the instrumental we can assess hidden fine structures in the electronic states, e.g. electron-phonon coupling, quasi-particle states, very small DOS in the HOMO-LUMO gap, narrow band dispersion and dynamic electronic polarization. To elucidate what happens for the FOM at the interface upon weak interaction, an evaluation on the wave-function spread of the electronic states is very important because the interface state of physisorbed system is described to be a delocalized molecular orbital state depending on the weak interaction (from vdW interaction to hybridization). Seeing a modification of electron wave function upon weak electronic coupling as well as strong electron-phonon coupling is central issue on our agenda.



A rich assortment in the structure of functional molecular materials and variety in the photoelectron spectral feature.



## 相対論的電子ビームを用いた光発生 Light Source Developments by Using Relativistic Electron Beams

加藤 政博(特任教授)  
KATOH, Masahiro

1981年東北大学理学部卒、  
1986年東京大学大学院理  
学系研究科中退、理学博士。  
高エネルギー加速器研究機  
構物質構造科学研究所助手  
を経て2000年3月分子科学  
研究所助教授、2004年1月  
より分子科学研究所教授、  
2019年4月より現職および  
広島大学教授。

TEL: 0564-55-7206  
mail: mkatoh@ims.ac.jp

1982 B.S. Tohoku University  
1997 Ph.D. Tohoku University  
1986 Research Associate,  
National Laboratory for  
High Energy Physics  
2000 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science  
2004 Professor, Institute for  
Molecular Science  
Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies  
2019 Project Professor, Institute  
for Molecular Science  
Professor, Hiroshima  
University

〈Keywords〉  
Accelerator,  
Beam Physics,  
Astrobiology

分子科学研究所の保有する電子加速器UVSORは1980年代前半に建設されたシンクロトロン光源です。周長53m、電子エネルギー7.5億電子ボルトと小型で、テラヘルツ波から軟X線といったシンクロトロン光としては比較的低エネルギー(長波長)の領域を得意とします。何度も改造を経て、現在でも同種の装置の中では世界最高水準の高性能を誇ります。私たちの研究グループでは、このUVSORの性能向上に取り組みながら、高エネルギー電子ビームからの光の放射に関する研究を行っています。

高エネルギー電子が強磁場中を走るときに発する強力な白色光がシンクロトロン光です。テラヘルツ波からX線に至る広大な波長域で高い指向性、偏光特性を有する光です。このシンクロトロン光が本来持っている優れた特性を十分に引き出すには、指向性、強度、安定性に優れた電子ビームが必須です。最新の加速器技術の導入、独自の技術開発により、世界最高水準の高品質電子ビームの生成に取り組んでいます。また、より強力なシンクロトロン光を発生するための挿入型光源と呼ばれる装置の開発にも取り組んでいます。

シンクロトロン光は優れた光源ですが、レーザーのようなコヒーレントな光源ではありません。我々は、レーザーのような特質を持つシンクロトロン光、すなわち、コヒーレントシンクロトロン光の発生に関する研究を進めてきました。シンクロトロン光を光共振器の中に閉じ込め電子ビームと繰り返し相互作用させることでレーザー発振が実現できます。自由電子レーザーと呼ばれる技術です。UVSORでは安定性や強度に優れた共振器型自由電子レーザーの開発を進めてきました。電子ビームと外部から導入したレーザー光を相互作用させることで、テラヘルツ波や真空紫外領域でコヒーレント光を発生することに成功しました。また、レーザー光を電子ビームに衝突させることで、エネルギー可変、偏光可変、超短パルスのガンマ線の発生に成功しました。最近では、電磁放射の時空間構造に着目した研究に力を入れています。光渦と呼ばれる螺旋状の波面を持つ光やベクトルビームと呼ばれる偏光が場所により変化する光など、空間的な構造を持つ放射光の研究を進めています。また、放射光の波の時間構造を利用し、原子の量子状態を制御する研究にも着手しました。

相対論的電子からの光の放射、放射された光の物質との相互作用は、基礎物理学の対象としても興味深く、また、天体物理学、プラズマ物理学から物質科学、生命科学、アストロバイオロジーなど様々な分野において重要な役割を果たします。我々は、幅広い分野の研究者と協力して、光の物理の探求を進めています。

UVSOR is a synchrotron light source providing low energy synchrotron light ranging from terahertz wave to soft X-rays. Although it was constructed in 1980's, its performance is still in the world top level. This is the result of the continuous effort on improving the machine. Our research group has been developing accelerator technologies toward producing bright and stable synchrotron light, such as high brightness electron beam optics, novel insertion devices or state-of-the-art accelerator technologies.

We have been also developing novel light source technologies toward producing photons with excellent properties, such as free electron laser, coherent synchrotron radiation and laser Compton gamma-rays. We are also investigating beam physics which would be the basis of the novel light source technologies. We have demonstrated producing optical vortex beam and optical vector beam from the synchrotron. We are exploring their applications as novel probes for material sciences and their possible roles in nature.

Radiation from relativistic electrons and its interaction with matters are also interesting as subjects of basic physics, astrophysics, plasma physics, materials science, life science including astrobiology. In cooperation with researchers in a wide range of fields, we are exploring new research areas.



UVSOR-III Electron Storage Ring and Synchrotron Radiation Beam-lines.  
The circumference is 53m. The electron energy is 750 MeV. Electrons are circulating in the storage ring at almost the speed of light and radiate intense vacuum ultraviolet light.

### 参考文献

- 1) M. Katoh, M. Fujimoto, H. Kawaguchi, K. Tsuchiya, K. Ohmi, T. Kaneyasu, Y. Taira, M. Hosaka, A. Mochihashi, Y. Takashima, "Angular Momentum of Twisted Radiation from an Electron in Spiral Motion", *Phys. Rev. Lett.* **118**, 094801 (2017).
- 2) Y. Hikosaka, T. Kaneyasu, M. Fujimoto, H. Iwayama, M. Katoh, "Coherent control in the extreme ultraviolet and attosecond regime by synchrotron radiation", *Nat. Commun.* **10** 4988 (2019).



■電子ビーム制御研究部門 Beam Physics and Diagnostics Research

## 高エネルギー電子ビームを用いた 新規量子ビーム源開発と利用研究

Development and Utilization of Novel Quantum Beam Sources  
Using a High Energy Electron Beam

平 義隆(准教授)

TAIRA, Yoshitaka

2007年名古屋大学理学部  
物理学科卒、2009年名古屋  
大学大学院理学研究科博士  
課程前期課程修了、2011年～  
2012年日本学術振興会特別  
研究員(DC2)、2012年名古屋  
大学大学院工学研究科博士  
課程後期課程修了、2012年  
産業技術総合研究所研究員、  
2016年～2018年日本学術振  
興会海外特別研究員、2018年  
産業技術総合研究所主任研究  
員を経て2020年4月より現職。

TEL: 0564-55-7400

mail: yostaira@ims.ac.jp

2007 B.S. Nagoya University  
2009 M.S. Nagoya University

2011- Research Fellowship  
2012 for Young Scientists,  
Japan Society for  
Promotion of Science  
(JSPS)

2012 Ph.D. Nagoya University  
2012 Research Scientist,  
National Institute of  
Advanced Industrial  
Science and Technology  
(AIST)

2016-Overseas Research  
2018 Fellowships, Japan  
Society for Promotion  
of Science (JSPS)

2018 Senior Research  
Scientist, National  
Institute of Advanced  
Industrial Science and  
Technology (AIST)

2020 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

〈Keywords〉

Electron Beams,  
Synchrotron Radiation,  
Gamma-Rays,  
Positrons

人間の目に見える可視光以外にも世の中には沢山の光が存在します。例えば携帯電話やテレビ放送に使われている波長の長い電波、可視光よりも波長の短い紫外線、レントゲン写真で有名な物を透過するX線やガンマ線などが挙げられます。これらの光を人工的に発生するには様々な方法がありますが、私たちのグループでは「電子」を用いた方法を使っています。分子科学研究所にあるUVSORと呼ばれる装置は、電子を光の速さの99.99998%まで加速することができます。このほぼ光速の電子を磁石やレーザーを使ってその軌道を僅かに変えることで様々な波長帯の光を発生することができます。

光には、波長の他に時間的な長さ(パルス幅)や光の電場の偏り具合を表す偏光といった特徴があります。私たちのグループでは、これまでに無い新しい特徴を持つ光をどうすれば発生できるのか、そしてその新しい特徴を活用した利用法を探索する研究を行っています。

一例を挙げると、10兆分の1秒の極めて短時間のパルス幅をもつガンマ線を発生する研究を行っています。ガンマ線はセシウムなどの放射性同位元素から発生する事が良く知られていますが、そういう放射性同位元素からは到底発生することができない特徴をもつガンマ線が高エネルギー電子ビームを用いると発生可能になります。ガンマ線からは対生成と呼ばれる現象によって電子とその反粒子である陽電子が発生します。私たちのグループでは、この陽電子を用いて金属材料や高分子材料内部に存在するナノメートルの欠陥や空隙を分析する技術を開発し、材料の特性改善に関する研究を行っています。




Fig.1: Schematic illustration of 90-degree laser Thomson scattering.

### 参考文献

- 1) Y. Taira, M. Adachi, H. Zen, T. Tanikawa, N. Yamamoto, M. Hosaka, Y. Takashima, K. Soda, M. Katoh, "Generation of energy-tunable and ultra-short-pulse gamma ray via inverse Compton scattering in an electron storage ring", *Nucl. Instr. Meth. A*, **652** (2011) 696.
- 2) Y. Taira, H. Toyokawa, R. Kuroda, N. Yamamoto, M. Adachi, S. Tanaka, M. Katoh, "Photon-induced positron annihilation lifetime spectroscopy using ultrashort laser-Compton-scattered gamma-ray pulses", *Rev. Sci. Instr.*, **84** (2013) 053305.

Our group develop new electromagnetic wave sources using a high energy electron beam. In the UVSOR-III electron storage ring at the Institute for Molecular Science, a 750-MeV electron beam can be generated. Electromagnetic waves in a wide frequency range from ultraviolet waves to gamma-rays are generated by interacting the electron beam with magnetic fields and lasers.

Laser Thomson (Compton) scattering is a method to generate a high energy gamma-ray by the interaction between a high energy electron and a laser. We have developed ultra-short pulsed gamma-rays with the pulse width of sub-ps to ps range by using 90-degree laser Thomson scattering. We applied this ultra-short pulsed gamma-rays to gamma induced positron annihilation lifetime spectroscopy (GiPALS). A positron is an excellent probe of lattice defects in solids and of free volumes in polymers at the sub-nm to nm scale. GiPALS enables defect analysis of a thick material in a few cm because positrons are generated throughout a bulk material via pair production. Our group is conducting research on improving the properties of the material by using GiPALS.




Fig.2: Positron annihilation lifetime spectrum of stainless steel for positron defect measurements (5607-a) supplied by National Metrology Institute of Japan (NMIJ). Measured positron lifetime 108 ps agrees well with the indicative value.

- 3) Y. Taira, T. Hayakawa, M. Katoh, "Gamma-ray vortices from nonlinear inverse Thomson scattering of circularly polarized light", *Scientific Reports*, **7** (2017), 5018.
- 4) Y. Taira, M. Katoh, "Gamma-ray vortices emitted from nonlinear inverse Thomson scattering of a two-wavelength laser beam", *Phys. Rev. A*, **98** (2018) 052130.
- 5) Y. Taira, M. Katoh, "Generation of optical vortices by nonlinear inverse Thomson scattering at arbitrary angle interactions", *The Astrophysical Journal*, **860** (2018) 45.



## 田中 清尚(准教授)

TANAKA, Kiyohisa

2000年東京大学理学部卒業、  
2005年東京大学大学院理学  
研究科博士課程修了、理学  
博士。米国スタンフォード大学  
及びローレンスバークレー  
国立研究所博士研究員、大阪  
大学助教、特任准教授を経て  
現職。

TEL: 0564-55-7202

mail: k-tanaka@ims.ac.jp

2000 B.S. The University of  
Tokyo

2005 Ph.D. The University of  
Tokyo

Postdoctoral Fellow,  
Stanford University and  
Lawrence Berkeley  
National Laboratory

2008 Assistant Professor,  
Osaka University

2013 Associate Professor,  
Osaka University

2014 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

### 〈Keywords〉

Strongly Correlated  
Electron System,  
Synchrotron Light,  
Photoemission

■光物性測定器開発研究部門 Advanced Solid State Physics

# 電子構造の直接観測による 固体物性の発現機構の解明

Angle-Resolved Photoemission Study  
on Strongly Correlated Electron Materials

近年、強相関電子系とよばれる物質群が話題を集めています。これらの物質中では、電子の密度が非常に高いため電子同士が互いに強く相互作用しあっていて、固体物理学の基本理論であるバンド理論では電子の運動を説明できません。そして従来理論の予想を遥かに超えたきわめて多彩で面白い物性、例えば高温超伝導、巨大磁気抵抗、非フェルミ液体などが出現することが最近の研究でわかつてきました。このような、強相関電子系の物質は、電子の電荷・スピン・軌道を制御することで、これまでのエレクトロニクスを凌駕するスピントロニクス、強相関エレクトロニクスの電子デバイスになる可能性を秘めており次世代のエレクトロニクスを担う物質として期待されています。


これらの物性は、物質のフェルミ準位のごく近傍の電子状態が担っていて、その電子状態を観測することは物性発現機構の理解、そして新物性の発見には欠かせません。われわれのグループは、UVSOR-Ⅲのシンクロトロン光を使って、強相関伝導系物質の分光実験を行うことで、電子状態を直接観測する研究を行っています。シンクロトロン光は、テラヘルツ・遠赤外からX線まで切れ目のない連続な光であり、かつ高輝度でかつ偏光特性に優れしており、実験室とは違ったまったく新しい分光実験を行うことができます。また強相関電子系物質では、電子の電荷に加えて、スピンが物性に大きく寄与します。そこで世界に先駆けて、固体中の電子の運動だけでなく、そのスピンの情報まで同時に取得できる分光装置の開発を行っています。

このように新奇機能性を生み出す電子構造を観測するためのシンクロトロン光を使った新しい分光法の開発し、様々な物質の物性の発現機構の解明を目指しています。


### 参考文献

- 1) K. Tanaka, W.S. Lee, D.H. Lu, A. Fujimori, T. Fujii, Risdiana, I. Terasaki, D.J. Scalapino, T.P. Devereaux, Z. Hussain, Z.-X. Shen, "Distinct Fermi-momentum-dependent energy gaps in deeply underdoped Bi2212." *Science* **314**, 1910-1913 (2006).
- 2) W.S. Lee, I.M. Vishik, K. Tanaka, D.H. Lu, T. Sasagawa, N. Nagaosa, T.P. Devereaux, Z. Hussain, Z.-X. Shen, "Abrupt onset of a second energy gap at the superconducting transition of underdoped Bi2212." *Nature* **450**, 81-84 (2007).

Strongly correlated electron materials has attracted more attentions in the last few decades because of their unusual and fascinating properties such as high-T<sub>c</sub> superconductivity, giant magnetoresistance, heavy fermion and so on. Those unique properties can offer a route toward the next-generation devices. We investigate the mechanism of the physical properties as well as the electronic structure of those materials by using angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES), a powerful tool in studying the electronic structure of complex materials, based on synchrotron radiation.



High energy resolution angle-resolved photoemission spectroscopy beamline BL7U at UVSOR synchrotron.



## ■電子構造研究部門 Electronic Structure

# 物質分子科学のための新しい分光法の開発

Exploitation of Novel Spectroscopic Methods  
for Material and Surface Science

### 横山 利彦(教授)

YOKOYAMA, Toshihiko

1983年東京大学理学部卒業、  
1987年同大学大学院理学系  
研究科博士課程中退、理学  
博士。1987年広島大学理学部  
助手、1993年東京大学大学院  
理学系研究科助手、1994年  
同講師、1996年同助教授を  
経て、2002年1月より現職。  
2007年4月～2013年3月分子  
スケールナノサイエンスセン  
ター長、2011年4月～現在  
物質分子科学研究領域主幹、  
2014年9月～2016年3月、  
2018年4月～現在機器セン  
ター長兼任。

TEL: 0564-55-7345

FAX: 0564-55-7448

mail: yokoyama@ims.ac.jp

1983 B.S.The University of  
Tokyo

1985 M.S. The University of  
Tokyo

1990 Ph.D. The University of  
Tokyo

1987 Research Associate,  
Hiroshima University

1993 Research Associate,  
The University of Tokyo

1994 Lecturer, The University  
of Tokyo

1996 Associate Professor,  
The University of Tokyo

2002 Professor, Institute for  
Molecular Science

Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies

#### 〈Keywords〉

X-Ray Absorption  
Spectroscopy,

Surface & Thin Film  
Magnetism,

Ambient Pressure  
Hard X-Ray  
Photoelectron  
Spectroscopy

現代の物質科学は高性能だけでなく安全安心などさまざまな観点から調和のとれた物質材料の創製を求められており、物質材料・素子の特性を詳細に評価・解析し、よりよい物質材料設計を行う必要があります。そのため、物質材料を解析する手法の空間分解能や時間分解能がますます求められています。我々は、主に大型加速器から放射されるX線(シンクロトロン放射光)を用いた分光学的手法に基づいた新しい測定手法の開発とその応用に取り組んでいます。

我々は、2017年に大気圧下でのX線光電子分光測定に世界で初めて成功しました。光電子分光法は、通常高真空中での測定が必須ですが、エネルギーの大きい硬X線を用いることなどで、1気圧までの測定が可能な光電子分光装置が開発できました。これを用いて、燃料電池の動作下での状態解析により性能の失活機構や被毒の原因究明を行っています。

また、X線自由電子レーザーを用いた高速時間分解軟X線吸収分光測定を手掛けており、100フェムト秒以下の時間分解能で磁性薄膜の高速磁化反転ダイナミクス解析を行い、元素による磁化反転時間の相違の検証などに成功しています。


For the developments of novel functional materials, it is quite important to exploit simultaneously new analytical methods based on advanced technology. Novel materials and devices often require spatial and/or time resolved analysis to optimize their qualities. In our group, we have been exploiting spectroscopic methods for material and surface science using mainly synchrotron radiation (SR) and partly lasers.

The present first subject is the exploitation of ambient pressure hard x-ray photoelectron spectroscopy (HAXPES) and its application to polymer electrolyte fuel cells (PEFC) under working conditions. In 2017, we succeeded in the HAXPES measurement under real ambient pressure of  $10^5$  Pa for the first time in the world. We are investigating working PEFC by the technique for the elucidation of degradation and/or poisoning mechanisms of PEFC to improve its performance with longer life time.


The second subject is the ultrafast (<100 fs) time resolved soft x-ray absorption measurements of spin dynamics in magnetic thin films in order to understand element-specific magnetization reversal mechanisms.

#### 参考文献

- 1) "Operando Observation of Sulfur Species Poisoning Polymer Electrolyte Fuel Cell Studied by Near Ambient Pressure Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy" L. Yu, Y.Takagi, T.Nakamura, T.Sakata, T.Uruga, M.Tada, Y. Iwasawa, S. Masaoka, and T. Yokoyama, *J. Phys. Chem. C* **123**, 603 (2019).
- 2) "X-ray photoelectron spectroscopy under real ambient pressure conditions" Y. Takagi, T. Nakamura, L. Yu, S. Chaveanghong, O. Sekizawa, T. Sakata, T. Uruga, M. Tada, Y. Iwasawa and T. Yokoyama, *Appl. Phys. Exp.* **10**, 076603 (2017).
- 3) "Dynamics of Photoelectrons and Structural Changes of Tungsten Trioxide Observed by Femtosecond Transient XAFS" Y. Uemura, D. Kido, Y. Wakisaka, H. Uehara, T. Ohba, Y. Niwa, S. Nozawa, T. Sato, K. Ichiyangi, R. Fukaya, S. Adachi, T. Katayama, T. Togashi, S. Owada, K. Ogawa, M. Yabashi, K. Hatada, S. Takakusagi, T. Yokoyama, B. Ohtani, and K. Asakura, *Angew. Chem. Int. Ed.* **55**, 1364 (2016).
- 4) "Anharmonicity and Quantum Effects in Thermal Expansion of an Invar Alloy" T. Yokoyama and K. Eguchi, *Phys. Rev. Lett.* **107**, 065901 (2011).
- 5) "Magnetic circular dichroism near the Fermi level" T. Nakagawa and T. Yokoyama, *Phys. Rev. Lett.* **96**, 237402 (2006).



Ambient pressure hard x-ray photoelectron spectroscopic system. (a) Apparatus installed at SPring-8 Beamline 36XU. (b) Front cone with a 30-μm aperture of the electron energy analyzer, made by Equipment Development Center, IMS. (c) Au 4f HAXPES of Au(111) at a real ambient pressure of  $10^5$  Pa. (d) S 1s HAXPES of polymer electrolyte fuels cells under working conditions of the cathode-anode voltages of 0.0, 0.8 and 1.2 V.



## ■電子構造研究部門 Electronic Structure

# 固体表面における分子集合体の特異的な構造物性・化学的機能・量子ダイナミクスの探求

Unique Structures, Physicochemical Properties and Quantum Dynamics of Molecular Aggregates at Solid Surfaces

## 杉本 敏樹(准教授)

SUGIMOTO, Toshiki

2007年京都大学理学部卒、  
2011年東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻博士課程修了、工学博士。日本学術振興会特別研究員(DC2・PD)、京都大学大学院理学研究科化学専攻助教、JSTさきがけ研究員を経て現職。  
2016年科学技術振興機構さきがけ研究者(革新的触媒領域)兼務(2020年3月まで)。2019年科学技術振興機構さきがけ研究者(革新的光技術領域)兼務(2023年3月まで)。

TEL: 0564-55-7280

mail:  
toshiki-sugimoto@ims.ac.jp

2007 B.S., Kyoto University

2011 Ph.D., The University of Tokyo (Doctor of Engineering)

Research Fellowship for Young Scientists (DC2・PD), Japan Society for the Promotion of Science

2012 Assistant Professor, Kyoto University

2016-PRESTO Researcher 2020 (innovative catalysis), Japan Science and Technology Agency

2018-Associate Professor, Institute for Molecular Science

2019-PRESTO Researcher (innovative photonic technology), Japan Science and Technology Agency

### 〈Keywords〉

Water Molecule,  
Molecular Spectroscopy,  
Surface Science

固体の表面は固体の内部とは異なる構造を有しているため、物性や化学機能、量子ダイナミクス等を支配する電子の状態は表面と内部とでは全く異なるものになります。この固体表面は気相や液相にある原子・分子が固体と出会う重要な場を提供しています。原子や分子が表面に吸着して固体と相互作用する際には、気相や液相では発見しない新奇な物性や化学機能が創発されることがしばしばあります。こうした固体表面における特異な現象は、我々の身近なところでは「触媒・腐食・接着などの化学反応」や「光触媒・燃料電池・太陽電池などのエネルギー変換」において実生活とも密接に関わっています。

私たちは、水素、メタン、水分子などの身近な軽分子に興味を持ち、実用物質の不均一な表面やナノレベルで構造を規定・制御したモデル固体表面に吸着・凝集した分子集合体がどのようなメカニズムで特異的な構造物性や化学機能、量子ダイナミクスを発現させているのかを解明することを目指しています<sup>1-5)</sup>。多体の相互作用によって発現する複雑な固体表面現象を素過程のレベルから微視的に明らかにするために、赤外光や可視光に加えて紫外光やX線といった様々なエネルギー領域の光(連続光・パルスレーザー光)や電子線、走査型顕微鏡を用いた最先端の表面分光研究・物理化学研究に挑戦しています(Figs.1, 2)。また、従来の実験方法では観測自体が不可能であった“水素(水素結合ネットワーク中のプロトン)の局所構造”を可視化するための“革新的な表面顕微分光計測法”を開発することにも世界に先駆けて挑戦しています。

水分子の集合体が関与する固体表面現象は、物理学・化学・工学・生物学・地学といった広い範囲の分野において基礎・応用の両観点で極めて重要な研究対象です。私たちは、22世紀につながる人類の知見・基礎学理を構築することを目指し、このように学術的・実学的に興味深い固体表面現象をナノレベルの目線で解き明かす基礎研究を展開しています。

### 参考文献

- 1) K. Shirai, G. Fazio, T. Sugimoto et al., Water-assisted hole trapping at highly curved surface of nano-TiO<sub>2</sub> photocatalyst, *J. Am. Chem. Soc.* **140**, 1415 (2018).
- 2) T. Sugimoto et al., Inelastic Electron Tunneling Mediated by Molecular Quantum Rotator, *Phys. Rev. B* **96**, 241409(R) (2017).
- 3) T. Sugimoto et al., Emergent high-Tc ferroelectric ordering of strongly correlated and frustrated protons in heteroepitaxial ice film, *Nature Physics* **12**, 1063 (2016).
- 4) K. Shirai, T. Sugimoto et al., Effect of Water Adsorption on Carrier Trapping Dynamics at the Surface of Anatase TiO<sub>2</sub> Nanoparticles. *Nano Lett.* **16**, 1323 (2016).

Surfaces and interfaces are the places where the spatially isolated electrons in molecules meet delocalized ones in substrates such as metals. Under such circumstances, molecules behave very differently from those in gas and liquid phases. Unexpected molecular processes sometimes take place at surfaces and interfaces. There are many important applications where surfaces/interfaces play an important role, such as photovoltaic application for energy conversion and catalytic application for chemical reaction. These all depend on specific many-body complex interactions that are not always fully understood. Our ultimate aim is to elucidate such cooperative interactions at the molecular level.

By using state-of-the-art molecular spectroscopy in combination with sophisticated surface scientific techniques, we have elucidated unique structures, physical properties, chemical functions, and quantum dynamics of hydrogen, water molecules and their assemblies at surfaces/interfaces of solid materials<sup>1-5)</sup>. In addition, we are challenging to develop innovative microspectroscopy with atomic resolution for directly observing the local structure of protons in the unique hydrogen-bond network of water molecular aggregates at solid surfaces/interfaces.




Fig. 1 Infrared-visible sum-frequency-generation (SFG) spectroscopy of water molecules on solid surface <sup>3)</sup>.




Fig. 2 Unimolecular inelastic-electron-tunneling (IET) spectroscopy of quantum rotator on solid surface <sup>2)</sup>.

- 5) T. Sugimoto et al., Nuclear Spin Dynamics of Molecular Hydrogen Adsorbed on Solid Surfaces –Interdisciplinary Surface Electromagnetic Process-. *J. Phys. Soc. Jpn.* **71**, 668 (2016).



## ■分子機能研究部門 Molecular Functions

# 有機太陽電池 Organic Solar Cells

### 平本 昌宏(教授)

HIRAMOTO, Masahiro

1984年大阪大学大学院基礎工学研究科化学系博士課程中退、84年分子科学研究所文部技官、88年大阪大学工学部助手、97年大阪大学大学院工学研究科准教授を経て、2008年より現職。専門:有機半導体の光電物性と太陽電池、デバイス応用。

TEL: 0564-59-5537

mail: hiramoto@ims.ac.jp

1984 Osaka University,  
Faculty of Engineering  
Science

1986 Ph.D. (Engineering)  
Osaka University

1984 Institute for Molecular  
Science, Technical  
Associate

1988 Faculty of Engineering,  
Osaka Univ., Research  
Associate

1997 Faculty of Engineering,  
Osaka Univ., Associate  
Professor

2008 Professor, Institute for  
Molecular Science

Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies

### 〈Keywords〉

Organic Semiconductors,  
Organic Solar Cells,  
ppm-Doping

エネルギー問題の解決は科学者の責務です。特に、我が国において、エネルギー資源がない状況は、明治維新から現在に至るまで全く変わっておらず、先の大戦、3.11の原子力災害のような、悲劇的で大きな歴史の転換は、常にエネルギーをめぐって起こっています。太陽電池は我が国のエネルギー自給の切り札となります。また、「エネルギーを制するものは世界を制する」との言葉にあるように、石油に代わって、21世紀の世界の基幹産業になります。

以上の考えに基づき、平本グループでは、次世代太陽電池の有力候補である、有機太陽電池の研究を行っています。

有機太陽電池は、最近スマホ画面にもなっている有機ELの太陽電池版です。有機太陽電池は、軽量なフレキシブルシートの形で、印刷によって新聞のように大量安価に作れ、屋根、壁、窓にはりつけたり、自動車にベンキのように塗って使うなど、これまでのシリコン太陽電池とはちがつた全く新しい使い方になります。

平本は、1991年に、有機ブレンド接合(図1)のコンセプト<sup>1)</sup>を世界に先がけて提案し、有機太陽電池はこの構造をつかっています。また、1990年に、有機タンデム接合を世界で初めて提案し<sup>2)</sup>、近年の最高変換効率は有機タンデム接合セルによるものです。

有機太陽電池の分野でブレイクスルーを起こすには、有機半導体の物性物理学の深い理解に基づいて、太陽光によって生じる電流、電圧を大きくしていく必要があります<sup>3),5)</sup>。最近、有機単結晶太陽電池の研究で大きな成果を発表しました<sup>4)</sup>。若い人たちが、この研究に加わっていただくことを期待しています。

### 参考文献

- 1) M. Hiramoto, H. Fujiwara, M. Yokoyama, "Three-layered organic solar cell with a photoactive interlayer of codeposited pigments", *Appl. Phys. Lett.*, **58**, 1062-1064 (1991).
- 2) M. Hiramoto, M. Suezaki, M. Yokoyama, "Effect of thin gold interstitial-layer on the photovoltaic properties of tandem organic solar cell", *Chem. Lett.*, **1990**, 327-330 (1990).
- 3) M. Hiramoto, M. Kikuchi, S. Izawa, "Parts-per-Million-Level Doping Effects in Organic Semiconductor Films and Organic Single Crystals", *Adv. Mater.*, **30**, 1801236 (15 pages) (2018) (Invited Progress Report).
- 4) C. Ohashi, S. Izawa, M. Hiramoto et al., "Hall effect in bulk-doped organic single crystal", *Adv. Mater.*, **29**, 1605619 (2017).
- 5) N. Shintaku, M. Hiramoto, S. Izawa, "Effect of trap-assisted recombination on open-circuit voltage loss in phthalocyanine/fullerene solar cells", *Org. Electron.*, **55**, 69-74 (2018).

Organic solar cells have been intensively studied due to many advantages like flexible, printable, light, low-cost, fashionable, etc. In 1991, Hiramoto invented "blended junction" (Fig. 1)<sup>1)</sup> and "tandem junction"<sup>2)</sup> of organic solar cells, which are fundamental concepts in the present organic solar cells. We have been focused on the establishment of "bandgap science for organic solar cells."<sup>3)</sup> We believe that the following features are indispensable. (i) A ppm-level doping strategy should be applied to sub-ppm purified organic semiconductors for the complete removal of uncontrollable doping by oxygen from the air. (ii) Complete pn-control, i.e., the observation that every single and blended organic semiconductor shows both n- and p-type characteristics by impurity doping alone, should be achieved. (iii) Doping in the bulk of organic single crystals without grain boundaries is necessary for precise clarification of the nature of the doping effects.

Recently, we have succeeded the fabrication of ppm-level doped organic single crystals and measurements of their Hall effects using our original ultra-slow deposition technique at a rate of 10<sup>-9</sup> nm/s (Fig. 2)<sup>4)</sup>. This is a foundation for the first organic single crystal solar cells.

We fervently hope that young researchers will take up the challenge of working in the interdisciplinary field of organic solar cells to help develop the next generation of cells for renewable energy.




Fig. 1 Concept of blended junction.




Fig. 2 ppm-doped organic single crystal (AFM) formed by ultra-slow deposition of 10<sup>-9</sup> nm/s having a rotating shutter.



## ■分子機能研究部門 Molecular Functions

# 固体核磁気共鳴法による生体分子・分子材料の解析 Solid-State NMR for Molecular Science

西村 勝之(准教授)  
NISHIMURA, Katsuyuki

1994年兵庫県立姫路工業大学理学部(現・兵庫県立大学)卒業、1999年同大学大学院理学研究科博士課程終了・理学博士。米国立高磁場研究所、フロリダ州立大学博士研究員、横浜国立大学工学研究院助手を経て、2006年4月より現職。  
TEL: 0564-55-7415  
FAX: 0564-55-7415  
mail: nishimur@ims.ac.jp

1994 B.S. Himeji Institute of Technology  
1999 Ph.D. Himeji Institute of Technology

1999 Postdoctoral Fellow,  
Florida State University,  
National High Magnetic Field Laboratory  
2001 Assistant Professor,  
Yokohama National University

2006 Associate Professor,  
Institute for Molecular Science

Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

### 〈Keywords〉

Solid State NMR,  
Biomolecules,  
Developments

核磁気共鳴法(NMR)は原子核の持つ磁気モーメントが磁場中で小さい磁石として振舞う性質を利用して、測定対象にラジオ波領域の電磁波を照射することにより非破壊で物質内部の分子の詳細な構造や運動性に関する原子分解能での情報を得ることができます。固体NMRは物理学者によってその基礎が築かれ、物理化学者によって化学的情報を得る手段として方法論が発展してきました。固体NMRは結晶や液晶から、粉末のようなアモルファス試料や粘性の高い液状試料まで非常に多様な物質に対して適用可能であり、特に生体分子への適用が注目されています。

当研究グループでは分子に関する様々な情報を得るために新規固体NMR測定法の開発を行っています。NMRで観測する内部相互作用には、静磁場に対する分子の相対角度を変化させる空間項の変調および、特定の強度、時間間隔でのラジオ波照射により核スピニ角運動量項への外部摂動を与えることが可能です。そのため、これらの外部摂動を適切に組み合わせる実験をデザインして特定の内部相互作用を選択的に消去、復活させることができます。それら内部相互作用の精密な観測、解析により原子間距離や角度情報等の分子の幾何情報を得ることができます。さらに緩和時間やスペクトル線形解析から特定の時間領域の分子運動性を同定することができます。


これまで、分子の立体構造決定に有効な精密原子間距離測定法の原理的な問題の解析<sup>1)</sup>、低発熱型感度向上法<sup>2)</sup>、および角度測定法の開発<sup>3)</sup>を行いました。さらに脂質との相互作用により機能する膜タンパク質として、インフルエンザウイルスA由来の<sup>1</sup>Hチャンネル<sup>4)</sup>、膜表在性タンパク質fosfolipase C-δ1 PH domain<sup>5)</sup>、amyloid-β oligomers induced on lipid membranes<sup>6)</sup>。Furthermore, as studies for material science, we have been working for characterizations of variety of molecular materials such as silk<sup>7)</sup>, and supramolecules based on synthetic polymers<sup>8)</sup> through collaborations with several research groups.

### 参考文献

- 1) K. Nishimura\*, A. Naito.“REDOR in Multiple Spin System”, *Modern Magnetic Resonance*, Springer, The Netherlands (2006).
- 2) K. Nishimura\*, A. Naito, *Chem. Phys. Lett.* **380**, 569-576 (2003).
- 3) K. Nishimura\*, A. Naito, *Chem. Phys. Lett.* **402**, 245-250 (2005).
- 4) K. Nishimura, S. Kim, L. Zhang, T. A. Cross, *Biochemistry*. **41**, 13170-13177 (2002).
- 5) N. Uekama, T. Aoki, T. Maruoka, S. Kurisu, A. Hatakeyama,

In order to elucidate functions of molecules, characterizations of the molecules are essential. There are varieties of important molecules, which are insoluble to any solvents and functional at amorphous state. Solid-state NMR enables to obtain variety of information at atomic resolution without damages of molecules and significant restrictions. Thus, solid-state NMR is one of the essential tools for the characterizations of those molecules.

We have been working for methodology developments of solid-state NMR such as the analyses of error factors of precise distance measurements<sup>1)</sup>, the developments of techniques for sensitivity enhancement without sample heating<sup>2)</sup> and 2D correlation techniques to obtain orientational information of molecules<sup>3)</sup>. In addition, as studies for structural biology, we have been working for functional and structural characterizations of membrane proteins and peptides such as <sup>1</sup>H channel from influenza virus A<sup>4)</sup>, a peripheral membrane protein of phospholipase C-δ1 PH domain<sup>5)</sup>, and amyloid-β oligomers induced on lipid membranes<sup>6)</sup>. Furthermore, as studies for material science, we have been working for characterizations of variety of molecular materials such as silk<sup>7)</sup>, and supramolecules based on synthetic polymers<sup>8)</sup> through collaborations with several research groups.




Outline of our studies.

S. Yamaguchi, M. Okada, H. Yagisawa, K. Nishimura\*, S. Tuzi\*, *Biochim. Biophys. Acta* **1788**, 2575-2583 (2009).

6) M. Yagi-Utsumi, K. Kato, and K. Nishimura\*, *PlosONE* **11**, 0146405 (1-10) (2016).

7) T. Asakura, T. Ohota, S. Kometani, K. Okushita, K. Yazawa, Y. Nishiyama, K. Nishimura, A. Aoki, F. Suzuki, H. Kaji, A. Ulrich, M. Williamson, *Macromolecules* **48**, 28-36 (2015).

8) N. Ousaka, F. Mamiya, Y. Iwata, K. Nishimura, and E. Yashima, *Angew. Chem. Int. Ed.* **56**, 791-795 (2017).



## ■分子機能研究部門 Molecular Functions

# 次世代電気化学デバイスの創出に向けた新物質探索 Materials Science for Creation of Novel Electrochemical Devices

### 小林 玄器(准教授)

KOBAYASHI, Genki

2006年金沢大学工学部卒業、  
2008年東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了、  
2010年博士課程修了、博士(理学)。2010年同産学官連携研究員、2011年神奈川大学助教、2013年分子科学研究所特任准教授(若手独立フェロー)を経て、2018年4月より現職。2012年10月～2016年3月科学技術振興機構さきかけ「新物質科学と元素戦略」さきかけ研究者兼任。

TEL: 0564-55-7440

mail: gkobayashi@ims.ac.jp

2006 Kanazawa University

2008 Tokyo Institute of Technology, Master of Engineering

2010 Tokyo Institute of Technology, Doctor of Science

Postdoctoral Fellow,  
Tokyo Institute of Technology

2011 Assistant Professor,  
Kanagawa University

2012 PRESTO Researcher (Additional post),  
Japan Science and Technology Agency (-2016)

2013 Research Associate Professor, Institute for Molecular Science

2018 Associate Professor, Institute for Molecular Science

### 〈Keywords〉

Solid State Ionics,

Oxyhydride,

Battery


持続可能なエネルギー社会の実現に向け、電気化学反応を利用した蓄電・発電の重要性が高まっています。現在、リチウム二次電池や燃料電池を越える次世代のエネルギーデバイスを目指した研究が盛んにおこなわれていますが、実現には、既存の研究開発と並行して新物質創製に基づいた新規デバイスを開発する試みが必要になります。これまでH<sup>+</sup>, O<sup>2-</sup>, Li<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>などのイオンを利用した燃料電池や蓄電池の開発が行われてきましたが、新たなイオンを電荷担体とする電極や固体電解質材料が出現すると、全く新しい作動原理をもつエネルギーデバイスの可能性が拓かれます。我々のグループでは、水素のアニオンであるヒドリド(H<sup>-</sup>)に着目し、H<sup>-</sup>導電性を有する固体電解質や電極材料の探索をおこなっています。

一般的に、イオンの動き易さを決める代表的な指標として、価数、大きさ、潰れやすさ(分極率)があり、1価で適度なイオン半径を持ち、分極率の大きなH<sup>-</sup>は高速イオン導電に適しています。また、H<sup>-</sup>は、二次電池への応用が検討されているMgと同程度の酸化還元電位( $E^\circ = -2.25$  V vs. SHE)を有することから、H<sup>-</sup>を電荷担体に利用し、H<sup>-</sup>の酸化還元電位を活かした蓄電・発電反応を構築することができれば、高エネルギー密度を得られると期待できます。また、1価のイオンでありながらH<sup>-</sup>からH<sup>+</sup>への二電子反応が可能な唯一のイオンであり、様々な化学反応に応用できる可能性もあります。最近、我々の研究グループでは、H<sup>-</sup>とO<sup>2-</sup>が結晶格子内に共存する酸水素化物という物質群を対象に物質探索を行い、H<sup>-</sup>導電性の固体電解質として機能するLa<sub>2-x-y</sub>Sr<sub>x+y</sub>LiH<sub>1-x+y</sub>O<sub>3-y</sub>(以下LSLHO)の開発に成功しました。さらに、LSLHOを固体電解質に用いることでH<sup>-</sup>を電荷担体とする電池反応を世界に先駆けて見いだし、H<sup>-</sup>導電を利用して電気化学デバイスの開発可能性を示しました。我々は、この研究結果を基に、H<sup>-</sup>が結晶内を高速で拡散するH<sup>-</sup>超イオン導電体などの新物質の探索やH<sup>-</sup>導電を活用した新型電気化学デバイスの開発をおこなうと同時に、H<sup>-</sup>の導電機構の解明など、H<sup>-</sup>導電体に関する学理を構築する研究に挑んでいきます。

### 参考文献

- 1) F. Takeiri, A. Watanabe, A. Kuwabara, H. Nawaz, N. Ayu, M. Yonemura, R. Kanno and G. Kobayashi\*, "Ba<sub>2</sub>SCH<sub>0.5</sub>: H<sup>-</sup> Conductive Layered Oxyhydride with H<sup>-</sup> Site Selectivity," *Inorg. Chem.* **58**, 4431-4436 (2019).
- 2) N. Matsui, G. Kobayashi\*, K. Suzuki, A. Watanabe, A. Kubota, Y. Iwasaki, M. Yonemura, M. Hirayama, R. Kanno\*, "Ambient pressure synthesis of La<sub>2</sub>LiHO<sub>3</sub> as a solid electrolyte for a hydrogen electrochemical cell," *J. Am. Ceram. Soc.* **102**, 3228-3235 (2019).

Chemical energy conversion/storage using electrochemical devices such as fuel cells and batteries will become increasingly important for future sustainable societies. Recently, many research for advanced electrochemical devices beyond Li secondary batteries and fuel cells have been actively carried out all over the world. A breakthrough of core materials used as electrodes and electrolytes is required to open up the frontier in the electrochemical devices. An injection of new ion conduction phenomenon is one of the dominant candidates for the creation of novel battery systems. We focus on hydride ions (H<sup>-</sup>) as a candidate of charge carriers for energy devices. In this context, we aim to synthesize new materials possessing hydride ion (H<sup>-</sup>) conductivity, and to create a novel battery system utilizing both the H<sup>-</sup> conduction phenomenon and the H<sup>-</sup>/H<sub>2</sub> redox reaction.



Crystal structures of La<sub>2-x-y</sub>Sr<sub>x+y</sub>LiH<sub>1-x+y</sub>O<sub>3-y</sub> ( $x = 0, y = 0, 1, 2$ ). The coordination environment around lithium ions continuously changes with a change in the O/H<sup>-</sup> ratio. The four axial sites of the Li-anion octahedra (anion sites in Li-anion planes perpendicular s-axis) prefer to be occupied by H<sup>-</sup>.

- 3) Y. Iwasaki, N. Matsui, K. Suzuki, Y. Hinuma, M. Yonemura, G. Kobayashi, M. Hirayama, I. Tanaka and R. Kanno\*, "Synthesis, crystal structure, and ionic conductivity of hydride ion-conducting Ln<sub>2</sub>LiHO<sub>3</sub> ( $Ln = La, Pr, Nd$ ) oxyhydrides," *J. Mater. Chem. A* **6**, 23457-23463 (2018).
- 4) A. Watanabe, G. Kobayashi\*, N. Matsui, M. Yonemura, A. Kubota, K. Suzuki, M. Hirayama, R. Kanno, "Ambient pressure synthesis and H<sup>-</sup> conductivity of LaSrLiH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>," *Electrochim. Acta* **85**, 88-92 (2017).
- 5) G. Kobayashi\*, Y. Hinuma, S. Matsuoka, A. Watanabe, I. Muhammad, M. Hirayama, M. Yonemura, T. Kamiyama, I. Tanaka and R. Kanno\*, "Pure H<sup>-</sup> Conduction in Oxyhydrides," *Science* **351**, 1314-1317 (2016).
- 6) G. Kobayashi\*, Y. Irii, F. Matsumoto, A. Ito, Y. Ohsawa, S. Yamamoto, Y. Cui, J.-Y. Son and Y. Sato, "Improving Cycling Performance of Li[Li<sub>0.2</sub>Ni<sub>0.18</sub>Co<sub>0.03</sub>Mn<sub>0.58</sub>]O<sub>2</sub> through Combination of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-based Surface Modification and Stepwise Pre-cycling," *J. Power Sources* **303**, 250-256 (2016).



## 生体分子機械の作動原理、設計原理の徹底的理解 Operation and Design Principles of Biological Molecular Machines

飯野 亮太(教授)

IINO, Ryota

1995年京都大学工学部卒、  
1997年京都大学大学院工学  
研究科修了、2000年名古屋大  
学大学院理学研究科単位取  
得退学、2003年博士(理学)。  
2000年～2005年科学技術振  
興機構研究員、2005年～2011  
年大阪大学産業科学研究所  
特任助手、助手、助教、2011年～  
2014年東京大学大学院工学研  
究科講師、准教授を経て2014年  
6月より現職。

mail: iino@ims.ac.jp

1995 B.E. Kyoto University

1997 M.E. Kyoto University

2003 Ph.D. Nagoya University

2000 Research Associate,  
Japan Science and  
Technology Cooperation

2002 Research Associate,  
Japan Science and  
Technology Agency

2005 Specially-appointed  
Assistant Professor,  
Osaka University

2006 Assistant Professor,  
Osaka University

2011 Lecturer, The University  
of Tokyo

2013 Associate Professor,  
The University of Tokyo

2014 Professor, Okazaki  
Institute for Integrative  
Bioscience

Professor, Institute for  
Molecular Science

Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies

〈Keywords〉

Molecular Machines,

Molecular Motors,

Protein Engineering,

Single-Molecule Analysis

生命活動は進化の過程で創られた分子機械が支えています<sup>2)</sup>。タンパク質でできた生体分子機械は、2016年ノーベル化学賞で話題となった人工分子機械よりも遥かに優れた機能を発揮しますが、人工分子機械のように人間が自在に設計することはまだできません。私たちは、個々の生体分子機械の動きや形を観る、天然にない生体分子機械を創る方法を開発する、といったアプローチで、その作動原理と設計原理を明らかにします。

1. 生体分子機械に学ぶ: 私たちは生体分子機械の作動原理を解明します。生体分子機械の代表例は、入力エネルギーを一方向性の運動に変換する分子モーターです。私たちはリニア分子モーター<sup>3), 5-7)</sup>や回転分子モーター<sup>9-11)</sup>を研究しています。例えば、バイオ燃料の原料となる結晶性多糖を分解するキチナーゼ<sup>3), 5), 6)</sup>、セルラーゼは一方向に運動するリニア分子モーターです。駆動力はATPではなくレールである多糖の分解のエネルギーで、ミオシン、キネシൻ等の従来のリニア分子モーターとは作動原理が全く異なります。また回転分子モーターV-ATPaseは<sup>9-11)</sup>、力学的回転を介してATPの化学エネルギーとイオンの電気化学ポテンシャルを相互変換することができます。これらは人工分子機械には達成できていない高度な機能です。

2. 生体分子機械を創る: 私たちは天然に存在しない新しい生体分子機械を創ることにチャレンジしています<sup>13), 14)</sup>。生体分子機械には基本構造がよく似たもののが存在します。AAA+ファミリーはその代表例で<sup>10)</sup>、V-ATPaseもこのファミリーに属します。特筆すべきは、似た構造なのに機能は多彩な点です。計算科学による合理設計や網羅的変異体作製を駆使し、V-ATPase、セルラーゼ、キチナーゼなどを積極的に改造して多彩な機能を発揮する設計原理を理解します。

3. 生体分子機械の機能を調べる、形を調べる: 私たちは1分子計測法を生体分子機械の機能解析に駆使します<sup>16), 17)</sup>。プラズモニッカノプローブを用いた高速・高位置決定精度1分子計測の開発等を行っています。また、生体分子機械の形を調べるX線結晶構造解析も行っています。

参考文献


- 1) Iino R, et al., *Chem. Rev.* **120**: 1-4 (2020).
- 2) Iino R, et al., *BBA General Subjects* **1862**: 241-252 (2018).
- 3) Nakamura A, et al., *Nat. Commun.* **9**: 3814 (2018).
- 4) Visootsat A, et al., *J. Biol. Chem.* **295**: 1915-1925 (2020).
- 5) Nakamura A, et al., *PCCP* **20**: 3010-3018 (2018).
- 6) Nakamura A, et al., *J. Biol. Chem.* **291**: 22404-22413 (2016).
- 7) Isojima H, Iino R, et al., *Nat. Chem. Biol.* **12**: 290-297 (2016).
- 8) Ando J, et al., *Sci. Rep.* **10**: 1080 (2020).
- 9) Tsunoda J, et al., *Sci. Rep.* **8**: 15632 (2018).

Activity of life is supported by molecular machines made of proteins<sup>2)</sup>. Protein molecular machines are far superior to synthetic molecular machines in many aspects. We elucidate operation and design principles of protein molecular machines.

1. Understand biomolecular machines: Molecular motors are representative of the protein molecular machines. Molecular motors generate mechanical forces and torques driving unidirectional motions from the energy of chemical reaction or the potential energy. We are studying linear<sup>3), 5-7)</sup> and rotary motors<sup>9-11)</sup>. Especially, we focus on new molecular motors such as chitinase<sup>3), 5), 6)</sup>, cellulase, and V-ATPase.

2. Engineer biomolecular machines: Many biomolecular machines have similar structures, implying same evolutionary origin. AAA+ family is one of the representatives<sup>10)</sup>. Rotary molecular motor V-ATPase also belongs to this family. Interestingly, the AAA+ molecular machines show wide variety of functions. We engineer non-natural biomolecular machines with new functions<sup>13), 14)</sup>.

3. Investigate functions and structures of biomolecular machines: Our study is based on state-of-the-art single-molecule techniques<sup>16), 17)</sup>. We are developing single-molecule methods such as high-speed and high-localization precision measurements with plasmonic nanoprobes. We also determine crystal structures of biomolecular machines by X-ray crystallography.



Protein molecular machines

- 10) Iino R, et al., *Curr. Opin. Struct. Biol.* **31**: 49-56 (2015).
- 11) Ueno H, Minagawa Y, et al., *J. Biol. Chem.* **289**: 31212-31223 (2014).
- 12) Iida T, et al., *J. Biol. Chem.* **2019** **294**: 17017-17030 (2019).
- 13) Kawai F, et al., *ACS Omega* **3**: 7715-7726 (2018).
- 14) Baba M, et al., *PNAS* **113**: 11214-11219 (2016).
- 15) Ando J, et al., *ACS Photonics* **6**: 2870-2883 (2019).
- 16) Ando J, et al., *Biophys. J.* **115**: 2413-2427 (2018).
- 17) Uchihashi T, et al., *Nat. Commun.* **9**: 2147 (2018).



## ■錯体触媒研究部門 Complex Catalysis

# 有機分子変換を駆動・制御する 新しい反応システムの構築 Development of Heterogeneous Catalysis toward Ideal Chemical Processes

魚住 泰広(教授)

UOZUMI, Yasuhiro

1984年北海道大学薬学部卒、  
1990年薬学博士。日本学術  
振興会特別研究員、北海道  
大学教務職員、同助手、米国  
コロンビア大学研究員、京都  
大学講師、名古屋市立大学  
教授を経て2000年より現職。  
TEL: 0564-59-5571  
FAX: 0564-59-5574  
mail: uo@ims.ac.jp

1984 B.S. Hokkaido University  
1990 Ph.D. Hokkaido University  
1988 JSPS fellow  
1988 Research Associate, Hokkaido University  
1990 Assistant Professor, Hokkaido University  
1994 Research Associate, Columbia University  
1995 Lecturer, Kyoto University  
1997 Professor, Nagoya City University  
2000 Professor, Institute for Molecular Science  
Professor, The Graduate University for Advanced Studies  
2002- Professor (adhoc),  
2005 Kyoto University  
2007- Research team leader.  
2017 RIKEN  
2010- Professor (adhoc), Tokyo  
2012 Institute of Technology  
2018- ACCEL Project Leader,  
2019 RIKEN

2014- Distinguished Professor, Three George University  
2003- Research Project Leader, JST CREST Project on Green Catalysis  
2008- Research Project Leader, 2012 NEDO Project on Green Chemical Processes  
2011- Deputy Research Project Leader, JST CREST Project on Element Strategy  
2014- Research Project Leader, JST ACCEL Project on Hyper-Active Catalysis

〈Keywords〉

Transition Metal Catalysts,  
Green Chemistry,  
Organic Synthesis


人類が化学を体系づける遙か太古の昔から生命は精緻な化学分子変換を実現しています。それら生命化学反応は中性、常圧、常温、水中で高い選択性を伴って進行します。我々は理想的な化学反応システムの創出を目指し、生命化学工程を司る酵素の構造的模倣ではなく、化学反応の駆動原理、駆動システムを生命から学びとることを出発点としました。すなわち酵素はしばしば遷移金属活性中心を持ち、タンパクからなる疎水性ポケットの中で化学反応を駆動します。そこで我々は両親媒性高分子や両親媒性分子集合体が水中でこそ創りだす疎水性反応場を利用し、そこに遷移金属触媒(錯体触媒やナノ粒子触媒)を埋め込むことで完全水系媒体中での精密な有機分子変換工程を達成しています。中でも高分子マトリクス内への固定化と水中での触媒反応実施を前提に設計された独自の光学活性配位子-パラジウム錯体を導入した両親媒性高分子触媒は、アリル位置換反応やSuzuki反応において高い選択性を水中不均一条件下で実現しています。また高分子固定化白金ナノ触媒ではアルコール類の酸化反応が触媒的に水中で酸素ガスのみで実現されます。

有機分子は元来「油」であり水には馴染みません。水中で高分子触媒を用いて有機化学反応を実施すると、疎水性有機分子は自ずから高分子マトリクス内に入り込んで行き高濃度状態で触媒の近傍に集まり、高効率で触媒反応が駆動されます。すなわち外部からのエネルギーなどに依らず、分子が持つ性質そのものを駆動力とする反応システムです。

## 参考文献

- 1) Takao Osako, Kaoru Torii, Shuichi Hirata, Yasuhiro Uozumi "Chemoselective Continuous-Flow Hydrogenation of Aldehydes Catalyzed by Platinum Nanoparticles Dispersed in an Amphiphilic Resin" *ACS Catal.* **7**, 7371-7377 (2017).
- 2) Go Hamasaki, Tsubasa Muto, Yoshimichi Andoh, Kazushi Fujimoto, Kenichi Kato, Masaki Takata, Susumu Okazaki, Yasuhiro Uozumi "Detailed Structural Analysis of a Self-Assembled Vesicular Amphiphilic NCN-Pincer Palladium Complex by Wide-Angle X-Ray Scattering and Molecular Dynamics Calculations" *Chem. Eur. J.* **23**, 1291-1298 (2017).
- 3) Heeyoel Baek, Maki Minakawa, Yoichi M. A. Yamada, Jin Wook Han, Yasuhiro Uozumi "In-Water and Neat Batch and Continuous-Flow Direct Esterification and Transesterification by a Porous Polymeric Acid Catalyst" *Sci. Rep.* **6**, 25925 (2016).
- 4) Yoichi M. A. Yamada, Yoshinari Yuyama, Takuma Sato, Shigenori Fujikawa, Yasuhiro Uozumi "A Palladium-Nanoparticle and Silicon-Nanowire-Array Hybrid: A Platform for Catalytic Heterogeneous Reactions" *Angew. Chem. Int. Ed.* **53**, 127-131 (2014).
- 5) Yoichi M. A. Yamada, Shaheen M. Sarkar, Yasuhiro Uozumi "Amphiphilic Self-Assembled Polymeric Copper Catalyst to
- Parts per Million Levels: Click Chemistry," *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 9285-9290 (2012).
- 6) Yoichi M. A. Yamada, Shaheen M. Sarkar, Yasuhiro Uozumi, "Self-Assembled Poly(imidazole-palladium): Highly Active, Reusable Catalyst at Parts per Million to Parts per Billion Levels," *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 3190-3198 (2012).
- 7) Shaheen M. Sarkar, Yoichi M. A. Yamada, Yasuhiro Uozumi, "A highly Active and Reusable Self-Assembled Poly(imidazole/Palladium) Catalyst: Allylic Arylation/Alkenylation," *Angew. Chem. Int. Ed.* **50**, 9437-9441 (2011).
- 8) Go Hamasaki, Tsubasa Muto, Yasuhiro Uozumi, "Molecular-Architecture-Based Administration of Catalysis in Water: Self-Assembly of an Amphiphilic Palladium Pincer Complex," *Angew. Chem. Int. Ed.* **50**, 4876-4878 (2011).
- 9) Yasuhiro Uozumi, Yutaka Matsuura, Takayasu Arakawa, Yoichi M. A. Yamada Asymmetric Suzuki-Miyaura Coupling in Water with a Chiral Palladium Catalyst Supported on an Amphiphilic Resin *Angew. Chem. Int. Ed.* **48**, 2708-2710 (2009).
- 10) Yoichi M. A. Yamada, Takayasu Arakawa, Heiko Hocke, Yasuhiro Uozumi, "A Nanoplatinum Catalyst for Aerobic Oxidation of Alcohols in Water," *Angew. Chem. Int. Ed.* **46**, 704-706 (2007).
- 11) Yasuhiro Uozumi, Yoichi M. A. Yamada, Tomohiko Beppu, Naoshi Fukuyama, Masaharu Ueno and Takehiko Kitamori, "Instantaneous Carbon-Carbon Bond Formation Using a Microchannel Reactor with a Catalytic Membrane," *J. Am. Chem. Soc.* **128**, 15994-15995 (2006).

Our research interests lie in the development of transition metal-catalyzed reaction systems toward ideal (highly efficient, selective, green, safe, simple, etc.) organic transformation processes. In one active area of investigation, we are developing the heterogeneous aquacatalytic systems. Various types of catalytic organic molecular transformations, e.g. carbon-carbon bond forming cross-coupling, carbon-heteroatom bond forming reaction, aerobic alcohol oxidation, etc., were achieved in water under heterogeneous conditions by using amphiphilic polymer-supported transition metal complexes and nanoparticles, where self-concentrating behavior of hydrophobic organic substrates inside the amphiphilic polymer matrix played a key role to realize high reaction performance in water.





## ■錯体触媒研究部門 Complex Catalysis

# キラル分子・キラル機能性物質の デザイン・合成・機能創出

Design, Synthesis, and Functionalization of Chiral Molecules

## 榎山 儀恵(准教授)

MOMIYAMA, Norie

2000年名古屋大学工学部卒、

2005年シカゴ大学大学院化学

科博士課程修了Ph.D.。米国

ハーバード大学博士研究員

(Damon Runyon Cancer

Research Foundation Post

Doctoral Research Fellow)、

東北大大学院理学研究科

助手、助教を経て2014年6月

より現職。

TEL: 0564-59-5531

mail: momiyama@ims.ac.jp

2000 B.S. Nagoya University

2005 Ph.D. The University of Chicago

2005 Postdoctoral Fellow, Harvard University

2006 Assistant Professor, Tohoku University

2014 Associate Professor, Institute for Molecular Science

Associate Professor, The Graduate University for Advanced Studies

### 〈Keywords〉

Organic Synthesis,  
Molecular Catalyst,  
Non-Covalent Interaction

物質がその鏡像と重ね合わすことができない性質を「キラリティ」といい、そのような性質をもつ分子を“キラル分子”と呼びます。「キラリティ」は、様々な物質の性質を進展させる要素として知られています。物質にキラリティを組み込むことは、その機能の飛躍的な向上に繋がり、夢の物質を創り出す第一歩となります。私たちのグループでは、キラル機能性物質開発への応用展開を最終目標に、現在、その基盤づくりに取り組んでいます。独自のキラル分子をデザインし、その合成に向けて独自の合成手法を開発し、独自に合成したキラル分子の新たな機能の創出をめざして、日々研究を進めています。

私たちはこれまでに、複数の水素結合供与部位を有するキラル分子触媒の開発に成功しました。このキラル分子は、複数あるコンフォメーションのうち、ひとつの特有のコンフォメーションのみをとります。さらに、このキラル分子が、キラルな小分子を供給する分子性触媒として機能することを見出しました。この結果は、数千から数万の分子量を有する酵素の機能が、分子量が数百程度の人工キラル分子により簡易的に実現できることを示唆しています。

私たちは、キラル分子をデザインし、開発した反応を駆使して、新たな可能性を秘めたキラル分子の創成に挑戦しています。様々な解析手法を用いて、合成した分子の未知の振る舞いを解明し、分子に特有の性質を見出すことで、新たな機能を有するキラル物質を創り出していきたいと考えています。


### 参考文献

- 1) C. Jongwohan, Y. Honda, T. Suzuki, T. Fujinami, K. Adachi, N. Momiyama, "Brønsted Acid-Initiated Formal [1,3]-Rearrangement Dictated by  $\beta$ -Substituted Ene-Aldimines" *Org. Lett.* **21**, 4991-4995 (2019).
- 2) N. Momiyama, H. Tabuse, H. Noda, M. Yamanaka, T. Fujinami, K. Yamanishi, A. Izumiseki, K. Funayama, F. Egawa, S. Okada, H. Adachi, M. Terada, "Molecular Design of a Chiral Brønsted Acid with Two Different Acidic Sites: Regio-, Diastereo-, and Enantioselective Hetero-Diels-Alder Reaction of Azopyridinecarboxylate with Amidodienes Catalyzed by Chiral Carboxylic Acid-Monophosphoric Acid" *J. Am. Chem. Soc.* **138**, 11353-11359 (2016).
- 3) N. Momiyama, H. Okamoto, J. Kikuchi, T. Korenaga, M. Terada, "Perfluorinated Aryls in the Design of Chiral Brønsted Acid Catalysts: Catalysis of Enantioselective [4+2] Cycloadditions and Ene-Reactions of Imines with Alkenes by Chiral Mono-Phosphoric Acids with Perfluoroaryls" *ACS Catal.* **6**, 1198-1204 (2016).
- 4) N. Momiyama, K. Funayama, H. Noda, M. Yamanaka, N. Akasaka, S. Ishida, T. Iwamoto, M. Terada, "Hydrogen Bonds-Enabled Design of a  $C_1$ -Symmetric Chiral Brønsted Acid Catalyst" *ACS Catal.* **6**, 949-956 (2016).
- 5) N. Momiyama, T. Narumi, M. Terada, "Design of a Brønsted Acid with Two Different Acidic Sites: Synthesis and Application of Aryl Phosphinic Acid-Phosphoric Acid as a Brønsted Acid Catalyst" *Chem. Commun.* **51**, 16976-16979 (2015).
- 6) N. Momiyama, T. Konno, Y. Furiya, T. Iwamoto, M. Terada, "Design of Chiral Bis-phosphoric Acid Catalyst Derived from (*R*)-3,3'-Di(2-hydroxy-3-arylphenyl) binaphthol: Catalytic Enantioselective Diels-Alder Reaction of  $\alpha,\beta$ -Unsaturated Aldehydes with Amidodienes" *J. Am. Chem. Soc.* **133**, 19294-19297 (2011).

"Chirality" is a special property that a substance cannot be superimposed with its mirror image, and a molecule with such a property is called "chiral molecule." "Chirality" is known as a factor that advances the properties of various substances. Incorporating chirality into substances leads to a dramatic improvement in their function and is the first step to create dream substances. We are working on creating the fundamental research with the ultimate goal of application to the development of chiral functional materials. We are designing our own chiral molecule, developing our own synthetic method toward its synthesis, and aiming at creating new functions of uniquely synthesized chiral molecules.

We have successfully developed a chiral molecular catalyst with multiple hydrogen bond donor sites. This chiral molecule takes only one specific conformation out of multiple conformations. In addition, we found that this chiral molecule functions as a molecular catalyst to supply chiral small molecules. This result suggests that the function of enzymes with molecular weights of several thousands to tens of thousands can be easily realized by artificial chiral molecules with molecular weights of several hundreds.

We believe that our challenges create chiral molecules, which have new possibilities by designing chiral molecules and making use of the developed reactions. We are planning to elucidate the unknown behavior of synthesized molecules by using various analytical methods and to create chiral substances with new functions by finding properties peculiar to molecules.



X-ray structure of our recent development

Bonds-Enabled Design of a  $C_1$ -Symmetric Chiral Brønsted Acid Catalyst" *ACS Catal.* **6**, 949-956 (2016).

5) N. Momiyama, T. Narumi, M. Terada, "Design of a Brønsted Acid with Two Different Acidic Sites: Synthesis and Application of Aryl Phosphinic Acid-Phosphoric Acid as a Brønsted Acid Catalyst" *Chem. Commun.* **51**, 16976-16979 (2015).

6) N. Momiyama, T. Konno, Y. Furiya, T. Iwamoto, M. Terada, "Design of Chiral Bis-phosphoric Acid Catalyst Derived from (*R*)-3,3'-Di(2-hydroxy-3-arylphenyl) binaphthol: Catalytic Enantioselective Diels-Alder Reaction of  $\alpha,\beta$ -Unsaturated Aldehydes with Amidodienes" *J. Am. Chem. Soc.* **133**, 19294-19297 (2011).



草本 哲郎(准教授)  
KUSAMOTO, Tetsuro

2003年東京大学理学部卒、  
2010年東京大学大学院理学系研究科博士後期課程修了、  
理学博士。ソニー株式会社、  
日本学術振興会特別研究員  
(DC1)、理化学研究所特別研究員および基礎科学特別研究員、東京大学大学院理学系研究科特任助教、東京大学大学院理学系研究科助教を経て現職。  
mail: kusamoto@ims.ac.jp

2003 B.S. The University of Tokyo  
2010 Ph.D. The University of Tokyo  
2005 Sony Corporation  
2010 Postdoctoral Fellow, RIKEN  
2012 Project Assistant Professor, The University of Tokyo  
2013 Assistant Professor, The University of Tokyo  
2019 Associate Professor, Institute for Molecular Science  
Associate Professor, The Graduate University for Advanced Studies

Keywords

Radical

Open-Shell Electronic States

Photonic-Electronic-Magnetic Properties

■錯体物性研究部門 Functional Coordination Chemistry

## 開殻電子系分子を基に新しい光・電子・磁気物性を開拓する

Creation of Novel Photonic-Electronic-Magnetic Functions Based on Molecules with Open-Shell Electronic Structures

水( $H_2O$ )や窒素( $N_2$ )、ベンゼン( $C_6H_6$ )に代表されるように、一般的な分子は偶数個の電子を持ち、閉殻電子構造を有しています。一方でラジカルと呼ばれる奇数個の電子を有する分子は開殻電子構造を有し、超伝導体になつたり磁石になつたりと、閉殻電子構造では実現が困難な化学的・物理的性質を発現します。私たちの研究グループでは、ラジカルや有機-無機複合物質である金属錯体など開殻電子構造を有する新しい分子性物質を合成し、これまでにないユニークな機能を創出することを目指し、研究を進めています。

私たちはラジカルが示す発光特性に着目しています。発光性の分子が有機EL等の高性能発光デバイスの鍵物質として盛んに研究されている一方で、ラジカルは発光しない物質として考えられ、その発光特性は未開拓研究分野となっていました。この未開拓領域を切り拓くべく、私たちは分子の構造を適切にデザインし、高い化学安定性を有する発光性ラジカルPyBTMを開発しました。PyBTMを基として新しい発光性ラジカルや発光性開殻金属錯体を様々に合成し、「開殻電子系ならではの電子の振舞いが、どのような新しい光特性を生み出すのか?」を調べています。最近では、ラジカルの発光色が磁場によって大きく変化することを世界で初めて発見しました。これらの研究成果は、基礎科学の発展のみならず、例えば発光デバイスを省エネ化するための新方法の提案など、応用科学の発展にも貢献しています。

その他、開殻電子系錯体を一次元的・二次元的に規則的配列させた結晶を作製し、結晶中を動き回る電子、あるいは動き回りたいのに動けなくてうずうずしている電子が示す電気・磁気特性を調べています。結晶という小さな粒の中からこれまで誰も考えもしなかったような壮大な物理が生まれることを夢見て、日々研究を進めています。

参考文献


- 1) S. Kimura, T. Kusamoto, S. Kimura, K. Kato, Y. Teki, and H. Nishihara "Magnetoluminescence in a Photostable, Brightly Luminescent Organic Radical in a Rigid Environment" *Angew. Chem. Int. Ed.* **57**, 12711–12715 (2018).
- 2) Y. Hattori, T. Kusamoto, and H. Nishihara "Enhanced Luminescent Properties of an Open-Shell (3,5-Dichloro-4-pyridyl)bis(2,4,6-trichlorophenyl)methyl Radical by Coordination to Gold" *Angew. Chem. Int. Ed.* **54**, 3731–3734 (2015).
- 3) Y. Hattori, T. Kusamoto, and H. Nishihara "Luminescence, Stability, and Proton Response of an Open-Shell (3,5-Dichloro-4-pyridyl)bis(2,4,6-trichlorophenyl)methyl Radical" *Angew. Chem. Int. Ed.* **53**, 11845–11848 (2014).

The molecules with open-shell electronic states can exhibit unique properties, which are difficult to achieve for conventional closed-shell molecules. Our group develops new open-shell organic molecules (= radicals) and metal complexes to create novel photonic-electronic-magnetic functions.

While conventional closed-shell luminescent molecules have been extensively studied as promising components for organic light-emitting devices, the luminescent properties of radicals have been much less studied because of its rarity and low chemical (photo-)stability. We have developed a novel luminescent organic radical PyBTM, which is highly stable at ambient condition and in the photoexcited state. We have also discovered that (i) PyBTM-doped molecular crystals exhibit photoluminescence with a room-temperature emission quantum yield of 89%, which is exceptionally high in radicals, and (ii) the doped crystals show drastic changes in the emission spectra by applying a magnetic field. This is the first observation of the magnetoluminescence in organic radicals. Our studies provide novel and unique insights in molecular photonics, electronics, and spintronics, and also contribute to developing applied science for light-emitting devices.

Our group focuses on frustrated spins in molecular crystals. The anisotropic assembly of open-shell molecules in crystalline states can afford unusual electronic states attributed to the frustrated spins, providing exotic electrical and magnetic properties.

- (a) Molecular structure of PyBTM and its characteristics.
- (b) Schematic photoexcitation-emission processes.
- (c) Emission in  $CH_2Cl_2$ .
- (d) Emission of PyBTM-doped molecular crystals.
- (e) Controlling emission by magnetic field.



- 4) T. Kusamoto, H. M. Yamamoto, N. Tajima, Y. Oshima, S. Yamashita, and R. Kato "Bilayer Mott System with Cation- $\cdots$ Anion Supramolecular Interactions Based on Nickel Dithiolene Anion Radical: Coexistence of Ferro- and Antiferro-magnetic Anion Layers and Large Negative Magnetoresistance" *Inorg. Chem.* **52**, 4759–4761 (2013).



## 3次元空間をデザインする有機合成化学 Design and synthesis of three-dimensional organic structures

瀬川 泰知(准教授)  
SEGAWA Yasutomo

2005年東京大学工学部化学生命工学科卒、2007年東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻修士課程修了、2009年東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻博士課程修了、博士(工学)。2008年～2009年日本学術振興会特別研究員(DC1)、2009年～2013年名古屋大学物質科学国際研究センター助教、2013年～2020年名古屋大学大学院理学研究科特任准教授およびJST ERATO伊丹分子ナノカーボンプロジェクトグループリーダー・研究総括補佐を経て、2020年4月より現職。

TEL: 0564-59-5587

mail: segawa\_at\_ims.ac.jp

2005 B.S. The University of Tokyo

2009 Ph.D. The University of Tokyo

2009 Associate Professor, Nagoya University

2013 Designated Associate Professor, Nagoya University

Group Leader and Project Coordinator, JST ERATO Itami Molecular Nanocarbon Project

2020 Associate Professor, Institute for Molecular Science

Associate Professor, The Graduate University for Advanced Studies

〈Keywords〉


π-Conjugated Molecules,  
Molecular Topology,  
3D Network Polymer

芳香族化合物は、その構造によって多彩な電子的性質をもちます。有機合成化学の発展にともなって、デザインして精密に合成できる分子の種類が増えている一方で、芳香族化合物はそれだけでは機能を十分に発揮することはできず、3次元的に集合することで半導体などの材料として利用できます。しかし集積様式は分子の形のわずかな違いに左右されるために予測が難しく、特に結晶状態を精密にデザインすることは未だ困難です。

当研究グループでは、トポロジーや空間対称性といった幾何学的手法を積極的に取り入れることによって、従来の有機合成化学では実現困難だった「3次元空間を敷き詰める有機合成化学」に挑戦します。具体的には以下の研究を行います。

- ・3次元幾何構造をもつ有機共有結合結晶の合成と機能解明
  - ・分子の概念を拡張する新たな分子トポロジーの確立
  - ・電子回折結晶構造解析の有機機能性材料開発への活用
- 「パズルのように分子を作る」の理念のもとに、従来の有機合成化学の限界を超えた物質創製に取り組んでいきます。

Aromatic compounds are potentially useful as functional electronic materials. However, the design and control of three-dimensional molecular assembly are still very difficult, especially for the crystal engineering of organic molecules. This group aims to create novel topological and reticular organic structures by using synthetic organic chemistry and geometric insight. To achieve our purpose, this group will start electron-diffraction crystallography (MicroED) for the rapid structure determination of three-dimensional covalent organic frameworks.



- 1) Design and synthesis of  $\pi$ -conjugated organic molecules
- 2) Development of novel molecular topology
- 3) Construction of 3D network polymers

### 参考文献

- 1) Yutaro Saito, Kotono Yamanoue, Yasutomo Segawa, and Kenichiro Itami, "Selective Transformation of Strychnine and 1,2-Disubstituted Benzenes by C–H Borylation" *Chem.*, **6**, 985–993 (2020).
- 2) Yasutomo Segawa, Motonobu Kuwayama, Yuh Hijikata, Masako Fushimi, Taishi Nishihara, Jenny Pirillo, Junya Shirasaki, Natsumi Kubota, and Kenichiro Itami, "Topological Molecular Nanocarbons: All-benzene Catenane and Trefoil Knot" *Science*, **365**, 272–276 (2019).
- 3) Yasutomo Segawa, David R. Levine, and Kenichiro Itami, "Topologically Unique Molecular Nanocarbons" *Acc. Chem. Res.*, **10**, 2760–2767 (2019).
- 4) Guillaume Povie, Yasutomo Segawa, Taishi Nishihara, Yuhei Miyauchi, and Kenichiro Itami "Synthesis and Size-Dependent Properties of [12], [16], and [24]Carbon Nanobelts" *J. Am. Chem. Soc.*, **140**, 10054–10059 (2018).
- 5) Tetsushi Yoshidomi, Tomohiro Fukushima, Kenichiro Itami, and Yasutomo Segawa, "Synthesis, Structure, and Electrochemical Property of a Bimetallic Bis-2-pyridylidene Palladium Acetate Complex" *Chem. Lett.*, **46**, 587–590 (2017).
- 6) Guillaume Povie, Yasutomo Segawa, Taishi Nishihara, Yuhei Miyauchi, and Kenichiro Itami, "Synthesis of a Carbon Nanobelt" *Science*, **356**, 172–175 (2017).
- 7) Yasutomo Segawa, Akiko Yagi, Katsuma Matsui, and Kenichiro Itami, "Design and Synthesis of Carbon Nanotube Segments" *Angew. Chem. Int. Ed.*, **55**, 5136–5158 (2016).
- 8) Yasutomo Segawa, Hideto Ito, and Kenichiro Itami, "Structurally Uniform and Atomically Precise Carbon Nanostructures" *Nat. Rev. Mater.*, **1**, 15002 (2016).
- 9) Yasutomo Segawa, Takehisa Maekawa, and Kenichiro Itami, "Synthesis of Extended  $\pi$ -Systems through C–H Activation" *Angew. Chem. Int. Ed.*, **54**, 66–81 (2015).
- 10) Yasutomo Segawa and Douglas W. Stephan, "Metal-free Hydrogenation Catalysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons" *Chem. Commun.*, **48**, 11963–11965 (2012).
- 11) Yasutomo Segawa, Makoto Yamashita, and Kyoko Nozaki, "Boryllithium: Isolation, Characterization, and Reactivity as a Boryl Anion" *Science*, **314**, 113–115 (2006).



## ■生体分子機能研究部門 Biomolecular Functions

# 新規な機能を有する金属タンパク質の構造と機能 Bioinorganic Chemistry of Metalloproteins Responsible for Signal Transduction

### 青野 重利(教授)

AONO, Shigetoshi

1982年東京工業大学工学部卒、1987年同大学大学院理工学研究科博士課程修了、工学博士。日本学術振興会特別研究員、ジョージア大学博士研究員、東京工業大学助手、北陸先端科学技術大学院大学助教授を経て2002年5月より現職。

TEL: 0564-59-5575  
FAX: 0564-59-5576  
mail: aono@ims.ac.jp

1982 B.S. Tokyo Institute of Technology

1987 Ph.D. Tokyo Institute of Technology

1988 Postdoctoral Fellow, University of Georgia

1989 Assistant Professor, Tokyo Institute of Technology

1994 Assistant Professor, Japan Advanced Institute of Science and Technology

2002 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, Okazaki Institute for Integrative Bioscience (-2018)

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2018 Professor, Exploratory Research Center on Life and Living Systems

### 〈Keywords〉

Bioinorganic Chemistry,  
Metalloproteins,  
Sensor Protein

遷移金属イオンや遷移金属含有補欠分子族を活性中心とする金属タンパク質は、生物の物質代謝やエネルギー代謝において中心的な役割を果たしているのみならず、細胞内情報伝達にも深く関わっていることが知られています。生物は様々な外部環境変化に対応し、生体内の恒常性を維持するための精緻なシステムを有しています。このようなシステムは、外部環境の変化を感じるためのセンシングシステムと、感知した情報に対応して細胞内の恒常性維持に必要な応答反応に関与するレスポンスレギューターシステムから構成されています。このようなシステムの中には、遷移金属イオンが関与しているシステムも多く存在しています。代表的な例として、酸素、一酸化炭素、一酸化窒素等の気体分子のような、単純タンパク質では応答不可能なシグナルに対する応答システムがあります。これらのシステムでは、分子中に遷移金属イオンを含む金属タンパク質がセンサー分子として機能することにより、遺伝子発現、走化性制御、セカンドメッセンジャー分子の合成・分解を介した代謝制御などの様々な生理機能制御に関与しています。また、遷移金属イオンそのものがシグナル分子として機能することにより、生理機能制御に必須な遷移金属イオンの細胞内濃度を適正に維持するために必要な分子マシンリー（金属イオン取り込み・排出システム、細胞内金属輸送システム等）の発現制御、金属タンパク質の生合成制御など、様々な生理機能が制御されています。

我々は、構造生物学、遺伝子工学、分子生物学、および各種分光学的な実験手法を駆使することにより、シグナルセンシングやシグナル伝達に関与する新規な金属タンパク質の構造機能相関解明、および細胞内遷移金属イオンの恒常性維持の分子機構解明を目的として研究を進めています。

### 参考文献

- 1) "Structural basis for heme transfer reaction in heme uptake machinery from Corynebacteria" N. Muraki, C. K., Y. Okamoto, T. Uchida, K. Ishimori, and S. Aono, *Chem. Commun.* **55**, 13864-13867 (2019).
- 2) "Structural characterization of HypX responsible for CO biosynthesis in the maturation of NiFe-hydrogenase" N. Muraki, K. Ishii, S. Uchiyama, S. G. Itoh, H. Okumura, and S. Aono, *Commun. Biol.* **2**, 385 (2019).
- 3) "Protein Dynamics of the Sensor Protein HemAT as Probed by Time-Resolved Step-Scan FTIR Spectroscopy," A. Pavlou, H. Yoshimura, S. Aono, E. Pinakoulaki, *Biophys. J.* **114**, 584-591 (2018).
- 4) "Probing the role of the heme distal and proximal environment in ligand dynamics in the signal transducer


Transition metal ions and metalloproteins play crucial roles in signal transduction processes in addition to their traditional roles in energy and substance metabolisms. Many responses to metals occur transcriptionally or post-transcriptionally. The metal-responsive transcription factors control the expression of genes encoding proteins responsible for metal homeostasis in cells including metal ions uptake/efflux, intracellular metal trafficking, and biogenesis of metalloproteins. Metal-responsive signal transduction pathways emanating from metal sensing at the cell membrane are also responsible for biological regulation in response to metals. Metal-based sensor proteins are utilized to sense external signals that cannot be sensed by simple sensor proteins without any prosthetic group, in which transition metal ions or metal-containing prosthetic groups act as the active center of signal sensing.

My research interests are focused on the elucidation of the structural and functional relationships for metal-dependent proteins working in biological signal-transduction systems including metal-based sensor proteins, transition metal ion-sensing transcriptional regulators, and protein machineries responsible for metal ions homeostasis in both prokaryotes and eukaryotes.



X-ray crystal structure of N-terminal domain of HtaA responsible for heme uptake in *C. glutamicum* (left) and a close-up view of its heme-binding pocket (right).

- protein HemAT by time-resolved step-scan FTIR and resonance Raman spectroscopy," A. Pavlou, A. Loullis, H. Yoshimura, S. Aono, E. Pinakoulaki, *Biochemistry*, **56**, 5309-5317 (2017).
- 5) "Structural characterization of heme environmental mutants of CgHmuT that shuttles heme molecules to heme transporters," N. Muraki, C. Kitatsugi, M. Ogura, T. Uchida, K. Ishimori, S. Aono, *Int. J. Mol. Sci.* **17**, 829 (10pages) (2016).
- 6) "Structural Basis for Heme Recognition by HmuT Responsible for Heme Transport to the Heme Transporter in *Corynebacterium glutamicum*," N. Muraki, S. Aono, *Chem. Lett.* **45**, 24-26 (2015).



■生体分子機能研究部門 Biomolecular Functions

## 生命分子システムの動的秩序形成と 高次機能発現の仕組みの探求

Dynamical Ordering of Biomolecular Systems  
for Creation of Integrated Functions

加藤 晃一(教授)

KATO, Koichi

1986年東京大学薬学部卒、

1991年同大学院薬学系研究

科博士課程修了、薬学博士。

東京大学助手・講師、名古屋市

立大学大学院薬学研究科教授

を経て2008年4月より現職。

TEL: 0564-59-5225

FAX: 0564-59-5225

mail: kkatonmr@ims.ac.jp

1986 B.S. The University of Tokyo

1991 Ph.D. The University of Tokyo

1991 Assistant Professor, The University of Tokyo

1997 Lecturer, The University of Tokyo

2000 Professor, Nagoya City University

2008 Professor, Okazaki Institute for Integrative Bioscience (-2018)

Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2013- Project Leader, JSPS Grant in Aid for Scientific Research on Innovative Areas "Dynamical ordering of biomolecular systems for creation of integrated functions" (-2018)

2018 Professor, Exploratory Research Center on Life and Living Systems

〈Keywords〉

Biomolecule,

Dynamical Ordering,


NMR

生命現象の特質は、システムを構成する多数の分子素子がダイナミックな離合集散を通じて秩序構造を形成し、外的環境との相互作用を行いつつ、自律的に時間発展していくことがあります。前世紀末期に勃興したオミクスアプローチは生命体を構成する分子素子に関する情報の網羅的集積を実現しました。しかしながら、それらの生命素子が自律的に柔軟かつロバストな高次秩序を形成するメカニズムを理解することは、これから生命科学の重要な課題です。私たちは、生物学・化学・物理学の分野横断的な研究を通じて、内的複雑性を秘めた生命分子素子が動的な秩序を形成して高次機能を発現する仕組みを分子科学の観点から解き明かすことを目指しています。

さらに、生命分子システムのデザインルールを取り入れた人工自己組織化システムの創生に資することを目的とした研究も行っています。生命超分子集合体は、外部環境の変動や超分子集合体間のコミュニケーションを通じて時空間的発展を遂げています。生命分子システムの有するこうした特徴の本質を深く理解し、それを積極的に人工超分子系の設計に取り入れることは、分子科学におけるパラダイムシフトをもたらすものと考えています。

Living systems are characterized as dynamic processes of assembly and disassembly of various biomolecules that are self-organized, interacting with the external environment. The omics-based approaches developed in recent decades have provided comprehensive information regarding biomolecules as parts of living organisms. However, fundamental questions still remain unsolved as to how these biomolecules are ordered autonomously to form flexible and robust systems. Biomolecules with complicated, flexible structures are selforganized through weak interactions giving rise to supramolecular complexes that adopt their own dynamic, asymmetric architectures. These processes are coupled with expression of integrated functions in the biomolecular systems.


Toward an integrative understanding of the principles behind the biomolecular ordering processes, we conduct multidisciplinary approaches based on detailed analyses of dynamic structures and interactions of biomolecules at atomic level, in conjunction with the methodologies of molecular and cellular biology along with synthetic and computational technique.



Formation of supramolecular machinery through dynamic assembly and disassembly of biomolecules

### 参考文献

- 1) H. Yagi, M. Yagi-Utsumi, R. Honda, Y. Ohta, T. Saito, M. Nishio, S. Ninagawa, K. Suzuki, T. Anzai, Y. Kamiya, K. Aoki, M. Nakanishi, T. Satoh and K. Kato, "Improved secretion of glycoproteins using an N-glycan-restricted passport sequence tag recognized by cargo receptor," *Nature Commun.* **11**, 1368 (2020).
- 2) M. Yagi-Utsumi, A. Sikdar, C. Song, J. Park, R. Inoue, H. Watanabe, R.N. Burton-Smith, T. Kozai, T. Suzuki, A. Kodama, K. Ishii, H. Yagi, T. Satoh, S. Uchiyama, T. Uchihashi, K. Joo, J. Lee, M. Sugiyama, K. Murata and K. Kato, "Supramolecular tholos-like architecture constituted by archaeal proteins without functional annotation," *Sci. Rep.* **10**, 1540 (2020).
- 3) S. Yanaka, R. Yogo, H. Watanabe, Y. Taniguchi, T. Satoh, N. Komura, H. Ando, H. Yagi, N. Yuki, T. Uchihashi and K. Kato, "On-membrane dynamic interplay between anti-GM1 IgG antibodies and complement component C1q," *Int. J. Mol. Sci.* **20**, 2308 (2019).
- 4) R. Yogo, Y. Yamaguchi, H. Watanabe, H. Yagi, T. Satoh, M. Nakanishi, M. Onitsuka, T. Omasa, M. Shimada, T. Maruno, T. Torisu, S. Watanabe, D. Higo, T. Uchihashi, S. Yanaka, S. Uchiyama, and K. Kato, "The Fab portion of immunoglobulin G contributes to its binding to Fcγ receptor III," *Sci. Rep.* **9**, Article number: 11957 (2019).
- 5) S. Yanaka, R. Yogo, R. Inoue, M. Sugiyama, S.G. Itoh, H. Okumura, Y. Miyanoiri, H. Yagi, T. Satoh, T. Yamaguchi, and K. Kato, "Dynamic views of the Fc region of immunoglobulin G provided by experimental and computational observations," *Antibodies* **8**, 39 (2019).
- 6) T. Sekiguchi, T. Satoh, E. Kurimoto, C. Song, T. Kozai, H. Watanabe, K. Ishii, H. Yagi, S. Yanaka, S. Uchiyama, T. Uchihashi, K. Murata, and K. Kato, "Mutational and combinatorial control of self-assembling and disassembling of human proteasome α subunits," *Int. J. Mol. Sci.* **20**, 2308 (2019).



■階層分子システム解析研究部門 Trans-Hierarchical Molecular Systems

## 生物時計タンパク質が24時間周期のリズムを奏でる仕組みを解き明かす Origins of 24 Hour Period in Cyanobacterial Clock System

秋山 修志(教授)

AKIYAMA, Shuji

1997年京都大学工学部卒。

1999年京都大学大学院工学

研究科修士課程修了、2002年

京都大学大学院工学研究科

分子工学専攻博士課程修了、

博士(工学)。日本学術振興

会特別研究員、理化学研究所

基礎科学特別研究員、科学

技術振興機構さきがけ「生命

現象と計測分析」研究員(専

任)、名古屋大学大学院理学

研究科講師／准教授を経て

2012年4月より現職。2013年4

月より協奏分子システム研究

センター長。2008年～現在

理化学研究所播磨研究所客

員研究員併任。

TEL/FAX: 0564-55-7363

mail: akiyamas@ims.ac.jp

1997 B. Tech. Kyoto Univ

1999 M. Tech. Kyoto Univ

2002 Ph.D. Kyoto Univ

2001 JSPS Research Fellow

2002 JSPS Postdoctoral Research Fellow

2003 RIKEN Special Postdoctoral Researcher

2005 PRESTO Researcher of JST

2008 Junior Associate Professor, Nagoya University

2011 Associate Professor, Nagoya University

2012 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2013 Director, Research Center of Integrative Molecular Systems

〈Keywords〉

Circadian Clock,  
Cyanobacteria,

Temperature Compensation

「生物(体内)時計」という言葉を意識するのはどうのようなときでしょうか。渡航や帰国後に頻発する眠気、だるさ、夜間の覚醒…これら時差ボケの症状は、我々が生物時計の奏でる24時間周期のリズムのもとで生活していることの証です。私たちの研究グループでは——生命が地球の自転周期(24時間)をどのようにしてその内に取り込んだのか——それを分子科学的に解明するという壮大な研究テーマに挑戦しています。

シアノバクテリアの生物時計は、3種の時計タンパク質(KaiA, KaiB, KaiC)とATPを混ぜ合わせることで試験管内に再構成され(Kaiタンパク質時計)、24時間を正確に刻むことができます。一方、時を刻む仕組みの分子科学的的理解は進んでいません<sup>1)</sup>。その一つは「安定した遅さ」の根源で、既存概念の積み上げでは、タンパク質分子という素材で24時間という「遅いダイナミクス」が実現されている理由を説明できません。もう一つの謎が周期の温度補償性です。これは生物時計に普遍的に見いだされる特徴で、時計の発振周期が温度の影響をほとんど受けません。遅い反応は大きな活性化エネルギーを有し、温度の上昇に従って著しく加速されるのが一般的です。生物時計のからくりに迫るためにには、「遅いダイナミクス」と「温度補償性」という一見排他的な2つの性質を同時に説明しなければならないのです<sup>1)</sup>。


私たちの研究グループでは、Kaiタンパク質時計の生化学的な活性測定<sup>2)</sup>はもとより、X線結晶構造解析<sup>2)</sup>やX線溶液散乱<sup>3)-5)</sup>を相補的に利用した動的構造解析、蛍光等による分子動態計測<sup>4)</sup>や同調実験、計算機を用いた実験データのシミュレーション<sup>2)</sup>などを行うことで、分子時計の実態解明に取り組んでいます。このような研究活動を通じて、多くの皆さんに生物、化学、物理、制御工学、計算科学を巻き込んだタンパク質時計研究のフロンティアを体験して頂ければと思います<sup>6)</sup>。

### 参考文献

- 1) S. Akiyama, "Structural and dynamic aspects of protein clocks: How can they be so slow and stable?" *CMLS* **69**, 2147-2160 (2012).
- 2) J. Abe et al., "Atomic-scale Origins of Slowness in the Cyanobacterial Circadian Clock" *Science* **349**, 312-316 (2015).
- 3) S. Akiyama et al., "Assembly and Disassembly Dynamics of the Cyanobacterial Periodosome" *Mol. Cell* **29**, 703-716 (2008).
- 4) Y. Murayama et al., "Tracking and Visualizing the Circadian Ticking of the Cyanobacterial Clock Protein KaiC in Solution" *EMBO J.* **30**, 68-78 (2011).
- 5) Mukaiyama et al., *Sci. Rep.* **8**, 8803 (2018).
- 6) 秋山 修志, "時間生物学と放射光科学の接点", 放射光 (2016).

Circadian (approximately 24 h) clocks are endogenous time-keeping systems encapsulated in living cells, enabling organisms to adapt to daily fluctuation of exogenous environments on the Earth. These time-keeping systems, found ubiquitously from prokaryotes to eukaryotes, share the three characteristics. First, the circadian rhythmicity of the clocks persists even without any external cues (self-sustainability). Second, the period is little dependent on ambient temperature (temperature compensation). Third, the phase of the clock can be reset by external stimuli such as lightning, humidity, or temperature so as to be synchronized to the external phase (synchronization).

KaiC, a core protein of the circadian clock in cyanobacteria, undergoes rhythmic structural changes over approximately 24 h in the presence of KaiA and KaiB (Kai oscillator). This slow dynamics spanning a wide range of both temporal and spatial scales is not well understood, and is central to a fundamental question: What determines the temperature-compensated 24 h period?<sup>1)</sup> The Kai oscillator reconstitutable *in vitro* is advantageous for studying its dynamic structure through a complementary usage of both X-ray crystallography<sup>2)</sup> and solution scattering<sup>3)-5)</sup>, its transient response and synchronization by using physicochemical techniques<sup>4)</sup>, and its molecular motion through a collaborative work with computational groups<sup>2)</sup>. Our mission is to explore the frontier in molecular science of the cyanobacterial circadian clock from many perspectives<sup>6)</sup>.



### Three Major Characteristics

1. Self-sustained 24 hour oscillation  
自律的に約24時間の周期での振動
2. Constant period (24 h) over wide range of temperature (Temperature Compensation)  
周期が温度に依存しない (温度補償性)
3. Synchronization (jet lag)  
同調能 (位相調節、時差ボケ)

One of the major goals is to provide a model that simultaneously explains above three characteristics.

生物時計の研究における究極的目標とは、上記3つの特性を余すことなく説明するモデルを構築することである。

Towards a Unified View of Temperature-compensated 24 h Period in Biological Clock System.



■階層分子システム解析研究部門 Trans-Hierarchical Molecular Systems

## 先端的レーザー分光法による 凝縮相分子の機能・構造・ダイナミクスの探究

Elucidation of Function, Structure, and Dynamics of Condensed-Phase Molecular Systems by Advanced Ultrafast Laser Spectroscopy

倉持 光(准教授)

KURAMOCHI, Hikaru

2007年東京工業大学理学部卒、2013年東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻博士課程修了、理学博士。理化学研究所基礎科学特別研究員、理化学研究所光量子工学研究領域研究員、科学技術振興機構さきかけ研究員を経て2020年4月より現職。

TEL: 0564-55-7419

mail: hkuramochi@ims.ac.jp

2007 B.S. Tokyo Institute of Technology

2013 Ph.D. Tokyo Institute of Technology

2013 Special Postdoctoral Researcher, RIKEN

2016 Research Scientist, RIKEN

2017-PRESTO Researcher, Japan Science and Technology Agency

2020 Associate Professor, Institute for Molecular Science

Associate Professor, The Graduate University for Advanced Study

〈Keywords〉

Ultrafast Spectroscopy,

Chemical Reaction Dynamics,

Ultrashort Pulse Generation and Control

化学反応は反応座標を横軸とするエネルギーダイアグラムなど、単純化されたモデルを用いてしばしば記述されます。しかし、実際の反応は多次元ポテンシャルエネルギー曲面上を分子が縦横無尽に駆け巡ることで進むため、その詳細は複雑を極めます。こうした多次元ポテンシャルエネルギー曲面上において分子がどのように振る舞いどのようにして反応生成物に至るのか、その一部始終を明らかにすることは化学反応を理解する本質ですが実験的にはこれは極めて困難です。特に生体分子を始めとする巨大な自由度を持つ機能性複雑分子に対しこれを実現することは新規材料の創成に向けた重要な知見をも与えることから現代化学における最重要課題の一つです。

これに対し、私たちは最先端の光技術に基づいた新しい分光計測手法を開発・駆使することで凝縮相分子の反応ダイナミクスの観測とその解明に取り組んでいます。特にサブ10フェムト秒(1フェムト秒 =  $10^{-15}$ 秒)クラスの極短パルスレーザー光を用いる独自の超高速分光法・非線形分光法により反応に伴った分子の電子状態や構造の変化を極限的な時間分解能で時々刻々と追跡し、複雑分子系の反応性や機能発現を決定づけるその精緻な分子機構を明らかにすることを目的としています。また、こうした極限分光計測を單一分子レベルで実現することにより分子1つ1つに固有かつ多様な反応性とその起源を解き明かすことにも挑戦します。このように、私たちは独自の方法論に基づいて分子の反応をあたかも手に取り目で見たかのように理解することで化学反応の研究に新たな道を拓くことを目指しています。

Chemical reactions of polyatomic molecular systems proceed on complex potential energy surfaces (PESs) having a vast degree of freedom of nuclear coordinates. For understanding molecular mechanisms underlying the chemical reactions, it is essential to map out the PESs and visualize how the molecules migrate thereon, from the reactant all the way down to the product. To achieve this holy grail in chemistry, we develop advanced ultrafast spectroscopic techniques based on the state-of-the-art optical technology and study chemical reaction dynamics in functional complex molecular systems. In particular, we use ultrafast nonlinear spectroscopy based on sub-10-fs pulses and track the change of the electronic/vibrational structure throughout the chemical reaction with femtosecond temporal accuracy. We also realize such extreme ultrafast spectroscopic experiments at the single-molecule level in the condensed phase for unveiling the diversity and origin of the reactivity governed by the uniqueness of each molecule. We aim to establish a new avenue for the study of chemical reaction dynamics.





Fig. a. Schematic illustration of the chemical reaction dynamics on complicated multidimensional potential energy surfaces (PESs). We aim to visualize how the molecules migrate on these PESs to yield the product and unveil the sophisticated molecular mechanisms underlying the chemical reactions of functional molecular systems.

Fig. b. Setup for advanced ultrafast spectroscopy based on sub-10-fs pulses.



参考文献

- 1) H. Kuramochi, S. Takeuchi, T. Tahara, *Rev. Sci. Instrum.* **87**, 043107 (2016).
- 2) T. Fujisawa, H. Kuramochi, H. Hosoi, S. Takeuchi, T. Tahara, *J. Am. Chem. Soc.* **138**, 3942-3945 (2016).
- 3) H. Kuramochi, S. Takeuchi, K. Yonezawa, H. Kamikubo, T. Tahara, *J. Am. Chem. Soc.* **141**, 19296-19303 (2019).

M. Kataoka, T. Tahara, *Nat. Chem.* **9**, 660-666 (2017).

4) H. Kuramochi, S. Takeuchi, H. Kamikubo, M. Kataoka, T. Tahara, *Sci. Adv.* **5**, eaau4490 (2019).

5) H. Kuramochi, S. Takeuchi, M. Iwamura, K. Nozaki, T. Tahara, *J. Am. Chem. Soc.* **141**, 19296-19303 (2019).



## ■機能分子システム創成研究部門 Functional Molecular Systems

# 分子を使った新しいエレクトロニクスを開拓する Open up Future Electronics by Organic Molecules

### 山本 浩史(教授)

YAMAMOTO, Hiroshi

1993年東京大学理学部化学科卒業、1998年同大学大学院理学系研究科博士課程修了、博士(理学)、1998年学習院大学理学部物理学科助手、1999年理化研究所基礎科学特別研究員、2000年同研究員、2007年同専任研究員を経て、2012年4月より現職。分子科学研究所装置開発室長を兼任中。

TEL: 0564-55-7334

FAX: 0564-55-7325

mail: yhiroshi@ims.ac.jp

1993 B.S. The University of Tokyo

1998 Ph.D. The University of Tokyo

1998 Research Associate, Gakushuin University

1999 Special postdoctoral fellow, RIKEN

2000 Research Scientist, RIKEN

2007 Senior Research Scientist, RIKEN

2012 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2012 Visiting Professor, Tokyo Institute of Technology (-2018)

2015 Visiting Professor, Tohoku University (-2020)

### 〈Keywords〉

Molecular Conductors,

Organic Superconducting Transistors,


Supramolecular Nanowires,  
Organic Spintronics

新しいエレクトロニクスの担い手として有機分子が注目を集めています。軽くて曲げられるトランジスタとして最近盛んに研究されている有機トランジスタ(Organic Field Effect Transistor = OFET)や、ディスプレイ用途に使われている有機発光素子などがその代表例と言えるでしょう。我々の研究室では、有機分子による新しいエレクトロニクスの創成を目指して、これまでとは違った独創的なデバイスを提案・実現していくことを研究に取り組んでいます。現在主に取り組んでいるのは、有機エレクトロニクスの中でも非常に特異な性質をもつ「強相関π電子」を使ったトランジスタの開発です。強相関電子というのは、電子間のクーロン相互作用が強く働き、通常の伝導電子とは異なる振る舞いをする電子系のことで、ほんの少し電子濃度を増やしたり減らしたりするだけで、急に電子が固まって絶縁体になったり、急に流れ出して金属になったりします。不思議なことに、 $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ などの銅酸化物高温超伝導体の伝導電子もまた、この強相関電子に属することが分かっています。そしてFET構造の仕組みを利用して有機物界面の「強相関電子」の濃度を変化させてやると、上に述べたような現象が実際に起こって、絶縁体を金属や超伝導にスイッチ(相転移)させることができます。我々は世界で初めて、こうした相転移をOFET界面において観測することに成功し、デバイスのスイッチング性能を飛躍的に向上させることに成功しました。また最近は、超伝導のON/OFFを光で制御したり、歪みの効果で超伝導転移を制御したりするデバイスの開発も達成しています。このようなデバイスは将来量子コンピューターの中で使われる可能性があるほか、その動作様式を丹念に調べることによって、まだ分かっていないことが多い強相関電子系超伝導の発現機構解明のための糸口を与えてくれることが期待されています。このような研究に加えて、最近はキラル分子を用いたスピニ偏極電流の生成に関する研究にも取り組んでいます。

### 参考文献

- 1) M. Suda, Y. Thathong, V. Promarak, H. Kojima, M. Nakamura, T. Shiraogawa, M. Ehara and H. M. Yamamoto "Light-driven Molecular Switch for Reconfigurable Spin Filters" *Nature Commun.*, **10**, 2455 (2019).
- 2) M. Suda, R. Kato, and H. M. Yamamoto "Light-induced superconductivity using a photo-active electric double layer" *Science*, **347**, 743-746 (2015).
- 3) H. M. Yamamoto, M. Nakano, M. Suda, Y. Iwasa, M. Kawasaki and R. Kato "A strained organic field-effect transistor with a gate-tunable superconducting channel" *Nature Commun.*, **4**, 2379/1–2379/7 (2013).

Organic molecules are attracting recent attention as new ingredients of electronic and spintronic circuits. Their functionalities have been developed considerably, but are still to be explored and advanced. Our group focuses on a development of organic electronics in the next era by providing new mechanism and concepts of the device operation and fabrication. For example, an electronic phase transition is utilized for the ON/OFF switching of our field-effect-transistor (FET). This special FET is called an organic Mott-FET, where the conduction electrons in the organic semiconductor are solidified at the OFF state because of Coulomb repulsion among carriers. However, these solidified electrons can be melted by applying a gate voltage, and show an insulator-to-metal transition so-called Mott-transition to be switched to the ON state. Because of this phase transition, a large response of the device can be achieved, resulting in the highest device mobility ever observed for organic FETs. At the same time, Mott-transition is known for its relevance to superconductivity. Not only in organic materials but also in inorganic materials such as cuprates, Mott-transition is frequently associated with superconducting phase at low temperature. Indeed, our organic FET shows an electric-field-induced superconducting transition at low temperature. Besides these studies, we are also engaged in development of novel spintronics devices based on chiral organic molecules.



Light-induced superconductivity at an organic interface. Self-assembled monolayer (SAM) of photochromic molecule can react with UV light to form electric field across the interface. This electric field invites excess carriers that induces superconductivity from Mott-insulating state.



## タンパク質分子の新規デザイン De novo Design of Protein Molecule

### 古賀 信康(准教授)

KOGA, Nobuyasu

2001年神戸大学理学部卒、  
2006年神戸大学大学院自然  
科学研究科修了、理学博士。  
神戸大学博士研究員、京都大  
学博士研究員、日本学術振興  
会海外特別研究員、ワシントン  
大学博士研究員を経て2014年

4月より現職。

TEL: 0564-55-7379

mail: nkoga@ims.ac.jp

2001 B.S. Kobe University

2006 Ph.D. Kobe University

2003 JSPS Predoctoral  
Research Fellow

2006 Postdoctoral Fellow,  
Kobe University

2007 Postdoctoral Fellow,  
Kyoto University

JSPS Postdoctoral  
Fellow for Research  
Abroad University of  
Washington

2009 Postdoctoral Fellow,  
University of Washington

2014 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

2018 Associate Professor,  
Exploratory Research  
Center on Life and  
Living Systems

### Keywords

Protein Design for  
Structure and Function,

Protein Folding,  
Structural Biology

タンパク質分子は、アミノ酸配列に従ってほどけた紐のような状態から自発的に折りたまり特異的な3次元立体構造を形成した後に、その3次元立体構造に基づき機能を発現することで、生命システムにおけるパートとして様々な生命現象を生み出しています。現在私達が見ている自然界のタンパク質の姿は、自然が何十億年という時間をかけて精巧に創り上げた、いわば“完成品”であり、それらを解析するのみではタンパク質分子の動作メカニズムの本質を明らかにすることは困難です。そこで私達は、立体構造形成や機能発現に関する様々な仮説を立て、それらを基にタンパク質分子を計算機上でデザインし、そのデザインしたタンパク質分子が実際にどのように振る舞うのかを生化学実験によって調べるというアプローチで研究を行っています。

私達は「アミノ酸配列はどのような原理により折りたたみ後の構造を決定しているのか?」という問題に取り組んできました。この問題が解明されれば、アミノ酸配列に基づいて折りたたむ立体構造を予測することも、またその逆に、望みの機能を発現する立体構造に折りたたむアミノ酸配列を自在にデザインすることも可能になります。これまでの研究において、アミノ酸配列の詳細というよりも、 $\alpha$ -ヘリックス、 $\beta$ -ストランド、ループの長さや形状といった主鎖構造が3次構造の決定に重要であることを発見し、これらの発見を基にタンパク質デザイン技術を開発することで、様々なタンパク質構造のデザインに成功しました。今後は、このデザイン技術を発展させることで、望みの機能を持つタンパク質をデザインする技術の確立を目指します。


### 参考文献

- 1) Rie Koga and Nobuyasu Koga, Consistency principle for protein design, *Biophys. Physicobiol.* **16**, 304-309 (2019).
- 2) Nobuyasu Koga, Rie Tatsumi-Koga, Gaohua Liu, Rong Xiao, Thomas B. Acton, Gaetano T. Montelione and David Baker, Principles for designing ideal protein structures, *Nature* **491**(7423), 222-227 (2012).
- 3) Yu-Ru Lin, Nobuyasu Koga, Rie Tatsumi-Koga, Gaohua Liu, Amanda F. Clouser, Gaetano T. Montelione, David Baker, Control over overall shape and size in de novo designed proteins, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **112**(40), E5478-5485 (2015).

Protein molecules spontaneously fold into unique three-dimensional structures specified by their amino acid sequences from random coils to carry out their functions. Many protein studies have been performed by analyzing naturally occurring proteins. However, it is difficult to reach fundamental working principles of protein molecules only by analyzing naturally occurring proteins, since they evolved in their particular environments spending billions of years. In our lab, we explore the principles by computationally designing protein molecules completely from scratch and experimentally assessing how they behave.

Protein design holds promise for applications ranging from catalysis to therapeutics. There has been considerable recent progress in computationally designing proteins with new functions. Many protein design studies have been conducted using naturally occurring protein structures as design scaffolds. However, since naturally occurring proteins have evolutionarily optimized their structures for their functions, implementing new functions into the structures of naturally occurring proteins is difficult for most of cases. Rational methods for building any arbitrary protein structures completely from scratch provide us opportunities for creating new functional proteins. In our lab, we tackle to establish theories and technologies for designing any arbitrary protein structures precisely from scratch. The established methods will open up an avenue of rational design for novel functional proteins that will contribute to industry and therapeutics.

### OUR DESIGNS FOR VARIOUS PROTEIN TOPOLOGIES





## ■繊細計測研究部門 Supersensitive Measurements

# 新しい光学顕微鏡でナノ物質の励起状態と キラリティを探る

Exploring Excited States and Chirality of Nanomaterials  
with Novel Optical Microscopes

## 岡本 裕巳(教授)

OKAMOTO, Hiromi

1983年東京大学理学部卒、

1985年同大学院理学系

研究科博士課程中退、1991年

理学博士。1985年分子科学研

究所助手、1990年東京大学理

学部助手、1993年同助教授を

経て、2000年11月より現職。

研究総主幹、およびメソスコ

ピック計測研究センター長。

TEL: 0564-55-7320

FAX: 0564-54-2254

mail: aho@ims.ac.jp

1983 B.S. The University of Tokyo

1991 Ph.D. The University of Tokyo

1985 Research Associate, Institute for Molecular Science

1990 Research Associate, The University of Tokyo

1993 Associate Professor, The University of Tokyo

2000 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2012 Dean, School of Physical Sciences, The Graduate University for Advanced Studies (to 2014)

2016 Deputy Director General

2017 Director, Center for Mesoscopic Sciences

### 〈Keywords〉

Near-Field Optical Microscopy,

Plasmons,

Chirality

従来の光学顕微鏡では、光の波長(可視光で $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 程度)より小さい形を見ることができませんが、近接場光学顕微鏡という新しい方法によってナノメートルの物質の観察が可能になりました。ナノサイズ物質のカラー写真(スペクトル情報)を撮ることができ、また100兆分の1秒単位の極めて短い時間内に起きる変化を、刻一刻、場所ごとに調べることもできます。私たちは、貴金属でできたナノ物質で、物質の特性に深く関わる「波動関数」がこの方法で観察できることを見いだしました。更に、円偏光という螺旋の性質を持つ光で近接場計測をすることで、キラリティ(右手と左手のように、鏡像の関係にあるが同一ではない形を持つこと)の性質を、ナノ物質について場所ごとに調べることもできるようになりました。このようにナノ物質の新しい性質を光で調べ、制御する基礎的な研究を行っています。


貴金属ナノ微粒子がある一定の構造で集合させて配列構造を作ると、光を照射したときに、局所的に非常に強い光(金属微粒子のない場合に比べて、最大数百万倍)が発生する場合があると考えられています。通常の光学顕微鏡ではこのような光の場を観察することはできませんが、私達は近接場光学顕微鏡を用いて、発生した強い光の場を、実際にイメージとして観察しました。例えば微粒子が2個連結した構造では、粒子間の隙間に強い光が発生しているのが観察され、これは理論による予測に良く一致します。また、同じ近接場光学顕微鏡を用いた実験で、ナノサイズの孔を通ってくる光が、孔に金属板で蓋をすると、かえって強くなるという、奇妙な現象を見いだしました。解析の結果、貴金属の微粒子が光を集め特異な性質が、この現象に深く関わることがわかつきました。

### 参考文献

- 1) H. Okamoto, T. Narushima, Y. Nishiyama, and K. Imura, "Local Optical Responses of Plasmon Resonances Visualised by Near-Field Optical Imaging," *Phys. Chem. Chem. Phys.* **17**, 6192-6206 (2015).
- 2) H. Okamoto, "Local optical activity of nano- to microscale materials and plasmons," *J. Mater. Chem. C* **7**, 14771-14787 (2019)
- 3) S. Hashiyada, T. Narushima, and H. Okamoto, "Imaging Chirality of Optical Fields near Achiral Metal nanostructures Excited with Linearly Polarized Light," *ACS Photon.* **5**, 1486-1492 (2018).
- 4) K. Imura, K. Ueno, H. Misawa, and H. Okamoto, "Anomalous Light Transmission from Plasmonic Capped Nano-Apertures," *Nano Lett.* **11**, 960-965 (2011).

With the conventional optical microscope, we cannot observe shapes of matters smaller than the wavelength of light ( $\sim 0.5\text{ }\mu\text{m}$  for visible light). Observation of nanomaterials became feasible with a new method of optical microscopy, called near-field optical microscopy. It enabled taking color photographs (i.e., spectral information) of nanomaterials. It also enabled observing dynamical behavior on the extremely short ( $10^{-14}\text{ s}$ ) timescale at each position on the nanomaterial. With this new microscopic method, we investigate fundamental characteristics of nanomaterials. We found that wave functions of noble metal nanostructures can be visualized. By adopting circularly polarized light, properties of chirality (non-superimposable feature of a matter on its mirror image) became accessible at each local position on nanomaterials.

We succeeded in visualizing the local field as an image with near-field optical microscopy. In the dimeric gold nanoparticles, strong optical field was observed at the interstitial site between the two particles. During the near-field measurement of gold nanodisk, we found a unique phenomenon that light coming through a nano-sized hole is enhanced when the hole is capped with a nanodisk. The result was interpreted as arising from the nature of noble metal particles to collect light.



Near-field optical images of various gold nanostructures. A: Single gold nanorod (length 540 nm). The amplitude of the wave function is visualized. B: Dimers of spherical gold nanoparticles (diameter 100 nm). Strong optical fields are observed in the interstitial sites. C: Island-like assembly of gold nanospheres (diameter 100 nm). Strong field is localized in the rim part. D: Chirality image of gold nanorectangle observed with circularly polarized light. Yellow and blue parts indicate opposite handedness of chirality. Although a rectangle is not chiral, strong local chirality is visualized in this image.



## 錯体化学に立脚した自己集合分子システム Self-Assembling Molecular Systems Based on Coordination Chemistry

### 藤田 誠(卓越教授)

FUJITA, Makoto

1980年千葉大学工学部卒。  
1982年同工学研究科修士課程修了。1987年東工大工学博士。相模中央化学研究所研究員、千葉大学助手、同講師、同助教授、分子科学研究所助教授、名古屋大学教授を経て、2002年より東京大学大学院工学系研究科教授、2018年4月より現職を兼任。

TEL: 0564-55-5580

mail: mfujita@ims.ac.jp

1980 BSc Chiba University

1982 MSc Chiba University

1982- Researcher, Sagami  
1988 Chemical Research Center.

1987 Ph.D. Tokyo Institute of Technology

1988- Assist. Prof. to Assoc.  
1997 Prof., Chiba University.

1997- Assoc. Prof., Inst. for  
1999 Molecular Science (IMS)

1999- Professor, Nagoya  
2002 University.

2002- Professor, The University of Tokyo


2018- Distinguished Professor,  
Institute for Molecular Science

〈Keywords〉

Self-Assembly,  
Nano-Space,  
Coordination Chemistry

本研究室では、「金属配位による自己集合」をキーワードに新しい物質と機能の創成に挑んでいます。これまでに、適度な結合力をもち、結合形成に明確な方向性と結合数を持つ配位結合（金属イオンと有機分子の相互作用）を自己集合の駆動力として活用することで、人工系でありながら安定かつ精密な3次元構造が狙いどおりに構築できることを数多く提示してきました。現在ではこのような手法でつくられるナノスケールの物質群、とりわけ内部空間を持つ中空化合物の自己集合に着目して、ナノスケール材料の新しい設計と合成、ならびにその特異な機能の開拓（新しい反応の創出や物性の探索、自己集合の機構解明など）を研究しています。最近では、 $M_{30}L_{60}$  や  $M_{48}L_{96}$  組成にも及ぶ巨大中空錯体の構築にも成功しています。また、自己集合による細孔性錯体の合成と、結晶空間での機能創出にも取り組んでいます。ごく最近、細孔性錯体に溶液状態から吸収された有機化合物が、細孔内で平衡の位置に収まる現象に着目し、「試料の結晶化を必要としないX線構造解析手法（結晶スponジ法）」を開発しました。革新的な構造解析技術として、アカデミアのみならず、微量成分の迅速構造決定を必要とする創薬や食品などの産業分野からも高い注目を集めています。

Our laboratory is exploring the construction of new molecular materials through metal-directed self-assembly. By using coordination bonds with appropriate bond energy and well-defined geometries as the driving force of self-assembly, a variety of three-dimensional architectures have been constructed at will. Among these nanostructures, we are particularly interested in hollow frameworks with a large inner space, where new properties and functions are developed. Recent outstanding results include the self-assembly of gigantic  $M_{30}L_{60}$  and  $M_{48}L_{96}$  spherical complexes. We are also interested in reproducing solution reactions within the pore of self-assembled porous complexes. In due course, we have recently developed a new X-ray technique that does not require the crystallization of target compounds (crystalline sponge method). This innovative analysis method is attracting considerable interests of not only academia but also industries such as pharmaceuticals and foods companies.



X-ray structure of  $M_{48}L_{96}$  complex.

### 参考文献

- 1) Q.-F. Sun, J. Iwasa, D. Ogawa, Y. Ishido, S. Sato, T. Ozeki, Y. Sei, K. Yamaguchi, and M. Fujita, "Self-Assembled  $M_{24}L_{48}$  Polyhedra and Their Sharp Structural Switch upon Subtle Ligand Variation" *Science* **328**, 1144-1147 (2010).
- 2) D. Fujita, K. Suzuki, S. Sato, M. Yagi-Utsumi, Y. Yamaguchi, N. Mizuno, T. Kumazaka, M. Takata, M. Noda, S. Uchiyama, K. Kato, and M. Fujita "Protein encapsulation within synthetic molecular hosts" *Nat. Commun.* **3**, 1093 (2012).
- 3) Y. Inokuma, S. Yoshioka, J. Ariyoshi, T. Arai, Y. Hitora, K. Takada, S. Matsunaga, K. Rissanen, M. Fujita, "X-ray analysis on the nanogram to microgram scale using porous complexes" *Nature* **495**, 461-466 (2013).
- 4) D. Fujita, Y. Ueda, S. Sato, H. Yokoyama, N. Mizuno, T. Kumazaka, M. Fujita, "Self-assembly of  $M_{30}L_{60}$  Icosidodecahedron" *Chem* **1**, 91-101 (2016).
- 5) D. Fujita, Y. Ueda, S. Sato, N. Mizuno, T. Kumazaka, M. Fujita, "Self-Assembly of Tetrahedral Goldberg Polyhedra from 144 Small Components" *Nature* **540**, 563-566 (2016).



## 多次元分光計測法による新奇物性開拓 Exploring Novel Physical Properties by Multi-Dimensional Spectroscopy

木村 真一(教授(クロスアボット))  
KIMURA, Shinichi

1988年東北大学理学部物理第二学科卒、1991年東北大学大学院理学研究科物理学第二専攻博士課程修了、理学博士。1991年日本学術振興会特別研究員(PD)、1993年神戸大学助手、1993年分子科学研究所助手、1998年神戸大学助教授、2002年分子科学研究所助教授/准教授、2013年大阪大学教授、2020年分子科学研究所教授(クロスアボットメント)。  
mail: kimura@ims.ac.jp

1988 B.S. Tohoku University  
1991 Ph.D. Tohoku University  
1991 JSPS Postdoctoral Fellow, Tohoku University  
1993 Research Associate, Kobe University  
1993 Research Associate, Institute for Molecular Science  
1998 Associate Professor, Kobe University  
2002 Associate Professor, Institute for Molecular Science  
2013 Professor, Osaka University  
2020 Professor, Institute for Molecular Science (Cross Appointment)

### Keywords


Condensed Matter,  
Biological Materials,  
Optical Property,  
Synchrotron Radiation,  
Electron-Energy-Loss Spectroscopy

固体の特徴的な物性である電気伝導や磁石としての性質、さらには抵抗なく電流が永久に流れ続ける超伝導、また生命の営みの元となっている酸化還元反応や光合成など、物性の出現や生命現象に現れる化学反応の起源は、物質中のミクロな世界である電子の電荷やスピノの動き、格子・分子の振動、またはそれらの間の量子力学的な相互作用です。つまり、これらのミクロな情報を、空間・時間・運動量・スピノ方向・エネルギーの全て(多次元)に対して観測し可視化することができれば、物性や生命現象の起源を知るばかりでなく、新たな機能性の予測や創造も可能になります。

このミクロな情報を可視化するためには、光や電子などの量子ビームを使った方法が有効です。特に、相互作用した電子(準粒子)の観測には、光電子分光や赤外・テラヘルツ分光が有効です。そこで、これまで得られなかつた新しい情報を得るために、電子線加速器から発生するシンクロトロン光やレーザーを使った新たな分光法やイメージング手法を開発しています。また、電気伝導やスピノ波、格子振動などの集団励起の観測には、電子線を使った電子エネルギー損失分光法が有効であり、スピノ偏極高輝度電子源を使った新しい分光法の開発に着手しています。

このように、私達は、シンクロトロン光や高輝度電子源などの量子ビームを、物質の機能性の起源を見る新しい「目」として用いることで、これまで見えなかった電子状態の変化を可視化し、そこで得られた情報を元にして新しい機能性の創造を目指しています。

Physical and chemical properties of solids, such as conductivity, magnetism, superconductivity and chemical reactions, and also life phenomena, such as redox and photosynthesis, originate from microscopic electronic and vibrational properties in materials and their quantum mechanical interactions. To clarify the microscopic information of electronic and other states provides us not only the information of the origins of the physical properties and life phenomena but also the expectation and creation of novel functional properties. To visualize of the change of the microscopic state, we also develop novel spectroscopic techniques using synchrotron radiation, high brilliant electron beams and other so-called quantum beams. On the basis of the obtained information of electronic structures, we are aiming to develop novel physical properties of new materials.



Resonant electron-energy-loss spectroscopy (rEELS) apparatus developed by our group. The apparatus consists of a high-brilliant spin-polarized electron gun and a photoelectron spectrometer.

### 参考文献

- 1) P. N. Nguyen, H. Watanabe, Y. Tamaki, O. Ishitani, S. Kimura, "Relaxation dynamics of  $[Re(CO)_5(bpy)(P(OEt)_3)_2](PF_6)$  in TEOA solvent measured by time-resolved attenuated total reflection terahertz spectroscopy", *Sci. Rep.* **9**, 11772 (2019).
- 2) Y. Ohtsubo, Y. Yamashita, K. Hagiwara, S. Ideta, K. Tanaka, R. Yukawa, K. Horiba, H. Kumigashira, K. Miyamoto, T. Okuda, W. Hirano, F. Iga, S. Kimura, "Non-trivial surface states of samarium hexaboride at the (111) surface", *Nat. Commun.* **10**, 2298 (2019).
- 3) K. Hagiwara, Y. Ohtsubo, M. Matsunami, S. Ideta, K. Tanaka, H. Miyazaki, J. E. Rault, P. Le Fèvre, F. Bertran, A. Taleb-Ibrahimi, R. Yukawa, M. Kobayashi, K. Horiba, H. Kumigashira, K. Sumida, T. Okuda, F. Iga, S. Kimura, "Surface Kondo effect and non-trivial metallic state of the Kondo insulator  $YbB_{12}$ ", *Nat. Commun.* **7**, 12690 (2016).
- 4) S. Kimura, T. Iizuka, H. Miyazaki, A. Irizawa, Y. Muro, T. Takabatake, "Electronic-Structure-Driven Magnetic Ordering in a Kondo Semiconductor  $CeOs_2Al_{10}$ ", *Phys. Rev. Lett.* **106**, 056404 (2011).
- 5) S. Kimura, T. Ito, M. Sakai, E. Nakamura, N. Kondo, K. Hayashi, T. Horigome, M. Hosaka, M. Katoh, T. Goto, T. Ejima, K. Soda, "SAMRAI: A variably polarized angle-resolved photoemission beamline in the VUV region at UVSOR-II", *Rev. Sci. Instrum.* **81**, 053104 (2010).



## 放射光を利用して高機能触媒を開発する Catalysis Science and Technology based on XAFS and Related Spectroscopy using Synchrotron Radiation

高谷 光(准教授(クロスアソシエイト))  
TAKAYA, Hikaru

1993年大阪大学基礎工学部卒、1998年大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了、同大学院助手、2002年Scripps研究所招へい研究员(文部省在外研究员)、2008年京都大学化学研究所准教授、2019年分子科学研究所特别研究部門准教授。

TEL: 0564-55-7480  
mail: takaya@ims.ac.jp

1993 B.S. Osaka University  
1998 Ph.D. Osaka University  
1998 Assistant Professor, Graduate School of Engineering Science, Osaka University  
2002 Guest Scientist, The Scripps Research Institute,  
2008 Associate Professor, Institute for Chemical Research, Kyoto University  
2019 Associate Professor, Institute for Molecular Science


〈Keywords〉

XAFS,

Radiant Light Spectroscopy,  
Homogeneous Catalysis,  
Organometallic Chemistry,  
Element Strategy Initiative

私達の研究グループでは人類の物質生産を支えるのに必要な触媒や触媒技術を研究しています。優れた触媒を発見・開発するためには、触媒が分子や物質にどのように作用しているかを調べ、原子・分子レベルで反応機構を明らかにする必要があります。しかしながら、触媒分子の大きさは $10^{-9}$ m程度と極めて小さく、直接観ることはもちろん、顕微鏡などでも見ることができません。我々は、分子科学研究所のUVSORという放射光施設の強いX線を利用して、触媒分子を観る方法について研究を進めています。UVSORの強いX線を用いるX線吸収分光(XAS)を利用すると、反応溶液中にある触媒分子の構造や動きを精密に知ることができます。現在、我々はこのXASを用いて、特に鉄やニッケルの触媒作用の解明に取組んでいます。鉄やニッケルは生元素と呼ばれ、生物が普遍的に利用している毒性の低い金属であり、従来まで人類が用いてきた白金やパラジウムといった貴金属と比べて100億倍も豊富に存在する元素です。そのため、資源・環境問題に配慮した未来社会を支える触媒として期待されていますが、水や空気に極端に不安定であること、強い磁性を持つことから、今まで知られている手法では構造や作用を調べることが難しく研究が遅れています。UVSORの強いX線によって、これら触媒が働く仕組みを理解できれば、医薬品や電子材料の原料となる有機分子を今まで以上に効率良く安全に製造でき、触媒科学を通じてSDGs達成に貢献できることとなります。

For future sustainable development, we promote research development of advanced catalysts based on element strategy criteria. Non-precious metal such as iron, nickel, cobalt, and copper catalysts are investigated for synthetic transformation of various organic molecules related to pharmaceutical and photoelectronic materials. To elucidate the precise catalytic properties and mechanism, X-ray absorption spectroscopy and various radiant light spectroscopies provided at UVSOR are used, where development of a solution-phase *in situ* XAS spectroscopic techniques and system will be intensively conducted for the study of homogeneous organometallic catalysts. Multidisciplinary research covered on DFT and XAS spectroscopy is also conducted to achieve an efficient structural determination technique being never accessible by the conventional XAS-based structural analysis. Using these cutting-edge spectroscopic technologies, we aim to promote innovative catalyst research which enable us highly efficient transformation of extremely unreactive organic molecules such as simple aromatic compounds, CO<sub>2</sub>, and biomass into valuable functional materials.



### 参考文献

- 1) L. O. Benjamin, H. Takaya, T. Uemura, "Polymer Guest Directing the Solid-State Conversion of a Metal-Organic Framework", *J. Am. Chem. Soc.*, **141**, 14549–14553 (2019).
- 2) R. Agata, H. Takaya, T. Iwamoto, T. Hatakeyama, K. Takeuchi, N. Nakatani, M. Nakamura,\* "Difluorido Ferrate-Catalyzed Cross-Coupling Reaction of Deactivated Aryl Chlorides with a Variety of Alkyl Grignard Reagents", *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **92**, 381–390 (2019). BCSJ賞, Front cover.
- 3) H. Masafumi,\* K. Sano, Y. Kanazawa, N. Komine, Z. Maeno, T. Mitsudome,\* H. Takaya,\* "Mechanistic Insights on Pd/Cu-Catalyzed Dehydrogenative Coupling of Dimethyl Phthalate", *ACS Cat.*, **8**, 5827–5841 (2018).
- 4) R. Yoshida, K. Isozaki, T. Yokoi, N. Yasuda, K. Sadakane, T. Iwamoto, H. Takaya,\* M. Nakamura,\* "ONO-pincer Ruthenium Complex-bound Norvaline for Efficient Catalytic Oxidation of Methoxybenzenes with Hydrogen Peroxide", *Org. Biomol. Chem.*, **14**, 7468–7479 (2016). Front cover
- 5) H. Takaya,\* S. Nakajima, N. Nakagawa, K. Isozaki, T. Iwamoto, R. Imayoshi, N. Gower, L. Adak, T. Hatakeyama, T. Honma, M. Takagi, Y. Sunada, H. Nagashima, D. Hashizume, O. Takahashi, M. Nakamura,\* "Investigation of Organoiron Catalysis in Kumada-Tamao-Corriu-Type Cross-Coupling Reaction Assisted by Solution-Phase X-ray Absorption Spectroscopy", *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **88**, 410–418 (2015). BCSJ賞, Front cover.
- 6) H. Takaya, "Metal Array Fabrication based on Self-Assembly of Metalated Amino Acids and Peptides", In *Advanced in Bioorganometallic Chemistry*; T. Hirao, Ed.; Elsevier: 2018, Chapter 4, pp. 49–60 (2018).



## マイクロ固体フォトニクスの研究 Micro Solid-State Photonics

### 平等 拓範(特任教授) TAIRA, Takunori

1983年福井大学卒、1985年福井大学大学院修士課程修了、同年三菱電機(株)LSI研究所研究員、1989年福井大学工学部助手、1998年2月分子科学研究所准教授、2018年10月より理化学研究所グループディレクター、2019年4月より現職。2004年平成16年度文部科学大臣賞、2008年(財)光産業技術振興協会第24回櫻井健二郎氏記念賞、2010年米国光学会フェロー、2012年国際光学会フェロー、2014年米国電気電子学会フェロー、2018年IAPLEフェロー、2019年レーザー学会フェロー。TEL: 0564-55-7346 FAX: 0564-53-5727 mail: taira@ims.ac.jp

1983 B.A. Fukui University  
1985 M.Sc. Fukui University  
1996 Ph.D. Tohoku University  
1985-Researcher: LSI Research and Development Laboratory, Mitsubishi Electric Corp.,  
1989 Research Associate: Fukui University.  
1993 Visiting Researcher: Ginzon Laboratory, Stanford University

1998 Associate Professor: National Institutes of Natural Sciences, Institute for Molecular Science  
2006 Invited Professor: Pierre & Marie Curie University (Paris VI), Paris, France.

2011 Invited Professor, University Joseph Fourier, Grenoble, France.

2013 Invited Professor, ENSCP-Chimie ParisTech, Paris, France.

2018 Group Director, RIKEN SPring-8 Center

2019 Project Professor, Institute for Molecular Science

OSA, SPIE, IEEE, IAPLE, and LSJ Fellow

Keywords

Solid-State Lasers,  
Nonlinear Optics,  
Micro Solid-State Photonics

光の波長と同程度のミクロンオーダーで物質・材料の性質を制御する事で光波を高度に操る“マイクロ固体フォトニクス”に関する研究を展開しています。マイクロドメイン制御で物質に新たな光機能が発現でき、マイクロ共振器による高コヒーレント光・高輝度光発生が望めるようになりました<sup>1-5)</sup>。そして新材料レーザーセラミックの発掘、非線形素子の開発を含めた物質・材料研究の成果としてマイクロチップレーザーによる世界初の自動車のエンジン点火<sup>6-8)</sup>、真空紫外の波長118nm<sup>9)</sup>からTHz波の300-500μm<sup>10)</sup>に至る広帯域な高効率波長変換などを実証してきました。なお、コヒーレンス長に合せマイクロドメイン分極を制御する擬似位相整合(QPM)による新たな非線形素子の開発も、この成果に大きく貢献しました。そして近年、表面活性接合(SAB)に成功する事で一体型多ディスクレーザー構造が可能となり可能性が広がりました<sup>11)</sup>。この接合による分布面冷却(DFC)多ディスクまたはチップ利得媒質構造は、小型高利得構成で、高出力・高強度レーザーが望めます。一方、多数の薄板水晶を張り合わせたQPM-水晶は高耐性で有るだけで無く固体材料での真空紫外までの波長変換素子となり得ます<sup>12)</sup>。このように物質・材料を制御する手法を極める事で、モジュール化された小型集積レーザー(TILA)による極限的な高輝度固体レーザーが望め、理研と連携し卓上XFEL<sup>13-15)</sup>を可能とするレーザー駆動電子加速を推進させることで分子科学に新展開をもたらすだけ無く、イノベーション創出にも貢献できる期待しています(Fig. 1)。



“Micro Solid-State Photonics” based on the micro domain structure and boundary controlled materials, opens new horizon in the laser science. The engineered materials of micro and/or microchip solid-state, ceramic and single-crystal, lasers can provide excellent spatial mode quality and narrow linewidths with enough power<sup>1-5)</sup>. High-brightness nature of these lasers has allowed efficient light-matter interaction and wavelength extension by nonlinear frequency conversion: the world first YAG ceramic microchip laser ignited car<sup>6-8)</sup>, highly efficiency broad frequency conversions from the wavelength of 118 nm VUV<sup>9)</sup> until 300-500 μm THz waves<sup>10)</sup>, and so on. In addition, the quasi phase matching (QPM) is an attractive technique for compensating phase velocity dispersion in frequency conversion. Lately, we propose a new architecture to realize a monolithic multi-disk laser by the surface activated bonding (SAB)<sup>11)</sup>. This multiple thin-disk or chip gain medium for distributed face cooling (DFC) structure can manage the high-power and high-field laser with high-gain compact system. Besides, QPM-structured crystal quartz constructed by multi-plate stacking could be promising as a high-power and reliable VUV frequency conversion devices<sup>12)</sup>. These downsized and modularized tiny integrated lasers (TILA) promise the extremely high-brightness lasers to open up the new science, such as laser driven electron accelerator toward table-top XFEL with RIKEN Spring-8 Center<sup>13-15)</sup>, and innovation by the compact power laser (Fig. 1).

Fig. 1 TILA consortium toward “Laser Science and Innovation” by micro solid-state photonics.

### 参考文献

- 1) T. Taira, et al., *Opt. Lett.* **16** (24) 1955 (1991).
- 2) T. Taira, et al., *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* **3** (1) 100 (1997).
- 3) T. Taira, *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* **13** (3) 798 (2007).
- 4) T. Taira, *Opt. Mater. Express* **1** (5) 1040 (2011).
- 5) Y. Sato, et al., *Scientific Reports* **7**, 10732 (2017).
- 6) H. Sakai, et al., *Opt. Express* **16** (24) 19891 (2008).
- 7) M. Tsunekane, et al., *IEEE J. Quantum Electron.* **46** (2) 277 (2010).
- 8) T. Taira, et al., *The 1st Laser Ignition Conference '13*,

OPIC '13, Yokohama, April 23-26, LIC3-1 (2013).

9) R. Bhandari, et al., *Opt. Express* **21** (23) 28849 (2013).

10) S. Hayashi, et al., *Scientific Reports* **4**, 5045 (2014).

11) L. Zheng, et al., *Opt. Mater. Express* **7** (9), 3214 (2017).

12) H. Ishizuki, et al., *Opt. Mater. Express* **8** (5), 1259 (2018).

13) N.H. Matlis, et al., *Nuclear Inst. and Methods in Physics Research A*, **909**, 27 (2018).

14) S.W. Jolly, et al., *Nature Commun.* **10** (2591), 1 (2019).

15) [http://www.riken.jp/en/research/labs/rsc/innov\\_light\\_src/laser\\_drive\\_electron\\_accel\\_tech/](http://www.riken.jp/en/research/labs/rsc/innov_light_src/laser_drive_electron_accel_tech/)

# 共同利用・共同研究をささえる最先端の研究設備

State-of-the-art facilities supporting cutting-edge research

研究施設

## 極端紫外光研究施設 UVSOR Synchrotron Facility

光は、その波長によって、赤外線、可視光線、紫外線、極端紫外線、X線、と様々な名前で呼ばれます。この様々な波長域の光を一度に出すことできる装置がシンクロトロン光源です。高エネルギーの電子ビームが高磁場中で発するシンクロトロン光は、あらゆる波長域において高強度で指向性が高く、分子科学を始め幅広い研究分野で利用されています。分子科学研究所の極端紫外光研究施設は1983年に稼働を始めたシンクロトロン光源ですが、幾度かの改良を経て、現在でも、極端紫外線から赤外線・テラヘルツ波に至る低エネルギーのシンクロトロン光源として世界最高水準の高輝度性を誇っています。その特性を活かして、物質の機能性の起源である電子状態の直接観測が行われています。UVSORという愛称で世界的に知られ、国内のみならず世界各地から利用者を受け入れています。

Light is called with various names such as infrared, visible, ultraviolet, vacuum-ultraviolet and X-ray, depending on its wavelength. A synchrotron light source is capable of producing light in the ultra-wide wavelength range from infrared to X-rays.

Synchrotron light radiated by high energy electrons traveling in a strong magnetic field is intense and highly collimated. It is widely used in various research fields including molecular science. In IMS, a synchrotron light source has been operational since 1983. After several upgrades, it is still the brightest in the world among low energy synchrotron light sources. By utilizing its excellent performance, the electronic structure that is the origin of the functionalities of solids is directly observed. This facility is called UVSOR and is used by many researchers not only from our country but also from overseas.



UVSOR施設

先端電子構造評価法として  
BL6Uに光電子波数顕微鏡  
装置が導入された

Photoelectron Momentum  
Microscope was launched  
at beamline BL6U as state-of-  
the-art instrument to evaluate  
the electronic structure




UVSORの  
シンクロトロン光を用いた  
走査型透過X線顕微鏡装置

Scanning Transmission  
X-ray Microscope utilizing  
synchrotron radiation from  
UVSOR.

## 機器センター Instrument Center

機器センターは分子スケールナノサイエンスセンターと分子制御レーザー開発研究センターの汎用機器を統合して、平成19年4月に新たに発足しました。機器センターでの主たる汎用機器は山手地区のNMR、質量分析装置、粉末X線回折装置、円二色性分光装置、明大寺地区のESR、SQUID磁束計、X線回折装置(粉末、単結晶)、波長可変ピコ秒レーザーシステム、蛍光分光装置、紫外可視近赤外分光装置などです。また大学連携研究設備ネットワーク事業を推進し、各種講習会の実施や、機器利用の予約・課金webシステムを提供し、全国的な汎用機器の共同利用を支援しています。平成27年度からはナノプラットフォーム事業が統合され、施設利用による共用設備運用に加えて、協力研究を通じて多くの先端機器が利用可能となっています。

Instrument Center was established in 2007 by integrating two research centers in IMS. The main instruments maintained in YAMATE campus are: NMR, MALDI, X-ray diffractometers, etc; in MYODAIJI: ESR, SQUID, SEM, Spectrometers (FTIR, UV-vis, ESCA, ARUPS), etc. The center organizes the Inter-University Network for Common Utilization of Research Equipments and Nanotechnology Platform Program supported by MEXT.



CCD単結晶X線解析計  
CCD X-ray Diffractometer.



高周波・高磁場電子スピン共鳴装置  
High-frequency ESR Spectrometer.

## 装置開発室 Equipment Development Center

装置開発室では、分子科学研究に必要な様々な実験装置の製作・開発を行っています。機械、エレクトロニクス、微細加工などの設備を有し、高度な技術・技能を有する技術者が配属されています。研究所創設当初から、所内外の研究者と密接に連携し、独創的な研究を可能とする様々な実験装置の開発を手掛けてきました。将来の分子科学研究を支えるために、より先進的な技術の習得にも積極的に取り組んでいます。研究者や学生に対して機械加工や電子回路工作に関する講習会を開催し、技術の普及にも努めています。

Equipment development center provides technical services to support advanced molecular sciences with new equipments. Machining, electronics, micro-patterning, and 3D-printing facilities are maintained by skilled technical staffs who help researchers design and fabricate state-of-the-art equipment.



## 岡崎共通研究施設

## 計算科学研究センター Research Center for Computational Science

我が国唯一の分子科学分野の理論計算科学研究のための共同利用施設です。先導的な学術研究の発信はもとより、岡崎地区の3研究所と全国の分子科学とバイオサイエンスの研究者に対して、大学等では不可能な大規模計算を実行できるハード環境と様々なプログラムソフトを提供しています。平成29年10月からは従前の2システムを統合化した総理論演算性能が4PFlopsの「高性能分子シミュレータ」の運用を開始し、大規模な計算が実行できる環境を提供しています。

Research Center for Computational Science provides state-of-the-art computational resources to academic researchers in molecular science and related fields, e.g. quantum chemistry, molecular simulations, and solid state physics. The computer systems consist of NEC LX406R-2, LX110Rh-1 and LX108Th-4G. Total performance is 4PFlops.



# 私たちの使命 Our Mission

## 国内外の研究者への共同研究・共同利用支援に関する事業 Serving as a core organization for domestic and international collaborations

国内・海外の研究者が分子研を訪れ、施設や機器を利用しています。

分子科学研究所は、UVSOR、および、計算科学研究センターなどの大型施設を、「施設利用」として当該分野コミュニティーの研究者に広く利用して頂いています。また、メゾスコピック計測研究センター、機器センターなどの研究センター、装置開発室において、先端的な装置を利用して共同で研究を進めて頂くとともに、測定法や物質合成手法の開発などを支援しています。さらに、これらセンターならびに各研究領域における研究資源を利用しながら、所内の教員と複数の所外研究者との連携の下で行う「課題研究」、所内の教員と一緒に共同研究を行なう「協力研究」も実施しています。また、「大学連携研究設備ネットワーク」の中核拠点として、分子科学領域における先端的研究設備の相互利用による共同研究の促進にも取組んでいます。これらのハードウェアを中心とした共同利用と共に、特定の課題に関する討論を深め、更なる新しい発展を探るための有効な手段として、所外の研究者の提案をもとにした研究集会である「分子研研究会」、「分子科学国際研究集会(岡崎コンファレンス)」を毎年複数回開催しています。



### 共同利用国際研究 International Joint Research

UVSORをはじめ、所内の最先端施設・装置を海外の研究者に利用開放し、共同利用・共同研究を行っています。  
**44件実施 (2018.10-2019.9)**

IMS opens up state-of-the-art facilities including UVSOR for collaborative and/or joint researches.  
**44 projects (October 2018 - September 2019)**

#### ■共同利用研究実施一覧 2019年度

実施内容	件数	人数
課題研究	2	7
協力研究	37	127
協力研究(ナノプラット)	78	92
研究会	6	68
若手研究活動支援	2	32
岡崎コンファレンス	2	66
UVSOR施設利用	186	976
UVSOR施設利用(ナノプラット)	4	15
機器センター施設利用(ナノプラット)	126	317
装置開発室施設利用	3	5
装置開発室施設利用(ナノプラット)	9	25
計算科学研究センター施設利用	268	1,048
所長招へい	84	94
合 計	807	2,872

## 大学連携研究設備ネットワークの構築 Inter-University Network for Common Utilization of Research Equipments (EqNW)

分子科学研究所は、広く国内の研究者がインターネットを通じて大学の研究設備を有効に活用するための組織である「大学連携研究設備ネットワークによる設備相互利用と共同研究の促進」事業の中核機関を務めています。本ネットワークには、全国の大学や企業を含めた約300の機関が参加しており、2,300台以上の研究設備の利用案内とそのうち750台以上の設備についての利用予約・課金システムを運用しています。1万名を超える研究者がユーザーとして登録されており、毎月10,000件以上の利用実績があります。一部は依頼計測も可能です。目前で高価な装置を購入することなく先端測定が行える研究支援事業として広く有効に活用されています。

- More than 10,000 registered users
- Mutual utilization among national universities (since FY2007)
- Open for private universities, public institutes, private companies (more than 300 organizations)




## ナノテクノロジープラットフォーム分子・物質合成 MEXT Nanotechnology Platform Molecule & Material Synthesis Platform

平成24年度から始まった文科省ナノテクノロジープラットフォーム事業は、最先端の研究設備とその活用のノウハウを有する機関が緊密に連携して全国的な設備の共用体制を共同で構築し、産業界や研究現場が有する技術的課題の解決へのアプローチを提供するとともに産学官連携や異分野融合を推進するものです。本事業では、微細構造解析、微細加工、分子・物

質合成の3つの全国規模のプラットフォームが構築され、分子研は、分子・物質合成の代表機関と実施機関を担い、高性能かつ安全安心な次世代分子・物質材料創成のための研究支援を実施しています。詳細は下記URLにアクセスの上ご参照ください。

- MEXT Nanotechnology Platform (FY2012-2021)
- IMS as the core representative organization of the Molecule & Material Synthesis Platform
- Open for domestic and international universities, institutes & private companies

[事業全体] <https://nanonet.mext.go.jp/> [代表機関] <https://mms-platform.com/> [分子研] <https://nanoims.ims.ac.jp/ims/>



分子科学を中心とした基礎科学研究の振興に資する人事施策を検討、  
共同利用機関としての新たな取り組みを始めています。

Institute for Molecular Science (IMS) has strengthened its personnel affairs measures as an Inter-University Research Institute by the following new approaches, to contribute to the promotion of the basic research mainly in molecular science field.

大学の研究活動の活性化に貢献する施策として、新しい人事交流制度を開始しました。

具体的には、以下の2制度を試行し、分子科学分野のトップレベル研究の支援と、研究者層の厚みを増強するための支援を行います。

#### 特別研究部門

1. 分子科学分野において最先端の科学を切り拓く世界的研究者を「卓越教授」として招聘し、研究に専念できる環境を提供します。
2. 分子科学分野において独創的な研究を行っている大学教員をクロスアポイントメントで招聘し、分子研の先端設備を使った研究に集中的に取り組む場を提供します。

#### Division of Advanced Molecular Science

1. IMS invites Distinguished Professor who leads world-class unique research in the field of molecular science, and provides environment to devote themselves to research.
2. IMS invites Adjunct Professors from universities and institutes, who leads a unique research in molecular science utilizing state-of-the-art facilities of IMS, by Cross-Appointment system.

分子科学研究所と企業などからの資金によって運営するオープンイノベーション拠点とし  
産官学の共同研究を実施します。

Institute for Molecular Science (IMS) has launched a division for research collaboration to commercialize the latest technology by running a project with industrial funding along with the government support. As a center of open innovations, we will expand it and strengthen the cooperative relationship among Industry, Academia and Government.

分子科学研究所では、分子科学の研究の切り口を増やし、研究分野の裾野を広げる取り組みの一つとして、複数の企業等外部機関からの会費により運営するオープンイノベーションの拠点「社会連携研究部門」を設置することといたしました。本研究部門では、日本における超小型レーザー技術によるイノベーションを図ることとし、産学官を交えた知識集積型のレーザー研究開発イノベーション拠点「小型集積レーザーコンソーシアム(TILA : Tiny Integrated Laser)」を形成し、本趣旨に賛同する複数の企業等外部機関と緊密に連携を取りながら、新たな産学連携研究の創出を目指します。

Division of Research, Innovation and Collaboration has been established in Institute for Molecular Science as one of the projects to open up the new aspects of researches on molecular science and to expand the range of the research fields. The division is a center of open innovations and run by membership fees from outside organizations such as commercial enterprises. TILA, Tiny Integrated Laser, Consortium has been formed in the division with the aim of making innovations based on ultra-small laser technologies in Japan. TILA Consortium is an industry-academia-government, knowledge-intensive innovation center of research and development on lasers and cooperates closely with the outside organizations which approve of the above purpose and is intended for creating new industry-academia joint researches.

## 世界に広がるネットワークの構築 Constructing a world-wide research network

分子科学研究所は、国際的な分子科学研究の中核拠点としても積極的な役割を果たしています。

### 国際共同研究拠点の形成、若手研究者的人材育成 International Collaboration Programs

分子科学研究所は創設以来、多くの国際会議の開催、多数の外国人研究員の受け入れ、および国際共同研究事業の積極的な推進など、国際的に開かれた研究所としての役割を担ってきました。国際共同研究を更に推進するために、平成16年度より独自の国際共同研究事業を開始しています。この事業では、(1) 分子研国際インターンシッププログラム、(2) 分子研国際若手研究者招へいプログラム等の特長ある国際共同を推進しています。アジア各国および欧米の研究教育拠点等と学術交流協定を締結し、国際共同を重点化しています。

外国人研究者の国別内訳(2019年度) Visiting Foreign Researchers (FY2019)

アメリカ USA	2
イギリス UK	2
ドイツ Germany	9
フランス France	10
韓国 Korea	20
中国 China	10
その他 Others	62
合計 Total	115(人)



IMS has accepted many foreign scientists and hosted numerous international conferences since its establishment and is now widely recognized as a leading institute that promotes firm international collaborations. In 2013, IMS initiated a new program to further promote international collaboration. As a part of this new program, IMS has been promoting the IMS International Internship Program for Foreign Graduate Students and the IMS International Fellowship Program for Young Foreign Researchers, through several foreign nominating institutions and universities.

### 学術国際交流協定に基づく交流(10機関) International Exchange Agreements (10 organizations)

フランス	France
フランス国立パリ高等化学学校	École Nationale Supérieure de Chimie de Paris
ドイツ	Germany
ベルリン自由大学	Freie Universität Berlin
フィンランド	Finland
オウル大学	University of Oulu
タイ	Thailand
タイ国立ナノテクノロジー研究センター	National Nanotechnology Center, National Science and Technology Development Agency
中国	China
固体表面物理化学国家重点実験室、廈門大学	State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces (PCOSS), Xiamen University
台湾	Taiwan
中央研究院原子與分子科学研究所 国立交通大学	Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica National Chiao Tung University
韓国	Korea
韓国高等科学技術院 韓国化学会物理化学ディビジョン 成均館大学	The College of Natural Science, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Physical Chemistry Division, Korean Chemical Society Sungkyunkwan University

### 総研大の交流(5機関) Exchange Programs of SOKENDAI (5 Universities)

タイ	Thailand
チュラロンコーン大学 理学部 カセサート大学 理学部 ヴィダヤシリメー科学技術大学学院大学	Chulalongkorn University / Faculty of Science Kasetsart University / Faculty of Science Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)
マレーシア	Malaysia
マラヤ大学 理学部	University of Malaya / Faculty of Science
韓国	Korea
科学技術聯合大学院大学校	University of Science and Technology

# 充実した研究環境が育む分子科学の担い手

Excellent environment nurtures next generation of molecular scientists

人材育成・大学院教育

本研究所は、分子科学における最先端の研究を推進するだけではなく、学生の教育を行い、明日の分子科学を担っていく人材を育成することにも力を入れています。

## 総合研究大学院大学

SOKENDAI The Graduate University for Advanced Studies

分子科学研究所は、総合研究大学院大学の物理科学研究科において構造分子科学専攻と機能分子科学専攻を担当し、次代を担う若手研究者の育成にも積極的に取り組んでおり、大学や民間で活躍する多くの卒業生を輩出しています。

The graduate students of the Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) take molecular science classes, including chemical science, physical science, material science, and bioscience.



### 研究所で学ぶためには Admissions

分子科学研究所で学ぶためには、総合研究大学院大学の物理科学研究科・構造分子科学専攻もしくは機能分子科学専攻へ入学していくことになります。

※すでに大学院に在籍している学生の方は「特別共同利用研究員」として分子研で学ぶことが出来ます。

If you wish to study at IMS, you need to apply for admission to either the Department of Structural Molecular Science or the Department of Functional Molecular Science of SOKENDAI.



### 総合研究大学院大学とは? About SOKENDAI?

総合研究大学院大学(総研大)は昭和63年に、全国の大学共同利用機関を基盤機関として、新しい理念と組織の下に創設された学部を持たない大学院のみの大学です。本部を神奈川県葉山町に置き、学生のみならず研究者自身の総合性と学際性を高めることを目指して、海外インターンシップ、学生セミナー、国際シンポジウム、共同研究等々のユニークな活動を本部で行いつつ、平素の授業や研究活動は各基盤研究機関において行っています。



SOKENDAI [The Graduate University for Advanced Studies] was founded on October 1, 1988 as one of the national universities of Japan. The headquarter is located in Shonan Village (Hayama-cho, Miura-gun) in Kanagawa Prefecture, Japan. Each department is housed in its parental institute.

### 出身者進路状況 Career after graduation




2019年12月現在 計261名 Total: 261 (updated in December 2019)

## 特別共同利用研究員

他の大学に所属している修士、博士の学生の方々を「特別共同利用研究員」として受け入れ、研究指導を行っています。全国から毎年20名程度の学生の方々が分子研に滞在し、研究に取り組んでいます。

受け入れ大学(過去10年)： 北海道大学、茨城大学、宇都宮大学、千葉大学、東京大学、東京工業大学、新潟大学、信州大学、静岡大学、名古屋大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、北陸先端科学技術大学院大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、愛媛大学、九州大学、名古屋市立大学、早稲田大学 他



# 広く社会に「科学の芽」を育む

Promoting widespread awareness of science in the society

社会との交流 ■



## 分子科学フォーラム

### Molecular Science Forum

豊田理化研究所との共催で"分子科学フォーラム"を年4回開催しています。国内外の著名な研究者を講師にお迎えし、分子科学をはじめとして様々な分野の研究をわかりやすく紹介して頂いています。

## 国研セミナー

### Knowledge Enhancement Workshop for Science Teachers

岡崎市の科学技術・理科教育振興事業の一環として、岡崎3研究所と岡崎南ロータリークラブとの協力事業の一つとして行われているセミナーです。岡崎市内の小・中学校の理科教員を対象として、岡崎3研究所の研究者が講師となって昭和60年から始まり、毎年行われています。

## 見学受入れ

### Campus Tour

研究所を多くの方に知って頂くため、見学の受入れを行っています。体験型展示室をはじめ、最先端の研究施設等を毎年たくさんの方に見学いただいている。平成31年度は381人の見学者にお越しいただきました。



## メディアによる情報発信

### Public Relations

最新の研究成果や各種募集をホームページに掲載しています。また、分子研が発行している出版物についても、ホームページよりご覧いただけます。

<https://www.ims.ac.jp/>



## 出前授業

### Collaboration with Okazaki City Education Board

学校では普段体験できないことを体験してもらい、科学に対しての夢を持つてもらうために、主に岡崎市内の中学校を対象として、岡崎3研究所の研究者が講義・実験を行っています。

## スーパーサイエンスハイスクール

### Super Science Highschool

文部科学省が指定した科学技術・理科・数学教育を重点的に行う高等学校(スーパーサイエンスハイスクール)活動を、自然科学研究機構として支援しています。



## 一般公開

### Open Campus

研究所で行われている活動について、広く一般の方々に理解を深めていただくため、3年に1回一般公開を行っています。公開日(2021年度開催予定)は実験室の公開や講演会など様々なイベントを行います。

## ■自然科学研究機構 岡崎共通施設

## Common Facilities in Okazaki

### 岡崎情報図書館

Okazaki Library and Information Center  
<http://www.lib.orion.ac.jp/>

岡崎情報図書館は、岡崎3研究所の図書、雑誌等を収集・整理・保存し、機関の職員、共同利用研究者等が利用できます。

#### [主な機能]

情報検索サービス  
Web of Science、  
SciFinder 等



In the Okazaki Library and Information Center, books and journals from three affiliated institutes (IMS, NIBB, NIPS) are collected, arranged, and stored for the convenient use of staff and visiting users.

#### [Available services]

◎ Online access to various journals and databases (Web of Science, SciFinder, etc) available.

### 岡崎コンファレンスセンター

Okazaki Conference Center  
<http://www.orion.ac.jp/occ/>

学術の国際的及び国内的交流を図り、機関の研究、教育の進展に資するとともに、社会との連携、交流に寄与することを目的とした施設です。大隅ホール208名、中会議室112名、小会議室(2室)各50名の利用ができます。



The Okazaki Conference Center was founded in February 1997 for the purposes of hosting international and domestic academic exchanges, developments in research and education in the three Okazaki institutes, as well as the promotion of social cooperation. An auditorium (Ohsumi Conference Hall), a middle room (Conference Room B) and two small rooms (Conference Room C) with seating capacities of 208, 120, and 50, respectively, are available.

### 岡崎共同利用研究者宿泊施設


Accommodation Facilities for Researchers  
<http://www.orion.ac.jp/lodge/>

日本全国及び世界各国の大学や研究機関から共同利用研究等のために訪れる研究者のための宿泊施設として共同利用研究者宿泊施設(三島ロッジ、明大寺ロッジ)があります。



For visiting researchers from universities and institutes within Japan and all over the world, the dormitory called the Mishima Lodge is available. It takes 10 minutes on foot from the Myodaiji area to the Mishima Lodge. On September 2010, the new dormitory called "Myodaiji lodge" opened at the Myodaiji area. This dormitory is for long stay.

所内案内 Campus Map



施設 Facility	面積 m <sup>2</sup>
① 研究棟 Main Office Bldg.	2,790
② 実験棟 Main Laboratory Bldg.	8,857
③ 南実験棟 South Laboratory Bldg.	3,935
④ 計算科学研究センター棟 Computer Center Bldg.	2,474
⑤ 共同研究棟A棟 Joint Research Bldg. A	1,527
⑥ 共同研究棟B棟 Joint Research Bldg. B	1,260
⑦ 共同研究棟C棟 Joint Research Bldg. C	1,053
⑧ 共同研究棟D棟 Joint Research Bldg. D	1,063
⑨ 共同研究棟UVSOR棟 Joint Research Bldg. UVSOR	3,097
⑩ 事務センター棟 Administration Bureau	2,371
⑪ 図書館 Library	2,002
⑫ 職員会館 Faculty Club & Coop	1,575
⑬ エネルギーセンター Electricity Control Station	1,514
⑭ 廃棄物貯蔵庫 Waste Strage	60
⑮ 警備員室 Guard Station	131
⑯ 岡崎コンファレンスセンター Okazaki Conference Center	2,863
⑰ 三島ロッジ Mishima Lodge	4,079
⑱ 山手1号館A Yamate No.1 Bldg. A	4,674
⑲ 山手1号館B Yamate No.1 Bldg. B	2,303
⑳ 山手2号館 Yamate No.2 Bldg.	8,703
㉑ 山手3号館 Yamate No.3 Bldg.	10,757
㉒ 山手4号館 Yamate No.4 Bldg.	3,813
㉓ 山手5号館 Yamate No.5 Bldg.	664
㉔ 実験排水処理施設 Waste Disposal and Treatment Facility	111
㉕ 高圧配電施設 High-Voltage Distribution Facility	540
㉖ 明大寺ロッジ Myodaiji Lodge	1,023
㉗ IBBPセンター棟 NIBB Center of Interuniversity Bio-Backup Project	492

## 運営

### ■顧問

研究所の研究、事業計画その他の管理運営に関して、所長の諮問に応じて助言等に当たります。外国人運営顧問に加えて、国内で運営顧問及び研究顧問を置いています。	[研究顧問] 中嶋 敦 慶應義塾大学理工学部教授 Hrvoje Petek 米国ピッツバーグ大学教授	[運営顧問] 菊池 昇 株式会社豊田中央研究所代表取締役所長 長我部 信行 株式会社日立製作所ライフ事業統括本部企画本部長 瀧川 仁 東京大学物性研究所教授 松本 吉泰 公益財団法人豊田理化学研究所常勤フェロー	[外国人運営顧問] Josef Michl Professor, University of Colorado Boulder Ching Wan Tang Chair Professor, The Hong Kong University of Science and Technology
--	--	---	--

### ■運営会議

研究教育職員の人事、共同利用・共同研究等研究所の運営に関する重要事項で、所長が必要と認めるものについて所長の諮問に応じます。	[運営会議委員] ○…議長 ○…副議長 秋吉 一成 京都大学大学院工学研究科教授 鹿野田 一司 東京大学大学院工学系研究科教授 袖岡 幹子 理化学研究所袖岡有機合成化学研究室主任研究員 谷村 吉隆 京都大学大学院理学研究科教授 中井 浩巳 早稲田大学理工学部院教授 忍久保 洋 名古屋大学大学院工学研究科教授 芳賀 正明 中央大学理学部名誉教授 藤井 正明 東京工業大学科学技術創成研究院教授 福井 賢一 大阪大学大学院基礎工学研究科教授 ○ 村越 敬 北海道大学理学研究院教授	○ 秋山 修志 協奏分子システム研究センター教授 飯野 亮太 生命・錯体分子科学研究領域教授 石崎 章仁 理論・計算分子科学研究領域教授 江原 正博 理論・計算分子科学研究領域教授 魚住 泰広 生命・錯体分子科学研究領域教授 岡本 裕巳 メソスコピック計測研究センター教授 加藤 晃一 生命創成探究センターセンター長 解良 聰 光分子科学研究領域教授 齊藤 真司 理論・計算分子科学研究領域教授 山本 浩史 協奏分子システム研究センター教授 横山 利彦 物質分子科学研究領域教授
運営会議に、次の人選考部会及び共同研究専門委員会を置きます。	[人事選考部会] ○…部会長 秋吉 一成(京大院教授) ○ 飯野 亮太(分子研教授) 鹿野田 一司(東大院教授) 石崎 章仁(分子研教授) 忍久保 洋(名大院教授) 江原 正博(分子研教授) 中井 浩巳(早稲田大院教授) 解良 聰(分子研教授) 福井 賢一(阪大院教授) 横山 利彦(分子研教授)	[共同研究専門委員会] ○…委員長 石森 浩一郎(北大院教授) ○ 魚住 泰広(分子研教授) 唯 美津木(名大院教授) 齊藤 真司(分子研教授) 大内 幸雄(東工大院教授) 山本 浩史(分子研教授) 藤井 正明(東工大院教授) 田中 清尚(分子研准教授) 秋山 修志(分子研教授) 西村 勝之(分子研准教授) 杉本 敏樹(分子研准教授)

### ■学会等連絡会議

所長の要請に基づき学会その他の学術団体等分子科学コミュニティとの連絡、運営会議、研究施設運営委員会委員候補者等の推薦等に関することについて検討し、意見を述べます。	林 高史(阪大院教授) 細越 裕子(大阪府大院教授) 飯野 亮太(分子研教授) 黒田 一幸(早稲田大院教授) 矢橋 牧名(理研グループディレクター) 石崎 章仁(分子研教授) 北川 進(京大高等院拠点長) 大島 康裕(東工大院教授) 岡本 裕巳(分子研教授) 八島 栄次(名大院教授) 武次 徹也(北大院教授) 解良 聰(分子研教授) 林 重彦(京大院教授) 中澤 康浩(阪大院教授) 櫻山 儀恵(分子研准教授) 竹中 康司(名大院教授) 山口 祥一(埼玉大院教授) 廣井 善二(東大院教授)
---	--

### ■教授会議

専任・兼任・併任・客員の教授及び准教授で構成し、研究及び運営に関する事項について所長を補佐します。

## 中期計画

文部科学大臣から提示された平成28年度から平成33年度までの第3期中期目標に対して、自然科学研究機構として第3期中期計画を立てました。中期計画を着実に行うために毎年、年度計画を立て、年度終了後、実績報告書を文部科学省に提出することになっています。分子科学研究所は研究者個人の自由な発想に基づく基礎学術研究を中心に据えた研究所です。研究の神髄は計画通りに行かない意外性にあります。そのため、分子科学研究を支えている種々の研究設備も、限定した目的のためのものではなく、学問の多様性に対応できるものになっています。以下は、このような背景で立案した分子科学の研究分野の中期計画(抜粋)です。

分子科学分野において、物質・材料の基本となる様々な分子及び分子システムの構造、機能、反応に関して、原子・分子及び電子のレベルで研究します。

それによって、化学現象の法則を発見するとともに、一般化して新たな現象や機能を予測、実現します。

(1)理論的・計算化学的方法により、様々な分子システムの構造・性質とその起源を解明するとともに、新たな機能開拓に向けた研究を行います。

(2)高度な光源や先端的分光法の開発を行うとともに、分子システムに内在する高次機能の機構解明や光制御に関する研究を行います。

(3)新規な電気的・磁気的・光学的特性や高効率な物質変換・エネルギー変換を目指して、分子物質や化学反応系の設計・開発を行います。

## Administration

### ■ Senior Scientific Advisors

NAKAJIMA, Atsushi Professor, Keio University  
Hrvoje Petek Professor, University of Pittsburgh

### ■ Councillors

KIKUCHI, Noboru	President, Toyota Central R&D Labs ,Inc
OSAKABE, Nobuyuki	Hitachi, Ltd General Manager, Strategy Division, Smart Life Business Management Division, Chief Executive of Healthcare Business Unit
TAKIGAWA, Masashi	Professor, Institute for Solid State Physics (ISSP) of The University of Tokyo
MATSUMOTO, Yoshiyasu	Fellow, Toyota Physical and Chemical Research Institute



### ■ Foreign Councillors

Josef Michl	Professor, University of Colorado Boulder
Ching Wan Tang	Chair Professor, The Hong Kong University of Science and Technology

### ■ Advisory Committee

AKIYOSHI, Kazunari	Professor, Department of Polymer Chemistry, Kyoto University
KANODA, Kazushi	Professor, Department of Applied Physics, The University of Tokyo
SODEOKA, Mikiko	Chief Scientist, Synthetic Organic Chemistry Laboratory, RIKEN
TANIMURA, Yoshitaka	Professor, Department of Chemistry, Kyoto University
NAKAI, Hiromi	Professor, Department of Chemistry & Biochemistry, Waseda University
SHINOKUBO, Hiroshi	Professor, Graduate School of Engineering, Nagoya University
HAGA, Masaaki	Professor Emeritus, Faculty of Science and Engineering, Chuo University
FUJII, Masaaki	Professor, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology
FUKUI, Kenichi	Professor, Graduate School of Engineering Science, Osaka University
MURAKOSHI, Kei	Professor, Graduate School of Science, Hokkaido University
AKIYAMA, Shuji	Professor, Institute for Molecular Science (Chair)
IINO, Ryota	Professor, Institute for Molecular Science
ISHIZAKI, Akihito	Professor, Institute for Molecular Science
EHARA, Masahiro	Professor, Institute for Molecular Science
UOZUMI, Yasuhiro	Professor, Institute for Molecular Science
OKAMOTO, Hiromi	Professor, Institute for Molecular Science
KATO, Koichi	Professor, Exploratory Research Center on Life and Living Systems
KERA, Satoshi	Professor, Institute for Molecular Science
SAITO, Shinji	Professor, Institute for Molecular Science
YAMAMOTO, Hiroshi	Professor, Institute for Molecular Science
YOKOYAMA, Toshihiko	Professor, Institute for Molecular Science

## アクセス Access



### ■ 東京方面から

豊橋駅下車、名鉄(名古屋鉄道)に乗り換えて、東岡崎駅下車(豊橋一東岡崎間約20分)、南口より徒歩約7分。

### From Tokyo

At Toyohashi Station, catch the Meitetsu train and get off at Higashi-Okazaki Station (approx. 20 min from Toyohashi to Higashi-Okazaki). Turn left at the ticket gate and walk south for approx. 7 min.

### ■ 大阪方面から

名古屋駅下車、名鉄に乗り換えて、東岡崎駅下車(名鉄名古屋一東岡崎間約30分)、南口より徒歩約7分。

### From Osaka

At Meitetsu Nagoya Station, catch the Meitetsu train and get off at Higashi-Okazaki Station (approx. 30 min from Meitetsu Nagoya to Higashi-Okazaki). Turn left at the ticket gate and walk south for approx. 7 min.

### ■ 中部国際空港から

名鉄空港線:中部国際空港駅から名古屋方面に乗り、神宮前で豊橋方面に乗り換えて東岡崎で下車(中部国際空港一東岡崎間約60分)、南口より徒歩7分。

### From Central Japan International Airport (Centrair)

Catch the Meitetsu train at Central Japan International Airport Station and get off at Higashi-Okazaki Station (approx. 60 min from the Central Japan International Airport Station to Higashi-Okazaki). Turn left at the ticket gate and walk south for approx. 7 min.

### ■ 自動車利用の場合

東名高速道路の岡崎ICを下りて国道1号線を名古屋方面に1.5km。市役所南東信号を左折。ICから約10分。

### By Car

Take the Okazaki Exit on the Tomei Highway. Approx. 1.5 km toward Nagoya, turn left at the City office S.E. turnoff (approx. 10 min from Okazaki Exit).





大学共同利用機関法人 自然科学研究機構

# 分子科学研究所

明大寺地区:〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38番地  
山手地区:〒444-8787 愛知県岡崎市明大寺町字東山5-1  
TEL.0564-55-7000 FAX.0564-54-2254  
<https://www.ims.ac.jp/>