









NATIONAL INSTITUTES OF NATURAL SCIENCES  
IMS [Institute for Molecular Science]  
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構  
分子科学研究所



2022

# 分子と対話し、その豊かな知恵を活かす



分子は物質を構成する基本単位であり、物質の示す性質や機能を担う根源です。物質の機能を深く知り、これを高度に利用するためには、分子の構造やそれを構成する原子のレベルで物質を理解すること、さらには、分子群によって構成されるシステムや階層を超えた機能を理解することも不可欠です。分子科学が対象とする学問分野は、分子の持つ化学的な性質と機能を物理的、化学的な手法で体系づけようとする物理学と化学の境界領域であり、具体的な研究対象は個々の分子の電子状態、物性、機能から宇宙・生命科学に関係する物質までの広い範囲にわたります。

分子科学研究所は、設立以来50年近くにわたり、我が国の研究の中核拠点として、実験研究と理論研究の両面から国内外の分子科学分野を主体的に先導する研究を進めるとともに、国内の関連研究分野の研究を支援しています。分子科学研究所は、総合的な共同利用研究所として、今後も関連研究者への研究施設・機器の提供および共同研究の場、研究者の交流や国際学術交流の場を提供すること、さらには、最先端の研究環境の中で若手研究者を育成するというミッション、特に、総合研究大学院大学の物理科学研究科や連携大学院などを通じた大学院教育への寄与など、国際的な研究センターとしての機能を維持し続けることを使命としています。

現在の分子科学研究所は、光分子科学研究領域、物質分子科学研究領域、生命・錯体分子科学研究領域、そして、理論・計算分子科学研究領域の4研究領域と、それらを繋ぐ2つの研究センター、協奏分子システム研究センターおよびメソスコピック計測研究センターによって研究基盤が構成されています。さらに極端紫外光研究施設(UVSOR)、計算科学研究センター、機器センター、装置開発室などの研究施設を擁し、分子の構造と反応そして機能に関する基礎研究を推進しています。自然科学研究機構の生命創成探求センターとも協力して、分子科学研究所は、学術研究の基本を踏まえ、科学分野を先導する研究を推進し、新しい科学領域を拓く挑戦を続けています。

分子科学の世界的なCenter of Excellenceとして、分子科学研究所は世界の人材循環の要として、これからも発展し続けることを目指します。

Molecule is a fundamental unit of materials, origin to form their properties and functions. Molecular functions are in variety of systems, from individual molecules to molecules in the cosmos, in biology systems and in man-made devices. To understand the molecular functions and to highly utilize the systems, Molecular Science now requires bold strides across chemistry, materials and biological sciences.

For nearly 50 years, the Institute for Molecular Science (IMS) has been a leading research center for molecular science. With the support from the community of related research fields, IMS will continue standing as a comprehensive inter-university research institute, providing a place of joint-research, exchanging global researchers and nurturing young scientists.

IMS has six cores to shape its research activities: Department of Theoretical and Computational Molecular Science, Photo-Molecular Science, Materials Molecular Science, and Life and Coordination-Complex Molecular Science, Research Center of Integrative Molecular Systems: an interdisciplinary playground exploring molecular-hierarchy systems, and Center of Mesoscopic Science propels methodological and functional studies of molecular systems. IMS houses open-use research facilities including UVSOR to promote discovery of molecular behaviors. In cooperation with the Exploratory Research Center on Life and Living Systems (ExCELLS) of the National Institutes of Natural Sciences, IMS will continue to take on the challenge of opening up new scientific fields by promoting research that leads the scientific field based on the fundamentals of academic research.


Keeping its foundation on basic research, IMS will never stop being at the forefront of future Molecular Science.

Institute for Molecular Science  
Director General WATANABE, Yoshihito



## 新しい科学領域を拓く中核的研究拠点として —

Core research sites to grow new scientific fields



分子科学における最先端の研究を  
推進しています。 P.6

We promote frontier research in  
the field of Molecular Science.

## 分子科学研究所とは What is IMS?

## 大学共同利用機関として —

Inter-University Research Institute



大型研究施設や測定装置等を国内外の  
大学研究者に広く利用いただいている。 P.41

We offer open access to researchers from Japan and  
abroad to both our facilities and equipment.

## 若手研究者の育成の場として

Fostering of Young Researchers




学生の教育を行い、明日の分子科学を  
担っていく人材を育成しています。 P.46

We commit ourselves to educating students and fostering  
the next generation of Molecular Scientists.



## 組織図 Organization



分子科学研究所の研究職員は研究領域あるいは特別研究部門、社会連携研究部門、研究施設に所属しています。技術推進部に属する技術職員は主に研究施設に配置されています。安全衛生管理や広報・研究者支援・国際化などの活動は、専任職員を配置して、組織化しています。また、同じく大学共同利用機関法人自然科学研究機構に属する基礎生物学研究所、生理学研究所とともに、岡崎共通研究施設を設置しています。平成30年には自然科学研究機構に生命創成探求センターが発足し、岡崎3研究機関がその運営に協力しています。岡崎共通研究施設のうち、計算科学探求センターに属する2研究グループ、及び生命創成探求センターに属する4研究グループは、分子科学研究所に併任しており、分子科学研究所の一員として等しく大学等の研究者の共同研究・共同利用を推進・支援する体制をとっています。


Each research staff of Institute for Molecular Science (IMS) belongs to a department or to a research facility. Majority of the technical staffs are assigned to Research Facilities. Supporting activities such as safety, public affairs, international affairs, and so forth are organized by dedicated staffs. We also have facilities (including Research Center for Computational Science, RCCS) shared with two other institutes (National Institute for Basic Biology, National Institute for Physiological Sciences) in the same campus. In 2018, Exploratory Research Center on Life and Living Systems (ExCELLS) has been launched as a new Research Center belonging to National Institutes of Natural Sciences, with which three Okazaki Research Institutes cooperate. Some research groups in these Centers are appointed also as those of IMS, and promote and support collaborations with researchers in universities or other research organizations as well.

## 人員 Personnel

分子研構成員数:254名(令和4年4月1日現在)

( )にクロスマポイントメント教員を内数で記す。

Total: 254  
(as of April 2022)



※岡崎共通研究施設、生命創成探求センターの分子研兼任を含み、それらの独自予算で雇用された教員・支援員は除く。




## 沿革 History

昭和50年4月	分子科学研究所創設(昭和50年4月22日) 機器センター設置(～平成9年3月) 装置開発室設置	Apr. 1975	Institute for Molecular Science founded (April 22, 1975) Instrument Center established (-March 1997) Equipment Development Center established
昭和51年5月	化学試料室設置(～平成9年3月)	May 1976	Chemical Materials Center established (-March 1997)
昭和52年4月	電子計算機センター設置(～平成12年3月) 極低温センター設置(～平成9年3月)	Apr. 1977	Computer Center established (-March 2000) Low-Temperature Center established (-March 1997)
昭和56年4月	岡崎国立共同研究機構創設(～平成16年3月)	Apr. 1981	Okazaki National Research Institutes (ONRI) founded (-March 2004)
昭和57年4月	極端紫外光実験施設設置	Apr. 1982	UVSOR Facility established
昭和59年4月	錯体化学実験施設設置(～平成19年3月)	Apr. 1984	Coordination Chemistry Laboratories established (-March 2007)
昭和63年10月	総合研究大学院大学開学 数物科学研究科(～平成16年3月、以降は 物理科学研究科) 構造分子科学専攻、機能分子科学専攻	Oct. 1988	Graduate University of Advanced Studies founded School of Mathematical and Physical Science, Department of Structural Molecular Science/Department of Functional Molecular Science established
平成9年4月	分子制御レーザー開発研究センター設置 (～平成29年3月) 分子物質開発研究センター設置(～平成14年3月)	Apr. 1997	Laser Research Center for Molecular Science established (-March 2017) Research Center for Molecular Materials established (-March 2002)
平成12年4月	共通研究施設設置(岡崎統合バイオサイエンス センター(～平成30年3月)、計算科学研究センター)	Apr. 2000	Research facilities (Okazaki Institute for Integrative Bioscience (-March 2018) and Research Center for Computational Science) established
平成14年4月	分子スケールナノサイエンスセンター設置 (～平成25年3月)	Apr. 2002	Research Center for Molecular-scale Nanoscience established (-March 2013)
平成16年4月	大学共同利用機関法人自然科学研究機構創設	Apr. 2004	National Institutes of Natural Sciences founded as one of the four Inter-University Research Institute Corporations
平成19年4月	4研究領域に研究組織再編、機器センター再設置	Apr. 2007	7 Departments reorganized to 4 Departments Instrument Center re-established
平成25年4月	協奏分子システム研究センター設置	Apr. 2013	Research Center of Integrative Molecular Systems established
平成29年4月	メソスコピック計測研究センター設置	Apr. 2017	Center for Mesoscopic Sciences established
平成30年4月	生命創成探求センター(自然科学研究機構)設置	Apr. 2018	Exploratory Research Center on Life and Living Systems established (National Institutes of Natural Sciences)
令和3年4月	分子研技術課、技術推進部に改組	Apr. 2021	Technical and Engineering Department established.



昭和53年 研究棟完成



昭和59年 極端紫外光実験施設披露



現在の分子科学研究所(明大寺キャンパス)



平成15年 完成した山手地区の実験棟

# 「分子」についての知識を深め、 卓越した機能を持つ分子系を創成すること

## 理論・計算分子科学研究領域 Theoretical and Computational Molecular Science

見えない複雑な分子を描き出す Describing invisible and intricate molecules

分子およびその集合体(気相、液相、固相)、さらには生体分子やナノ物質など複雑系や複合系に関する構造および機能を量子力学、統計力学、分子シミュレーションを中心とした理論・計算分子科学の方法により解明します。

## 光分子科学研究領域 Photo-Molecular Science

光を造る、光で観る、光で制御する Create, observe and control with light

分子に光をあてると様々な興味深い性質を現したり、化学反応を起こしたりします。分子科学研究所では、分子の構造や性質を光で調べ、反応や物性を光で制御する研究を行っています。そのために必要となる高度な光源の開発も行っています。

## 物質分子科学研究領域 Materials Molecular Science

物質創成、機能制御、新しい観測手法の開発 Materials development, functional control and developing new measurement techniques

新たな現象や有用な機能の発見を目指して、新規分子の開発やそれらの高次集積化と、電気・光物性、反応性、触媒能などの研究を行っています。

## 生命・錯体分子科学研究領域 Life and Coordination-Complex Molecular Science

生体機能の実現と無駄のない化学反応へ Realizing vital functions and efficient chemical reactions

分子や分子が集合したシステムは、光・電気・磁気に応答する性質や、物質やエネルギーの形を変える機能を持っています。本研究領域では、今までにない応答特性、物質・エネルギー変換特性を持つ分子や分子システムの設計、開発を行っています。さらに、最先端の計測手法を開発し、分子や分子システムの特性発現・機能発現のメカニズムを理解する研究を推進しています。

## 協奏分子システム研究センター Research Center of Integrative Molecular Systems

分子システムの解析と創成 Analysis & Design of Sophisticated Molecular Systems

分子がシステムとして組織化され、卓越した機能を発現する仕組みを研究しています。1つの分子と分子システムを結ぶ階層構造を理解し、その原理に基づいた分子システムのデザインに取り組んでいます。

## メゾスコピック計測研究センター Center for Mesoscopic Sciences

新しい計測で分子システムのありのままの姿を解析 Innovative measurements to approach the nature of molecular systems

分子が集まって機能するシステムでは、ミクロとマクロを繋ぐ階層間の情報・物質のやりとりがその特性発現に役割を担っていると考えられます。その現場をできる限りありのままの姿で捉え、新しい分子の能力を引き出すための極限的計測法の研究を行います。

## 特別研究部門 Division of Advanced Molecular Science

分子科学分野のトップレベル研究の支援と、研究者層の厚みを増強するための支援を行います。

## 社会連携研究部門 Division of Research Innovation and Collaboration

分子研と企業などからの資金によって運営するオープンイノベーション拠点とし産官学の共同研究を実施します。



斎藤 真司(教授)  
SAITO, Shinji

1988年慶應義塾大学理工学部卒、1990年京都大学大学院工学研究科修士課程修了、1995年博士(理学)(総研大)。1990年分子科学研究所技官、1994年名古屋大学理学部助手、1998年助教授を経て2005年10月より現職。1999年基礎生物学研究所、2000年岡崎統合バイオサイエンスセンター、2005年東京大学客員助教授、2006年から2010年東京大学、2008年国立情報学研究所、2020年から2024年Indian Institute of Technology Kanpur客員教授。

TEL: 0564-55-7300  
mail: shinji@ims.ac.jp

1988 B.S. Keio University  
1990 M.Eng.KyotoUniversity  
1995 Ph.D. The Graduate University for Advanced Studies  
1990 Technical Associate, Institute for Molecular Science  
1994 Research Associate, Nagoya University  
1998 Associate Professor, Nagoya University  
2005 Professor, Institute for Molecular Science  
2006 Professor, The Graduate University for Advanced Studies

〈Keywords〉


Fluctuation,  
Reaction,  
Function,  
Glass Transition

■理論分子科学第一研究部門 Theoretical Molecular Science I

## 凝縮系における反応、機能、物性を生み出す ダイナミクスの理論研究

Theoretical Studies on Dynamics behind Reactions, Functions, and Glass Transitions in Many-Body Molecular Systems

水の特異的な熱力学的性質やタンパク質の機能などはどのように生まれるのでしょうか?溶液や生体分子などの系は凝縮系と呼ばれます。このような凝縮系には、フェムト秒( $10^{-15}$ 秒)という非常に速い時間スケールの分子振動から、マイクロ秒( $10^{-6}$ 秒)からミリ秒( $10^{-3}$ 秒)そしてさらに遅い時間スケールの分子の集団的な運動やタンパク質の構造変化が存在します。これらの運動は広い時間スケールにわたっているだけでなく、異なる空間スケールをもち複雑に絡み合っています。さらに、温度や圧力により運動の様相も大きく変化します。このような複雑な運動により、分子集合体としての構造は絶えず変化しています。また、そのような揺らぎの中で、様々な化学反応が進行し、それらの結果として、物質の様々な物性やタンパク質の機能につながります。また、これまで、非常に多くの分子の集団的な平均として反応が調べられていました。しかし、実験の進展により、個々の分子の構造変化や反応を追跡することも可能になってきました。その結果、集団平均された結果には見られない複雑な様相も明らかになってきました。私達は統計力学や量子力学に基づく独自の理論計算・解析手法の開発とシミュレーションの活用により分子運動を解析し、物質の性質やタンパク質の機能がどのように生み出されるのか、また、化学反応がどのように進行するのかなどを理論・計算科学的に研究しています。




Scheme of enzymatic reaction. Reactions rapidly take place through 'conformational excited states' on a two-dimensional surface expressed by fast and slow variables. (Mori and Saito, *J. Phys. Chem. Lett.* **10**, 474-480 (2019).)

参考文献

- 1) T. Yagasaki and S. Saito, "Fluctuations and Relaxation Dynamics of Liquid Water Revealed by Linear and Nonlinear Spectroscopy," *Annu. Rev. Phys. Chem.* **64**, 55-75 (2013) (invited).
- 2) K. Kim and S. Saito, "Multiple Length and Time Scales of Dynamic Heterogeneities in Model Glass-Forming Liquids: A Systematic Analysis of Multi-Point and Multi-Time Correlations," *J. Chem. Phys.* (Special Topic: Glass Transition) **138**, 12A506 (13 pages) (2013) (Invited).
- 3) T. Mori and S. Saito, "Conformational excitation and non-equilibrium transition facilitate enzymatic reactions:
- Application to Pin1 peptidyl-prolyl isomerase," *J. Phys. Chem. Lett.* **10**, 474-480 (2019).
- 4) S. Saito, M. Higashi, and G. R. Fleming, "Site-dependent fluctuations optimize electronic energy transfer in the Fenna-Matthews-Olson protein," *J. Phys. Chem. B* **123**, 9762-9772 (2019).
- 5) S. Saito and B. Bagchi, "Thermodynamic picture of vitrification of water through complex specific heat and entropy: A journey through "No Man's Land"," *J. Chem. Phys.* **150**, 054502 (14 pages) (2019).

Many-body molecular systems, such as liquids and biomolecules, show complicated dynamics over a wide range of spatiotemporal scales and yield various thermodynamic properties. For example, in supercooled liquids, spatiotemporal non-uniform motions are found. The motions known as dynamic heterogeneity are now considered a crucial clue to understanding supercooled liquids and glass transition. The heterogeneous dynamics affect reaction dynamics. Furthermore, recent experimental and theoretical studies have demonstrated that reactions and conformational dynamics at the single-molecule level are described by non-Poisson processes. In addition to these examples, it is known that conformational changes with proper time scales are essential to protein functions. Thus, understanding heterogeneous dynamics in the many-body molecular systems is essential to elucidate thermodynamics and dynamic properties, reactions, and functions. So far, we have studied the complicated dynamics in these systems using multidimensional spectroscopy and multi-time correlation functions. As the development of these studies, we theoretically and computationally investigate how reactions proceed and biological functions are generated in fluctuating environments and how conformational dynamics yield interesting thermodynamic properties and change toward glass transition.



Schematic figure of low- (blue) and high- (red) density local structures in supercooled water. Local density fluctuations generate thermodynamic and dynamic anomalies of water. (Saito et al., *J. Chem. Phys.* **149**, 124504 (8 pages) (2018).)



## ■理論分子科学第一研究部門 Theoretical Molecular Science I

# 量子多体効果が織りなす新奇固体物性の理論研究

## Theoretical Studies on Novel Physical Properties Arising from Many-Body Interaction

南谷 英美(准教授)  
MINAMITANI, Emi

2005年大阪大学工学部応用  
自然学科卒業、2010年大阪  
大学大学院工学研究科博  
士課程修了、博士(工学)、  
2010年日本学術振興会特別  
研究員(PD)、2011年理化  
研究所基礎科学特別研究  
員、2013年東京大学大学院  
工学系研究科助教、2015年  
東京大学大学院工学系研究  
科講師を経て、2019年4月  
より現職。2017年科学技術振  
興機構さきがけ研究者兼務。

TEL: 0564-55-7301  
mail: eminamitani@ims.ac.jp

2005 B.S. Osaka University  
2010 Ph.D. Osaka University  
2010 Postdoctoral Fellow,  
Osaka University  
2011 Special Postdoctoral  
Researcher, RIKEN  
2013 Assistant Professor,  
The University of Tokyo  
2015 Lecturer, The University  
of Tokyo  
2019 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science  
Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

### Keywords

Quantum Many-Body  
Interaction,  
Density Functional Theory,  
Quantum Field Theory,  
Electron-Phonon  
Interaction,  
Magnetism

固体の様々な驚くべき物性は、電子や固体振動の量子であるフォノンといった様々な素励起間の量子的な相互作用によって生じています。私達のグループでは、電子エレクトロニクス・スピントロニクスといった応用にも結びつく、ナノスケールでの磁性とエネルギー散逸の学理解明を目指して、場の量子論や第一原理計算を組み合わせた研究手法の開発や、実験グループと密接に連携した共同研究を進めています。


ナノスケールの磁性に関しては、近藤効果やスピン軌道相互作用に着目しています。近藤効果は、局在スピンと伝導電子が相互作用し、近藤1重項と呼ばれる特徴的な量子多体状態を形成する現象です。スピン軌道相互作用は、スピンを持った電子が異方的な軌道運動をすることで生じる相対論的な効果で、スピンが特定の方向を向きやすくなります。私達はとくに、表面上のナノ構造や吸着分子における新奇現象の可能性を探っています。

エネルギー散逸については、特に電子フォノン相互作用に注目した研究を進めています。格子振動の量子、フォノンと電子の相互作用は、電気抵抗、熱電効果から超伝導に至るまで固体物理の随所にあらわれる最も基本的な相互作用の一つですが、相互作用強度の見積もりは簡単ではありません。私達のグループでは密度汎関数論に基づく第一原理計算を応用した電子フォノン相互作用の精密計算を駆使して、各種表面分光法に現れる電子フォノン相互作用のシグナルを捉えることや、電子フォノン相互作用に由来する熱物性への解明に取り組んでいます。

Quantum many-body interaction is a source of novel physical properties in the condensed matters. In our group, we develop theoretical methods by combining quantum field theory and density functional theory, and carry out collaborative research with experimental groups. As specific targets, we focus on magnetism in nanostructure and energy dissipation.

For magnetism in nanostructure, we are interested in the Kondo effect and spin-orbit interaction. The Kondo effect arises from the interaction between the localized spin and conduction electrons, which forms a characteristic many-body state so called the Kondo singlet state. The spin-orbit interaction originating from relativistic effect constrains the direction of magnetic moment to specific direction. We investigate the possibility of novel physical phenomena induced by these interactions in the nanostructure and molecules on surfaces.

For energy dissipation, we focus on the effect of electron-phonon interaction. The electron-phonon interaction is one of the most fundamental interactions in the condensed matter physics, and the quantitative evaluation in realistic materials is highly demanding. We adopt the ab-initio calculation to analyze the signal of electron-phonon coupling in surface spectroscopy and thermal properties in various kind of solids.



Schematic image of the theoretical method developed in our group

### 参考文献

- 1) Emi Minamitani, Noriyuki Tsukahara, Daisuke Matsunaka, Yousoo Kim, Noriaki Takagi, Maki Kawai, "Symmetry-driven novel Kondo effect in a molecule", *Phys. Rev. Lett.*, **109** (2012) 086602.
- 2) Emi Minamitani, Ryuichi Arafune, Noriyuki Tsukahara, Yoshitaka Ohda, Satoshi Watanabe, Maki Kawai, Hiromu Ueba, Noriaki Takagi, "Surface phonon excitation on clean metal surfaces in scanning tunneling microscopy", *Phys. Rev. B*, **93**, 085411 (2016).
- 3) E. Minamitani, N. Takagi, S. Watanabe, "Model Hamiltonian approach to the magnetic anisotropy of iron phthalocyanine at solid surfaces", *Phys. Rev. B*, **94**, 205402 (2016).
- 4) R. Hiraoka, E. Minamitani, R. Arafune, N. Tsukahara, S. Watanabe, M. Kawai, and N. Takagi, "Single-Molecule Quantum Dot as a Kondo Simulator", *Nat. Commun.*, **8** 16012 (2017).
- 5) Emi Minamitani, Ryuichi Arafune, Thomas Frederiksen, Tetsuya Suzuki, Syed Mohammad Fakruddin Shahed, Tomohiro Kobayashi, Norifumi Endo, Hirokazu Fukidome, Satoshi Watanabe, Tadahiro Komeda, "Atomic-scale characterization of the interfacial phonon in graphene/SiC" *Phys. Rev. B*, **96**, 155431 (2017).



## ■理論分子科学第二研究部門 Theoretical Molecular Science II

# 凝縮相分子系における量子動力学現象の理論

Theoretical Studies of Quantum Dynamics in  
Condensed Phase Molecular Systems

## 石崎 章仁(教授)

ISHIZAKI, Akihito

2008年京都大学大学院理学  
研究科博士課程修了、博士(理  
学)。2008年カリフォルニア大  
学バークレー校化学部化学科  
にて日本学術振興会海外特  
別研究員、2010年ローレンス・  
バークレー国立研究所物理  
生物科学部門博士研究員、  
2012年3月分子科学研究所特  
任准教授を経て、2016年4月  
より現職。2016年名古屋大学  
大学院理学研究科客員教授  
兼任。

TEL: 0564-55-7310

FAX: 0564-53-4660

mail: ishizaki@ims.ac.jp

2008 D.Sc. Kyoto University

2006 JSPS Research Fellow,  
Kyoto University

2008 JSPS Postdoctoral  
Fellow for Research  
Abroad, University of  
California, Berkeley

2010 Postdoctoral Fellow,  
Lawrence Berkeley  
National Laboratory

2012 Research Associate  
Professor, Institute for  
Molecular Science

2013 Fellow 2012–2013,  
Wissenschaftskolleg  
zu Berlin

2016 Professor, Institute for  
Molecular Science

## 〈Keywords〉

Quantum Dynamics,  
Energy/Charge Transfer,  
Photosynthetic  
Light Harvesting

我々が量子力学現象を議論するとき、実のところ、いかなる量子系も純粋な孤立系とは見なすことはできません。常に何らかの外界と接触することで、ときに量子性が破壊され、ときには量子性が頑健に保持される——複雑な分子系においては量子性の維持と崩壊のバランスが化学ダイナミクスの様態に大きな影響を及ぼし得るため「多自由度ゆえに生じる揺らぎや摩擦に曝されながら量子効果はどのような影響を受けるのか」を理解することは、重要な課題となります。

そのような量子散逸現象の顕著な例として、私たちが最近10年ほど取り組んでいる光合成初期過程における電子エネルギー移動や電荷分離過程があります。光合成は光という物理エネルギーを細胞が利用可能な化学エネルギーに変換する分子過程であり、糖の生成を通して地球上の全ての生命活動を維持しています。近年は再生可能エネルギーの観点からも注目され、エネルギー資源問題に応える緊急課題として光合成機構の仕組みを取り入れた分子素子の研究開発が進められています。太陽光の強度が弱い場合には、捕獲された光エネルギーは色素分子の電子励起エネルギーとなりほぼ100%の量子収率で反応中心タンパク質へ輸送され一連の電子移動反応を駆動しますが、広大な物理空間にありながら、また絶え間ない分子運動と揺らぎの中にありながら電子励起エネルギーはどのようにして反応中心へ迷子にもならず一意的に辿り着きエネルギー変換に用いられるのでしょうか？

私たちは、超高速レーザー一分光などの実験研究者と一緒に連携しながら、量子散逸系動力学理論・非線形光学応答理論を駆使することで光合成初期過程におけるエネルギー輸送やエネルギー変換過程などの凝縮相分子系における量子力学現象の解明に取り組んでいます。


## 参考文献

- 1) A. Ishizaki & G. R. Fleming, "Unified treatment of quantum coherent and incoherent hopping dynamics in electronic energy transfer," *J. Chem. Phys.* **130**, 234111 (2009); (10 pages).
- 2) A. Ishizaki & G. R. Fleming, "Theoretical examination of quantum coherence in a photosynthetic system at physiological temperature," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **106**, 17255-17260 (2009).
- 3) A. Ishizaki & G. R. Fleming, "Quantum coherence in photosynthetic light harvesting," *Annu. Rev. Condens. Matter Phys.* **3**, 333-361 (2012).
- 4) G. S. Schlau-Cohen, A. Ishizaki, Tessa R. Calhoun, Naomi S. Ginsberg, Matteo Ballottari, Roberto Bassi & Graham R. Fleming, "Elucidations of timescales and origins of quantum electronic coherence in LHCII," *Nature Chemistry* **4**, 389-395 (2012).
- 5) G. D. Scholes et al. "Using coherence to enhance function in chemical and biophysical systems," *Nature* **543**, 647-656 (2017).

Essentially, any quantum systems can never be regarded as "isolated systems." Quantum systems are always in contact with "the outside world" and hence, their quantum natures are sometimes sustained and sometimes destroyed. In condensed phase molecular systems, especially, quantum systems are affected by the huge amount of dynamic degrees of freedom such as solvent molecules, amino acid residues in proteins, and so on. Balance between robustness and fragility of the quantum natures may dramatically alter behaviors of chemical dynamics.

One of the notable examples of such quantum dynamical phenomena is the energy transport and energy conversion processes in photosynthetic systems. Photosynthesis provides the energy source for essentially all living things on Earth, and its functionality has been one of the most fascinating mysteries of life. The conversion starts with the absorption of a photon of sunlight by one of the light-harvesting pigments, followed by transfer of electronic excitation energy to the reaction center, where charge separation is initiated. At low light intensities, surprisingly, the quantum efficiency of the transfer is near unity. A longstanding question in photosynthesis has been the following: How does light harvesting deliver such high efficiency in the presence of disordered and fluctuating dissipative environments? Why does not energy get lost? At high light intensities, on the other hand, the reaction center is protected by regulation mechanisms that lead to quenching of excess excitation energy in light harvesting proteins. The precise mechanisms of these initial steps of photosynthesis are not yet fully elucidated from the standpoint of molecular science.

Our group is investigating quantum dynamical phenomena in condensed phase molecular systems such as energy transport and conversion processes in photosynthetic systems through the use of quantum dissipative theories and nonlinear optical response theories in close collaboration with experimental researchers of optical spectroscopy.



The crystal structure of LHCII isolated from spinach, which is the most abundant photosynthetic antenna complex in plants containing over 50% of the world's chlorophyll molecules.



## 高度な電子状態理論に基づく複雑系の基礎化学 Fundamental Chemistry of Complex Systems using Advanced Electronic Structure Theories

### 江原 正博(教授)

EHARA, Masahiro

1988年京都大学卒業、1993

年同大学院博士課程修了、  
博士(工学)。基礎化学研究所

博士研究員、ハイデルベルグ  
大学博士研究員、1995年京都  
大学助手、2002年同助教授を  
経て、2008年6月より現職。

TEL: 0564-55-7461

FAX: 0564-55-7025

mail: ehara@ims.ac.jp

1988 B.S. at Kyoto Univ.  
Faculty of Engineering

1993 Ph.D. at Kyoto Univ.  
Graduate School of  
Engineering

1994 Japan Society for the  
Promotion of Science (JSPS) Postdoctoral  
Fellow

Visiting Researcher at  
Heidelberg Univ.

1995 Assistant Professor at  
Kyoto Univ. Graduate  
School of Engineering

2002 Associate Professor at  
Kyoto Univ. Graduate  
School of Engineering

2008 Professor, Institute for  
Molecular Science

2012 Professor at Element  
Strategy for Catalysis  
and Battery (ESICB),  
Kyoto Univ. (additional  
post)

### 〈Keywords〉

Quantum Chemistry,  
Photophysical Chemistry,  
Heterogeneous Catalysis

自然界の様々な化学事象は分子の電子状態に基づいて発現しています。私たちは、複雑な化学事象の原理を明らかにし、化学概念を構築することを目的として、高度な電子状態理論を開発し、光化学や触媒化学の基礎研究を行っています。現在の主な研究テーマは以下のとおりです。

#### (1) 複雑系の高精度電子状態理論の開発

分子の電子状態や化学反応には複雑な電子構造をもつ状態が存在します。これらの複雑系の電子状態に適用できる高度な量子状態理論や計算アルゴリズムを開発し、基礎化学から応用化学に亘る広い分野の化学事象を研究しています。例えば、励起状態や化学反応の溶媒効果を記述するPCM SAC-Cl法、準安定な共鳴状態を計算するCAP/SAC-Cl法やACCC SAC-Cl法、複雑な電子状態を精密に記述するSAC-Cl general-R法、分子の電子状態や化学反応の圧力効果を研究するXP-PCM法を開発し、応用研究を実施しています。

#### (2) 不均一系触媒の理論研究

金属酸化物や凝縮相高分子に担持された金属ナノ粒子は、高効率な触媒反応を実現します。私たちは、これらの複雑・複合系である金属ナノ粒子の触媒活性を量子化学計算を用いて、担体効果や合金効果に注目して研究しています。最近の研究では、凝縮相金・パラジウム合金微粒子の低温C-Cl活性化、金クラスターの様々な触媒反応、アルミナ担持銀クラスターの水素活性化などのメカニズムを理論的に明らかにしました。実験と協働し、触媒・電池の元素戦略拠点のプロジェクトにおいて、高度な触媒活性を持つ不均一系触媒の研究開発に挑戦しています。

#### 参考文献

- 1) M. Ehara, T. Sommerfeld, "CAP/SAC-Cl Method for Calculating Resonance States of Metastable Anions," *Chem. Phys. Lett.* **537**, 107-112 (2012).
- 2) R. Cammi, R. Fukuda, M. Ehara, H. Nakatsuji, "SAC-Cl Method in the Polarizable Continuum Model-Theory for Solvent Effect on Electronic Excitation of Molecules in Solution," *J. Chem. Phys.* **133**, 024104-1-24 (2010).
- 3) R.N. Dhital, C. Kamonsatikul, E. Somsook, K. Bobuatong, M. Ehara, S. Karanjit, H. Sakurai, "Low-Temperature Carbon-Chlorine Bond Activation by Bimetallic Gold/Palladium Alloy Nanoclusters: An Application to Ullmann Coupling," *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 20250-20253 (2012).
- 4) P. Hirunsit, K. Shimizu, R. Fukuda, S. Namuangruk, Y. Morikawa, M. Ehara, "Cooperative H<sub>2</sub> Activation at Ag Cluster/θ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(110) Dual Perimeter Sites: A Density Functional Theory Study," *J. Phys. Chem. C.* **118**, 7996-8006 (2014).

Various chemical phenomena in nature appear originating in molecular electronic states. We develop the advanced electronic structure theories to investigate the photochemistry and catalysis. Our current research subjects are as follows.

#### (1) Advanced electronic structure theories for large complex systems

Complex electronic structure exists in molecular electronic states and chemical reactions. We develop the advanced electronic structure theories and their efficient computational algorithm applicable to large complex systems and investigate various phenomena in fundamental and applied chemistry; for example, PCM SAC-Cl for the solvent effects on excited states and chemical reactions, CAP/SAC-Cl and ACCC SAC-Cl for metastable resonance states, SAC-Cl general-R for complex electronic states, and XP-PCM for high pressure effects on electronic states and reactions.

#### (2) Heterogeneous catalysts

Metal nanoclusters (NC) supported by metal oxides or colloidal phase polymers achieve highly efficient catalytic reactions. We study the catalytic activity of these complex systems in view of metal support interaction and alloy effects using quantum chemical calculations. For example, we elucidated the mechanism of the low-temperature C-Cl activation on Au-Pd NC:PVP, various catalytic reactions on Au NC:PVP, and the H<sub>2</sub> activation of Ag NC/alumina. We challenge the development of advanced heterogeneous catalysts in the project of Elements Strategy Initiative for Catalysts and Batteries (ESICB) collaborating with experimental groups.




Fig. 1 Electronic resonance states of DNA/RNA nucleobases




Fig. 2 Solvation dynamics of Au/Pd alloy nanocluster



■計算分子科学研究部門 Computational Molecular Science

## 生体分子動力学シミュレーション： タンパク質の折りたたみ、変性、凝集、アミロイド線維

Biomolecular Dynamics Simulation:  
Protein Folding, Denaturation, Aggregation, and Amyloid Fibril

奥村 久士(准教授)  
OKUMURA, Hisashi

1998年慶應義塾大学理工学部卒業、2002年同大学大学院理工学研究科博士課程修了、博士(理学)。東京大学工学系研究科日本学術振興会特別研究員(PD)、分子科学研究所助手、名古屋大学大学院理学研究科COE特任講師、ラトガース大学研究助教授を経て2009年5月より現職。  
TEL: 0564-59-5213  
FAX: 0564-55-7025  
mail: hokumura@ims.ac.jp

1998 B.S. Keio University  
2002 Ph.D. Keio University  
Postdoctoral Fellow, The University of Tokyo  
Research Associate, Institute for Molecular Science  
2004 Research Associate, The Graduate University for Advanced Studies  
2006 Research Lecturer, Nagoya University  
2008 Research Assistant, Rutgers University  
2009 Assistant Research Professor, Rutgers University  
Associate Professor, Institute for Molecular Science  
Associate Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2018 Associate Professor, Exploratory Research Center on Life and Living Systems

### 〈Keywords〉

Molecular Dynamics Simulation,  
Protein,  
Amyloid

タンパク質は、多数のアミノ酸がペプチド結合によりつながったもので、そのアミノ酸の並び方(一次元配列)はタンパク質の立体構造を決める重要な要素となります。アミノ酸の一次元配列情報をもとにタンパク質の立体構造を予測する問題をタンパク質の折りたたみ問題といいます。この問題が難しい理由は、通常のシミュレーション手法では多くのタンパク質構造を探索するために非常に長い時間シミュレーションを行わなければならぬからです。

この問題を解決するためこれまでに有力な手法がいくつか提案されてきました。そのうちの1つであるレプリカ交換法では系のコピー(レプリカ)を複数用意し、シミュレーションの途中で2つのレプリカ間で温度を交換し、各レプリカの温度を上下させることで効率的な構造空間のサンプリングを実現します。最近、我々はより強力なレプリカ置換法を考案しました。この方法を使ってCペプチドの折りたたみシミュレーションを行い、このペプチドが $\alpha$ ヘリックス構造を形成し折りたたむ過程を図1のように明らかにしました。

さらに医療への応用にも関心を持っています。タンパク質が間違って折りたたまれることによってひき起こされるフォールディング病という病気があります。アルツハイマー病やハンチントン病がその例です。これらの病気はタンパク質が間違って折りたたまれ凝集し、アミロイドという針状の物質を作ってしまうことが原因ですが、アミロイドが形成されるしくみはまだよくわかっていません。レプリカ置換分子動力学法を使ってアミロイドの形成メカニズムの解明に取り組んでいます。またアミロイド線維は超音波を使って破壊することができるのですが、その過程を非平衡分子動力学シミュレーションにより初めて解明しました(図2)。




Fig. 1 (a) Free-energy landscape and (b) typical structures at local-minimum free-energy states of C-peptide.

Biomolecules such as proteins and peptides have complicated free-energy landscape with many local minima. The conventional canonical-ensemble molecular dynamics (MD) simulations tend to get trapped in a few of the local-minimum states. To overcome these difficulties, we have proposed new generalized-ensemble algorithms, such as replica-permutation method. We apply these methods to proteins and peptides and try to predict the native structures of proteins as in Figure 1.

We are also interested in amyloid fibrils, which are insoluble aggregates of misfolded fibrous proteins and associated with more than 20 human neurodegenerative diseases (Figure 2). For example, Alzheimer's disease is related to amyloid- $\beta$  (A $\beta$ ) peptides. To overcome these diseases, it is essential to understand amyloid genesis and disruption. We perform such MD simulations of amyloid fibrils.

### 参考文献

- 1) H. Okumura and S. G. Itoh, "Structural and fluctuational difference between two ends of A $\beta$  amyloid fibril: MD simulation predicts only one end has open conformations", *Sci. Rep.* **6**, 38422 (9 pages) (2016).
- 2) S. G. Itoh and H. Okumura, "Oligomer formation of amyloid- $\beta$ (29-42) from its monomers using the Hamiltonian replica-permutation molecular dynamics simulation", *J. Phys. Chem. B* **120**, 6555-6561 (2016).
- 3) H. Okumura and S. G. Itoh, "Amyloid fibril disruption by ultrasonic cavitation: Nonequilibrium molecular dynamics simulations", *J. Am. Chem. Soc.* **136**, 10549-10552 (2014).
- 4) S. G. Itoh and H. Okumura, "Replica-permutation method with the Suwa-Todo algorithm beyond the replica-exchange method", *J. Chem. Theory Comput.* **9**, 570-581 (2013).




Fig. 2 Disruption process of an amyloid fibril of A $\beta$  peptides by supersonic wave. The amyloid fibril is disrupted when a bubble collapses.



■計算分子科学研究部門 Computational Molecular Science

## 生体分子マシンの機能発現ダイナミクスの解明とその制御

Elucidation and Control of Dynamics of Biomolecular Machines in Function

岡崎 主一(准教授)  
OKAZAKI, Kei-ichi

2004年京都大学理学部卒、  
2009年神戸大学大学院自然  
科学研究科博士課程修了、博  
士(理学)。日本学術振興会特  
別研究員(DC2、PD)、同海外特  
別研究員、米国国立衛生研究  
所博士研究員、マックスプラン  
ク生物物理学研究所博士研究  
員を経て、2016年6月より分  
子科学研究所特任准教授。  
2020年12月より、計算科  
学研究センター准教授。

TEL: 0564-55-7468  
mail: keokazaki@ims.ac.jp

2004 B.S. Kyoto University  
2006 M.S. Kobe University

2009 Ph.D. Kobe University  
2007 JSPS Research  
Fellow (DC2)

2009 JSPS Postdoctoral  
Fellow (PD)  
Postdoctoral Fellow,  
Waseda University

2010 Part-time Lecturer,  
Waseda University  
2011 Postdoctoral Fellow,  
National Institutes of  
Health, USA

2012 JSPS Postdoctoral  
Fellow for Research  
Abroad

2013 Postdoctoral Fellow,  
Max Planck Institute of  
Biophysics, Germany  
2016 Research Associate  
Professor, Institute for  
Molecular Science

2020 Associate Professor,  
Research Center for  
Computational Science

### Keywords

Biomolecular Machines,  
Theoretical Biophysics,  
Molecular Simulations

細胞で働く分子モーターやトランスポーターなど生体分子マシンは、機能する際に構造を変化させることができます。例えば、ミトコンドリアでATPを合成するATP合成酵素は、化学エネルギーを用いて回転する分子モーターです。細胞膜を超えて基質分子を輸送するトランスポーターは、膜に対して内側に開いた構造と外側に開いた構造との間で構造変化することで、基質輸送を行っています。このように自然が作り上げた精巧かつダイナミックなナノマシンが働く仕組みを原子・分子レベルで解明し、その知見に基づいた機能制御を目指しています。

私たちは、生体分子マシンが機能する瞬間の動き「機能発現ダイナミクス」を、原子・分子レベルでコンピュータ上に再現して「見る」ことで、その仕組みを理解したいと思っています。しかしながら、これは容易なことではありません。なぜなら、生体分子マシンは、巨大な分子である上に、機能する時間スケールはミリ秒以上と(分子スケールにしては)遅いからです。数十万原子以上からなる巨大な系のミリ秒時間スケールの動きをシミュレーションするのは通常の手法では困難です。そこで、動く瞬間を切り出してシミュレーションする手法や、複数原子をまとめて粗視化する手法などを用いて、機能する瞬間の動きを捉えようとしています。

私たちはこれまで、細胞内の主なエネルギー供給源であるATP合成酵素<sup>1)</sup>や、細胞内のイオン濃度を調節するトランスポーターNa<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>交換輸送体<sup>2),3)</sup>を取り組んできました。Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>交換輸送体においては、イオン輸送が起こる瞬間の動きをシミュレーションで捉えて、イオン輸送を制御している重要な相互作用を同定しました。この相互作用を実験的に調節することで、イオン輸送速度を2倍以上速くすることに成功しました。このように、シミュレーションで解明した生体分子マシンの仕組みに基づいた機能制御に挑戦していきます。

### 参考文献

1) K. Okazaki & G. Hummer, "Elasticity, friction, and pathway of gamma-subunit rotation in F<sub>0</sub>F<sub>1</sub>-ATP synthase." *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **112**:10720-10725 (2015).


2) K. Okazaki, D. Wöhler, J. Warnau, H. Jung, Ö. Yıldız, W. Kühlbrandt and G. Hummer "Mechanism of the electroneutral sodium/proton antiporter PaNhaP from transition-path shooting", *Nature Communications* **10**, 1742 (10 pages) (2019).

3) 岡崎圭一 “分子シミュレーションによるNa<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>交換輸送体のメカニズム解明と輸送速度を上げる変更” *生物物理* **60**:102-104 (2020).

Biomolecular machines, such as molecular motors and transporters working in the cell, are known to change their structure when they function. For example, ATP synthase, which synthesizes ATP in mitochondria, is a molecular motor that uses chemical energy to rotate. Transporters, which transport substrate molecules across the cell membrane, perform substrate transport by changing their structure between an inwardly and outwardly open structure relative to the membrane. Our goal is to elucidate the mechanism of these elaborate and dynamic nanomachines created by nature at the atomic and molecular level, and to control their functions based on our findings.

We would like to understand the mechanism of biomolecular machines by “seeing” the motion of biomolecular machines at the moment they function, on a computer at the atomic and molecular level. However, this is not an easy task, because biomolecular machines are huge molecules, and their functioning time scale is slow (for a molecular scale) at milliseconds or more. It is difficult to simulate the millisecond time scale motion of a huge system consisting of hundreds of thousands of atoms or more using conventional methods. Therefore, we are trying to capture the motion at the moment of function by using methods such as an importance sampling technique, or coarse-graining multiple atoms together.

We have been working on ATP synthase, which is the main energy source in the cell<sup>1)</sup>, and Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup> antiporter<sup>2),3)</sup> which regulates ion concentrations in the cell. For the Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup> antiporter, we captured the moment of ion transport by simulations and identified the key interactions that regulate ion transport. By experimentally modulating this interaction, we succeeded in increasing the ion transport rate more than twofold. In this way, we will challenge functional control based on the mechanism of the biomolecular machine elucidated by simulation.



Control of the transporter function based on mechanism elucidated by simulation.



## ■光分子科学第二研究部門 Photo-Molecular Science II

# アト秒精度の超高速量子シミュレータ開発と 量子コンピュータへの応用

Development of an Ultrafast Quantum Simulator with Attosecond Precision and Its Applications to Quantum Computing

## 大森 賢治(教授)

OHMORI, Kenji

1987年東京大学卒業、1992年同  
大学院工学系研究科博士課程修了、博士(工学)。東北大学助手・助教  
授を経て2003年9月より現職。  
2015年～文部科学省科学技術・学  
術審議会専門委員 量子科学技術  
委員会副主任、2019年内閣官房イ  
ノベーション推進室イノベーション  
政策強化推進のための有識者会  
議委員。  
1998年 光科学技術研究振興財  
団研究表彰、2007年 日本学士院  
学術奨励賞、2007年 日本学術振  
興会賞、2009年 米国物理学会  
フェロー表彰、2012年 独フンボル  
ト賞、2017年 松尾学賞賞、2018  
年 文部科学大臣表彰、2021年  
紫綬褒章(量子物理学研究功績)。  
TEL: 0564-55-7361  
FAX: 0564-54-2254  
mail: ohmori@ims.ac.jp

1987 Graduated from  
Faculty of Engineering,  
The University of Tokyo

1992 Ph.D. The University of  
Tokyo

Research Associate,  
Tohoku University

2001 Associate Professor,  
Tohoku University

2003- Professor, Institute for  
Molecular Science

1998 Award by Research  
Foundation for  
Opto-Science and  
Technology

2007 JSPS Prize

2007 Japan Academy Medal

2009 Fellow of the American  
Physical Society

2012 Humboldt Research  
Award

2017 Hiroshi Takuma  
Memorial Prize of  
Matsuo Foundation

2018 Commendation for  
Science and  
Technology by the  
Minister of Education,  
Culture, Sports,  
Science and  
Technology of Japan

2021 National Medal with  
Purple Ribbon

〈Keywords〉  
Attosecond,  
Quantum Simulator,  
Quantum Computer

「物質は見方によって粒子になつたり波になつたりする。」  
量子の世界の本質はここにあります。量子力学が生まれて100年、コンピュータやCDプレーヤー等、量子力学の応用製品はなくてはならない存在になりました。しかし、人類はまだ量子の世界をよく理解しておらず、その応用の余地も膨大に残されています。私たちは、量子の世界をより良く理解するために、物質の波を光で完全に制御するというテーマに挑戦しています<sup>1-9</sup>。

私たちは、電子や原子の波にアト秒(アト=10<sup>-18</sup>)レベルで制御されたレーザー光の情報を転写することで、それらをピコメートル(ピコ=10<sup>-12</sup>)・フェムト秒(フェムト=10<sup>-15</sup>)レベルの時空間精度で加工し可視化することに成功しました<sup>1,2</sup>。さらに、この技術を用いて、世界最速レベルのスパコンの1000倍以上の速さで計算する分子コンピュータを開発しました<sup>3,4</sup>。つい最近では、世界最速スパコンでも計算不可能な多数の電子の集団運動をアト秒レベルでシミュレートできる全く新しい超高速量子シミュレータの開発に成功しています<sup>6-9</sup>。これらの成果は、朝日新聞や中日新聞を始めとする多数の新聞各紙で取り上げられた他、英米の科学雑誌Nature、Science、Nature Physics、Nature Photonics、米国物理学会Physics、英国物理学会PhysicsWorld、ドイツ物理学会Pro-Physik、あるいはScienceDaily、PhysOrg、PopSciなど各国のメディアで大きく報道される等、世界的な注目を集めています。

今後、私たちの研究の途上で、「物質の波と粒子の性質がどんなふうに共存しているのか?」そんな100年の謎を解くためのヒントが見つかることかもしれません。

## 参考文献

- 1) "Visualizing picometric quantum ripples of ultrafast wave-packet interference," H. Katsuki et al. *Science* **311**, 1589-1592 (2006).
- 2) "Actively tailored spatiotemporal images of quantum interference on the picometer and femtosecond scales," H. Katsuki et al. *Phys. Rev. Lett.* **102**, 103602 (2009).
- 3) "Ultrafast Fourier transform with a femtosecond laser driven molecule," K. Hosaka et al. *Phys. Rev. Lett.* **104**, 180501 (2010).
- 4) Selected for "Editors' Suggestions" in PRL.
- 5) Covered by "Viewpoints" in Physics; Physics **3**, 38 (2010).
- 6) Covered by "Research Highlights" in Nature; Nature **465**, 138-139 (2010).
- 7) "Strong-laser-induced quantum interference," H. Goto et al. *Nature Physics* **7**, 383-385 (2011).
- 8) Highlighted by "News and Views" in Nature Phys. **7**, 373-374 (2011).
- 9) "All-optical control and visualization of ultrafast two-dimensional atomic motions in a single crystal of

It is observed in the double-slit experiment by Akira Tonomura and coworkers that single electrons recorded as dots on a detector screen build up to show an interference pattern, which is delocalized over the screen. This observation indicates that a delocalized wave function of an isolated electron interacts with the screen, which is a bulk solid composed of many nuclei and electrons interacting with each other, and becomes localized in space. This change, referred to as "collapse" in quantum mechanics, is often accepted as a discontinuous event, but a basic question arises: When and how the delocalized wave function becomes localized? Our dream is uncovering this mystery by observing the spatiotemporal evolution of a wave function delocalized over many particles interacting with each other. Having this dream in mind, we have developed coherent control with precisions on the picometer spatial and attosecond temporal scales. Now we apply this ultrafast and ultrahigh-precision coherent control to delocalized wave functions of macroscopic many-particle systems such as an ensemble of ultracold Rydberg atoms and a bulk solid, envisaging the quantum-classical boundary connected smoothly.




Fig.1. Spatiotemporal images of a wave function, which has been designed and visualized in the iodine molecule with precisions on the picometer spatial and attosecond temporal scales. Adopted from ref. 2).

- bismuth," H. Katsuki et al. *Nature Commun.* **4**, 2801 (2013).
- 6) "Direct observation of ultrafast many-body electron dynamics in an ultracold Rydberg gas," N. Takei et al. *Nature Commun.* **7**, 13449 (2016).
- 7) "Ultrafast coherent control of condensed matter with attosecond precision," H. Katsuki et al., *Acc. Chem. Res.* **51**, 1174-1184 (2018).
- 8) "Attosecond control of restoration of electronic structure symmetry," C. Liu et al., *Phys. Rev. Lett.* **121**, 173201 (2018).
- 9) "Ultrafast creation of overlapping Rydberg electrons in an atomic BEC and Mott-insulator lattice," *Phys. Rev. Lett.* **124**, 253201 (2020).



## ■光分子科学第三研究部門 Photo-Molecular Science III

# 機能性分子材料の電子物性評価 Electronic Property of Functional Organic Materials

### 解良 聰(教授)

KERA, Satoshi

1996年千葉大学工学部卒。  
1998年日本学術振興会特別研究員、2001年千葉大学大学院自然科学研究科修了(博士(理学))、千葉大学大学院助手、ブルツブルグ大学ポスドク研究員、千葉大学大学院融合科学研究科准教授を経て、  
2014年4月より現職。

TEL: 0564-55-7413  
mail: kera@ims.ac.jp

1996 B.S. Chiba University

1998 M.E. Chiba University

2001 Ph.D. Chiba University

1998 Research Fellowships for Young Scientists (JSPS)

2001 Assistant Professor, Chiba University

2003 Research Associate, Institute for Molecular Science

Postdoctoral Fellow, Wuerzburg University

2004 Assistant Professor, Chiba University

2007 Associate Professor, Chiba University

2009 Visiting Associate Professor, Institute for Molecular Science

2013 Adjunct Lecturer, The Open University of Japan

Visiting Associate Professor, Soochow University

2014 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2021 Visiting Professor, Chiba University, Tohoku University

#### 〈Keywords〉

Photoelectron Spectroscopy,  
Molecular Film,  
Electronic State


エネルギー・環境問題に対応すべく、有機半導体と呼ばれる機能性を示す分子群を利用したソフトデバイス(太陽電池やフレキシブル照明など)の研究が賑わいを見せ、多彩な構造の分子材料が日夜設計・開発されています。しかし依然として個々の分子の特徴を区別し、要望されるデバイスの中で適切な材料として自在に活用することができていません。これは本来の特性として絶縁物たる分子群が「有機半導体」として材料機能を示す理由とその真の特徴を認識できていないことに帰ります。具体的には、デバイスにおける無機物(金属電極等)が接する界面における分子の変性はもちろんのこと、構造異方性の高い凸凹した分子界面の原子レベルでの相互作用についての理解が全く不十分であるということです。また諸物性の発現機構や原理(相関や因果)、その制御のための量子論的な理解が不十分で、適切なガイドラインが構築されぬまま手探り状態の応用研究が続けられていることを意味します。

光電子分光法による電子状態測定は「分子の中の電子の姿」を量子論的に明らかにする上で極めて有効ですが、分子材料に対する実験的な難しさ(試料作製方法、光損傷や帯電回避法など測定技術)などから、電気伝導特性の中身とリンクさせることができ容易ではありませんでした。近年ようやく技術が成熟し、高感度角度分解紫外光電子分光(ARUPS)の実現による研究成果が積み重ねられ、有機半導体の電子の特徴が見え始めています。分子集合体における電子と振動の協奏現象が電子の“局在性の度合い”を大きく操作し物理現象を支配します。こうした弱い相互作用に特徴づけられる電子物性について重要な話題を提供していきたいと考えています。


#### 参考文献

- 1) S. Kera, H. Yamane, N. Ueno, "First principles measurements of charge mobility in organic semiconductors: Valence hole-vibration coupling in organic ultrathin films", *Prog. Surf. Sci.* **84**, 135-154 (2009).
- 2) F. Bussolotti, S. Kera, K. Kudo, A. Kahn, N. Ueno, "Gap states in pentacene thin film induced by inert gas exposure", *Phys. Rev. Lett.* **110**, 267602-1-5 (2013).
- 3) F. Bussolotti, J. Yang, T. Yamaguchi, Y. Nakayama, M. Matsunami, H. Ishii, N. Ueno, S. Kera, "Hole-phonon coupling effect on the band dispersion of organic molecular semiconductors", *Nat. Commun.* **8** 173-179 (2017).
- 4) M. Schwarze et. al., "Molecular Parameters Responsible for Thermally Activated Transport in Doped Organic Semiconductors", *Nature Materials* **18**, 242-248 (2019).
- 5) J. Yang et. al., "Accessing the Conduction Band Dispersion in  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$  Single Crystals", *J. Phys. Chem. Lett.* **12**, 3773-3778 (2021).

Functional organic materials (FOM) have recently attracted considerable attention both for fundamental research and device applications because of peculiar properties not found in inorganics and small molecules. However the mechanisms and its origin of various device characteristics are still under debate. Scientific mysteries are raised because people have believed that electronic structure of FOM would be conserved as in an isolated molecule for solid phases due to van der Waals interaction. To reveal characteristics of FOM the key investigation is precise experiments on the electronic structure at various interfaces, including organic-organic and organic-inorganic (metal/semiconductor) contacts. In these systems, the impacts of weak interaction on the electronic structure would appear as small intensity modulation of photoelectron-emission fine features depending on adsorption and aggregation on the surface. By recent development in the instrumental we can assess hidden fine structures in the electronic states, e.g. electron-phonon coupling, quasi-particle states, very small DOS in the HOMO-LUMO gap, narrow band dispersion and dynamic electronic polarization. To elucidate what happens for the FOM at the interface upon weak interaction, an evaluation on the wave-function spread of the electronic states is very important because the interface state of physisorbed system is described to be a delocalized molecular orbital state depending on the weak interaction (from vdW interaction to hybridization). Seeing a modification of electron wave function upon weak electronic coupling as well as strong electron-phonon coupling is central issue on our agenda.



A rich assortment in the structure of functional molecular materials and variety in the photoelectron spectral feature.



## 相対論的電子ビームを用いた光発生 Light Source Developments by Using Relativistic Electron Beams

加藤 政博(特任教授)  
KATOH, Masahiro

1981年東北大学理学部卒、  
1986年東京大学大学院理  
学系研究科中退、博士(理学)。  
高エネルギー加速器研究機  
構物質構造科学研究所助手  
を経て2000年3月分子科学  
研究所助教授、2004年1月  
より分子科学研究所教授、  
2019年4月より現職および  
広島大学教授。  
TEL: 0564-55-7206  
mail: mkatoh@ims.ac.jp

1982 B.S. Tohoku University  
1997 Ph.D. Tohoku University  
1986 Research Associate,  
National Laboratory for  
High Energy Physics  
2000 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science  
2004 Professor, Institute for  
Molecular Science  
Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies  
2019 Project Professor, Institute  
for Molecular Science  
Professor, Hiroshima  
University

〈Keywords〉  
Accelerator,  
Beam Physics,  
Astrobiology

分子科学研究所の保有する電子加速器UVSORは1980年代前半に建設されたシンクロトロン光源です。周長53m、電子エネルギー7.5億電子ボルトと小型で、テラヘルツ波から軟X線といったシンクロトロン光としては比較的低エネルギー(長波長)の領域を得意とします。何度かの改造を経て、現在でも同種の装置の中では世界最高水準の高性能を誇ります。私たちの研究グループでは、このUVSORの性能向上に取り組みながら、高エネルギー電子ビームからの光の放射に関する研究を行っています。

高エネルギー電子が強磁場中を走るときに発する強力な白色光がシンクロトロン光です。テラヘルツ波からX線に至る広大な波長域で高い指向性、偏光特性を有する光です。このシンクロトロン光が本来持っている優れた特性を十分に引き出すには、指向性、強度、安定性に優れた電子ビームが必須です。最新の加速器技術の導入、独自の技術開発により、世界最高水準の高品質電子ビームの生成に取り組んでいます。また、より強力なシンクロトロン光を発生するための挿入型光源と呼ばれる装置の開発にも取り組んでいます。

シンクロトロン光は優れた光源ですが、レーザーのようなコヒーレントな光源ではありません。我々は、レーザーのような特質を持つシンクロトロン光、すなわち、コヒーレントシンクロトロン光の発生に関する研究を進めてきました。シンクロトロン光を光共振器の中に閉じ込め電子ビームと繰り返し相互作用させることでレーザー発振が実現できます。自由電子レーザーと呼ばれる技術です。UVSORでは安定性や強度に優れた共振器型自由電子レーザーの開発を進めてきました。電子ビームと外部から導入したレーザー光を相互作用させることで、テラヘルツ波や真空紫外領域でコヒーレント光を発生することに成功しました。また、レーザー光を電子ビームに衝突させることで、エネルギー可変、偏光可変、超短パルスのガンマ線の発生に成功しました。最近では、電磁放射の時空間構造に着目した研究に力を入れています。光渦と呼ばれる螺旋状の波面を持つ光やベクトルビームと呼ばれる偏光が場所により変化する光など、空間的な構造を持つ放射光の研究を進めています。また、放射光の波の時間構造を利用し、原子の量子状態を制御する研究にも着手しました。

相対論的電子からの光の放射、放射された光の物質との相互作用は、基礎物理学の対象としても興味深く、また、天体物理学、プラズマ物理学から物質科学、生命科学、アストロバイオロジーなど様々な分野において重要な役割を果たします。我々は、幅広い分野の研究者と協力して、光の物理の探求を進めています。

UVSOR is a synchrotron light source providing low energy synchrotron light ranging from terahertz wave to soft X-rays. Although it was constructed in 1980's, its performance is still in the world top level. This is the result of the continuous effort on improving the machine. Our research group has been developing accelerator technologies toward producing bright and stable synchrotron light, such as high brightness electron beam optics, novel insertion devices or state-of-the-art accelerator technologies.

We have been also developing novel light source technologies toward producing photons with excellent properties, such as free electron laser, coherent synchrotron radiation and laser Compton gamma-rays. We are also investigating beam physics which would be the basis of the novel light source technologies. We have demonstrated producing optical vortex beam and optical vector beam from the synchrotron. We are exploring their applications as novel probes for material sciences and their possible roles in nature.

Radiation from relativistic electrons and its interaction with matters are also interesting as subjects of basic physics, astrophysics, plasma physics, materials science, life science including astrobiology. In cooperation with researchers in a wide range of fields, we are exploring new research areas.



UVSOR-III Electron Storage Ring and Synchrotron Radiation Beam-lines.  
The circumference is 53m. The electron energy is 750 MeV. Electrons are circulating in the storage ring at almost the speed of light and radiate intense vacuum ultraviolet light.

### 参考文献

- 1) M. Katoh, M. Fujimoto, H. Kawaguchi, K. Tsuchiya, K. Ohmi, T. Kaneyasu, Y. Taira, M. Hosaka, A. Mochihashi, Y. Takashima, "Angular Momentum of Twisted Radiation from an Electron in Spiral Motion", *Phys. Rev. Lett.* **118**, 094801 (2017).
- 2) Y. Hikosaka, T. Kaneyasu, M. Fujimoto, H. Iwayama, M. Katoh, "Coherent control in the extreme ultraviolet and attosecond regime by synchrotron radiation", *Nat. Commun.* **10** 4988 (2019).



■電子ビーム制御研究部門 Beam Physics and Diagnostics Research

## 高エネルギー電子ビームを用いた 新規量子ビーム源開発と利用研究

Development and Utilization of Novel Quantum Beam Sources  
Using a High Energy Electron Beam

平 義隆(准教授)

TAIRA, Yoshitaka

2007年名古屋大学理学部物理学科卒、2009年名古屋大学大学院理学研究科博士課程前期課程修了、2011年～2012年日本学術振興会特別研究員(DC2)、2012年名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課程修了、2012年産業技術総合研究所研究員、2016年～2018年日本学術振興会海外特別研究員、2018年産業技術総合研究所主任研究員を経て2020年4月より現職。

TEL: 0564-55-7400

mail: yostaira@ims.ac.jp

2007 B.S. Nagoya University

2009 M.S. Nagoya University

2011- Research Fellowship  
2012 for Young Scientists,  
Japan Society for  
Promotion of Science  
(JSPS)

2012 Ph.D. Nagoya University

2012 Research Scientist,  
National Institute of  
Advanced Industrial  
Science and Technology  
(AIST)

2016-Overseas Research  
2018 Fellowships, Japan  
Society for Promotion  
of Science (JSPS)

2018 Senior Research  
Scientist, National  
Institute of Advanced  
Industrial Science and  
Technology (AIST)

2020 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

〈Keywords〉

Electron Beams,  
Synchrotron Radiation,  
Gamma-Rays,  
Positrons

人間の目に見える可視光以外にも世の中には沢山の光が存在します。例えば携帯電話やテレビ放送に使われている波長の長い電波、可視光よりも波長の短い紫外線、レントゲン写真で有名な物を透過するX線やガンマ線などが挙げられます。これらの光を人工的に発生するには様々な方法がありますが、私たちのグループでは「電子」を用いた方法を使っています。分子科学研究所にあるUVSORと呼ばれる装置は、電子を光の速さの99.9999768%まで加速することができます。このほぼ光速の電子を磁石やレーザーを使ってその軌道を僅かに変えることで様々な波長帯の光を発生することができます。

光には、波長の他に時間的な長さ(パルス幅)や光の電場の偏り具合を表す偏光といった特徴があります。私たちのグループでは、これまでに無い新しい特徴を持つ光をどうすれば発生できるのか、そしてその新しい特徴を活用した利用法を探索する研究を行っています。

一例を挙げると、10兆分の1秒の極めて短時間のパルス幅をもつガンマ線を発生する研究を行っています。ガンマ線はセシウムなどの放射性同位元素から発生する事が良く知られていますが、そういう放射性同位元素からは到底発生することができない特徴をもつガンマ線が高エネルギー電子ビームを用いると発生可能になります。ガンマ線からは対生成と呼ばれる現象によって電子とその反粒子である陽電子が発生します。私たちのグループでは、この陽電子を用いて金属材料や高分子材料内部に存在するナノメートルの欠陥や空隙を分析する技術を開発し、材料の特性改善に関する研究を行っています。




Fig.1: Schematic illustration of 90-degree laser Thomson scattering.

### 参考文献

- 1) Y. Taira, M. Adachi, H. Zen, T. Tanikawa, N. Yamamoto, M. Hosaka, Y. Takashima, K. Soda, M. Katoh, "Generation of energy-tunable and ultra-short-pulse gamma ray via inverse Compton scattering in an electron storage ring", *Nucl. Instr. Meth. A*, **652** (2011) 696.
- 2) Y. Taira, H. Toyokawa, R. Kuroda, N. Yamamoto, M. Adachi, S. Tanaka, M. Katoh, "Photon-induced positron annihilation lifetime spectroscopy using ultrashort laser-Compton-scattered gamma-ray pulses", *Rev. Sci. Instr.*, **84** (2013) 053305.

Our group develop new electromagnetic wave sources using a high energy electron beam. In the UVSOR-III electron storage ring at the Institute for Molecular Science, a 750-MeV electron beam can be generated. Electromagnetic waves in a wide frequency range from ultraviolet waves to gamma-rays are generated by interacting the electron beam with magnetic fields and lasers.

Laser Thomson (Compton) scattering is a method to generate a high energy gamma-ray by the interaction between a high energy electron and a laser. We have developed ultra-short pulsed gamma-rays with the pulse width of sub-ps to ps range by using 90-degree laser Thomson scattering. We applied this ultra-short pulsed gamma-rays to gamma induced positron annihilation lifetime spectroscopy (GiPALS). A positron is an excellent probe of lattice defects in solids and of free volumes in polymers at the sub-nm to nm scale. GiPALS enables defect analysis of a thick material in a few cm because positrons are generated throughout a bulk material via pair production. Our group is conducting research on improving the properties of the material by using GiPALS.




Fig.2: Positron annihilation lifetime spectrum of stainless steel for positron defect measurements (5607-a) supplied by National Metrology Institute of Japan (NMIJ). Measured positron lifetime 108 ps agrees well with the indicative value.

- 3) Y. Taira, T. Hayakawa, M. Katoh, "Gamma-ray vortices from nonlinear inverse Thomson scattering of circularly polarized light", *Scientific Reports*, **7** (2017) 5018.
- 4) Y. Taira, M. Katoh, "Gamma-ray vortices emitted from nonlinear inverse Thomson scattering of a two-wavelength laser beam", *Phys. Rev. A*, **98** (2018) 052130.
- 5) Y. Taira, M. Fujimoto, S. Ri, M. Hosaka, M. Katoh, "Measurement of the phase structure of elliptically polarized undulator radiation", *New J. Phys.*, **22** (2020) 093061.



## X線顕微鏡の応用技術開発 Application of X-ray Microscopy

大東 琢治(准教授(クロスマント))  
OHIGASHI, Takuji

1998年筑波大学第三学群  
基礎工学類卒、2003年同大  
学大学院工学研究科博士課  
程修了、博士(工学)。同大学  
院理工学研究科講師を経て  
2004年東北大学多元物質  
科学研究所研究支援者、  
2005年JASRI/SPring-8  
協力研究員、2008年立命館  
大学ポストドクトラルフェロー、  
2011年分子科学研究所助教。  
2022年物質構造科学研究所  
准教授、分子科学研究所准  
教授(クロスマントメント)。

TEL: 0564-55-7203

mail: ohigashi@ims.ac.jp

1998 B.S. Engineering,  
Tsukuba University

2003 Ph.D. Engineering,  
Tsukuba University

2003 Lecturer,  
Tsukuba University

2004 Research Fellow,  
Tohoku University

2005 Research Fellow,  
Japan Synchrotron  
Radiation Research  
Institute (JASRI)

2008 Postdoctoral Fellow,  
Ritsumeikan University

2011- Assistant professor,  
2022 Institute for Molecular  
Science

2022 Associate Professor,  
Institute of Materials  
Structure Science

2022 Associate Professor ,  
Institute for Molecular  
Science  
(Cross Appointment)


### Keywords

X-ray Microscopy,  
In-situ Technique,  
X-ray Absorption  
Spectroscopy,

Synchrotron Radiation

放射光を光源として用いた走査型透過X線顕微鏡(STXM)は、高空間分解能(~30 nm)で2次元X線吸収スペクトルを得る手法であり、これを特定元素の吸収端近傍で詳細に行なうことで、試料の2次元化学状態分析を行なうことができます。STXMは透過力の高いX線をプローブとして用いており、また比較的ワーキングディスタンスが大きいことから、試料付近の許容度が高く、試料周辺を発展させるための余地が大きくなります。そのため、特殊試料セルを設計することによって、様々な観察や分析手法の開発を精力的に行ってきました。特に、測定チャンバー内で試料のありのままの状態を小規模に再現するin-situ分析は、試料の本質に迫るために重要な分析技術として重要な技術です。そこでUVSORに設置されているSTXMを用いて、試料の加熱と冷却、湿度環境制御、電気化学など、他の手法では実現が難しいシステム開発を行なってきました<sup>1)</sup>。そのほかにも分子の配向性観察や、3次元化学状態観察<sup>2)</sup>、世界唯一となるリチウムの化学状態の顕微分析法<sup>3)</sup>など、多様な技術開発を推進し、サイエンスの新たな展開に貢献しています<sup>4),5)</sup>。最近では、小惑星探査機はやぶさ2が地球に持ち帰った小惑星リュウグウの岩石を、大気非曝露条件下で有機物分析を行なった結果が注目を集めています。


A synchrotron-based scanning transmission X-ray microscope (STXM) is a technique to perform 2-dimensional (2-D) X-ray absorption spectroscopy with high spatial resolution up to 30 nm. By noticing the X-ray absorption edge of the specific element, 2-D chemical state of a sample can be obtained. The unique features of STXM, high transmittance of X-ray and relatively wide working distance, gain flexibility of the sample and its environment. Therefore, we have been developing special observation/analytical techniques by designing sample cells for STXM in UVSOR. Especially, an in-situ/operando analysis is an important technique to understand nature of the samples. For example, a heating and cooling of the sample, humidity control system and electrochemistry<sup>1)</sup>, 2-D orientation of molecules, 3-D chemical state mapping<sup>2)</sup> and microscopic analysis of chemical state of lithium<sup>3)</sup> have been developed to explore a new field of science<sup>4),5)</sup>. Essentially, these techniques are difficult to perform by using the other microscopic techniques. Recently, a small spacecraft Hayabusa2 brought back some rocks from an asteroid Ryugu and organic materials in the rocks were analyzed by STXM with an air-free sample transfer system.



Schematic optical system of STXM

### 参考文献

- 1) T. Ohigashi, M. Nagasaka, T. Horigome, N. Kosugi, S. M. Rosendahl and A. P. Hitchcock, "Development of in-situ sample cells for scanning transmission x-ray microscopy", *AIP Conference Proceedings*, **1741**, (2016), 050002.
- 2) T. Ohigashi, A. Ito, K. Shinohara, S. Tone, Y. Inagaki, H. Yuzawa and N. Kosugi, "3-Dimensional Chemical Structures of an Isolated Cell Nucleus by a Scanning Transmission X-ray Microscope", *Microsc. Microanal.*, **24**, (2018), pp. 400-401.
- 3) T. Ohigashi, H. Yuzawa and N. Kosugi, "A low-pass filtering Fresnel zone plate for soft x-ray microscopic analysis down to the lithium K-edge region", *Rev. Sci. Instrum.*, **91**, (2020), 103110.
- 4) G. Germer, T. Ohigashi, H. Yuzawa, N. Kosugi, R. Flesch, F. Rancan, A. Vogt and E. Rühl, "Improved Skin Permeability after Topical Treatment with Serine Protease: Probing the Penetration of Rapamycin by Scanning Transmission X-ray Microscopy", *ACS Omega*, **6**, (2021), 12213-12222.
- 5) J-J. V. Vélez, Y-Y. Chin, M-H. Tsai, O. J. Burton, R. Wang, S. Hofmann, W-H. Hsu, T. Ohigashi, W-F. Pong, C-H. Chuang, "Evidence of synergistic elecrocatalysis at a cobalt oxide-graphene interface through nanochemical mapping of scanning transmission X-ray microscopy", *Chinese Journal of Physics*, **76**, (2022), 135-144.



## 松井 文彦(教授)

MATSUI, Fumihiko

1995年東京大学理学部卒業、  
2000年同大学大学院理学  
研究科博士後期課程修了、  
博士(理学)。2000年奈良先  
端科学技術大学院大学物質  
創成科学研究科助手、助教、  
2011年チューリッヒ大学物理  
学科客員研究員、2013年奈良  
先端科学技術大学院大学准  
教授、2018年分子科学研究所  
主任研究員を経て、2021年  
11月より現職。

TEL: 0564-55-7201

mail: matui@ims.ac.jp

1995 B. S. The University of  
Tokyo

1997 M. S. The University of  
Tokyo

2000 Ph.D. The University of  
Tokyo

2000 Assistant Professor,  
Nara Institute of  
Science and Technology

2011 Guest Professor,  
Zürich Universität

2013 Associate Professor,  
Nara Institute of Science  
and Technology

2018 Senior Researcher,  
Institute for Molecular  
Science

2021 Professor, Institute for  
Molecular Science

### 〈Keywords〉

Photoelectron  
Spectroscopy,

Momentum Microscope,  
Electronic Spin Structure,  
Synchrotron Radiation

### ■光物性測定器開発研究部門 Advanced Solid State Physics

## 先端光電子分析法の創成による 電子・スピニ物性科学の新展開

Establishing Advanced Photoemission Methodologies  
for Novel Spin Materials Science

物質中では電子は原子に散乱され、互いに干渉しあいながら、波のように運動しています。光を照射し、電子を真空中に取り出して計測する光電子分光法は、こうした物質中の電子の素性を原子レベルで解明する有力な手法として発展してきました。面白いことに、電子は波の性質を保持したまま光電子として真空中に飛び出すため、光電子の角度分布には、物質中の電子の運動や原子の並び方に由来する実に美しい波紋文様(光電子ホログラム)が現れます。光電子が織りなす「アート」を物理法則に基づいて解析すると、時として原子の世界と実用的な技術が結び付く発見に至る、それが私たちの研究の醍醐味です。

私たちは分子研極端紫外光研究施設(UVSOR)に世界最先端の光電子運動量顕微鏡の実験拠点を新設しました。光電子運動量顕微鏡は、光電子ホログラムを可視化する新しい発想の分析器で、物性が発現している微小領域に照準を合わせ、実際にその物性を司る電子状態にズームインすることができます。私たちが特に注目する電子スピンは特異な磁気特性・電気伝導・光熱励起・化学反応など様々な量子現象の源泉です。そこで、私たちは独自の3Dスピンベクトルイメージング装置や元素選択的な共鳴光電子回折分光法を創案しました。これらを光電子運動量顕微鏡と融合し、電子物性・機能が発現する現場を直接分析する研究を進めています。独自の分析装置・分光手法を駆使して電子の運動を精緻・包括的に解析し、まだ誰も知らない新奇現象を捕まえ、電子・スピニ物性科学の新展開を目指します。

The electrons in the materials are emitted into the vacuum as photoelectrons by being excited by photons. Interestingly, the angular distribution of such photoelectrons reveals a truly beautiful hologram pattern derived from the valence electron motion and the arrangement of atoms in the materials. Analyzing "art" based on the laws of physics sometimes leads us to the discovery that connects the world of atoms with practical technologies and applications, which is the real pleasure of our research.

We constructed an advanced photoelectron momentum microscope (PMM) experimental station at the UVSOR Synchrotron Facility of IMS. The PMM is a novel concept analyzer for imaging photoelectron hologram and Fermi surface patterns from a  $\mu\text{m}$ -sized area. Furthermore, we are developing our own 3D spin vector imaging system and element-selective resonant-photoelectron-diffraction-spectroscopy technique.

Electron spins, which we pay particular attention to, are the source of various physical properties and functions such as magnetism, superconductivity, and topology. We aim to pioneer cutting-edge spin material science through comprehensive and detailed characterization of electrons.




Figure Photoelectron momentum microscope at BL6U of UVSOR Synchrotron Facility together with valence photoelectron holograms and dispersions of  $\text{TaS}_2$  and  $\text{Bi}_2\text{Se}_3$ . Charge density wave phase transition and topological nature can be directly studies in detail.

### 参考文献

- 1) F. Matsui, S. Makita, H. Matsuda, E. Nakamura, Y. Okano, T. Yano, S. Kera, S. Suga, "Valence Band Dispersion Embedded in Resonant Auger Electrons" *J. Phys. Soc. Jpn.*, **90**, 124710 (2021).
- 2) F. Matsui, S. Makita, H. Matsuda, T. Yano, E. Nakamura, K. Tanaka, S. Suga, S. Kera, "Photoelectron Momentum Microscope at BL6U of UVSOR-III synchrotron" *Jpn. J. Appl. Phys.*, **59**, 067001(2020).
- 3) F. Matsui, T. Matsushita, H. Daimon, "Holographic reconstruction of photoelectron diffraction and its circular dichroism for local structure probing" *J. Phys. Soc. Jpn.*, **87**, 061004 (2018).
- 4) F. Matsui, H. Nishikawa, H. Daimon, M. Muntwiler, M. Takizawa, H. Namba, T. Greber, "The  $4\pi kz$  periodicity in photoemission from graphite" *Phys. Rev. B*, **97**, 045430 (2018).
- 5) F. Matsui, M. Fujita, T. Ohta, N. Maejima, H. Matsui, H. Nishikawa, T. Matsushita, H. Daimon, "Selective Detection of Angular-Momentum-Polarized Auger Electrons by Atomic Stereography" *Phys. Rev. Lett.*, **114**, 015501 (2015).



田中 清尚(准教授)  
TANAKA, Kiyohisa

2000年東京大学理学部卒業、  
2005年東京大学大学院理学  
系研究科博士課程修了、博  
士(理学)。米国スタンフォード  
大学及びローレンスバーク  
レー国立研究所博士研究員、  
大阪大学助教、特任准教授を  
経て現職。

TEL: 0564-55-7202  
mail: k-tanaka@ims.ac.jp

2000 B.S. The University of  
Tokyo

2005 Ph.D. The University of  
Tokyo

Postdoctoral Fellow,  
Stanford University and  
Lawrence Berkeley  
National Laboratory

2008 Assistant Professor,  
Osaka University

2013 Associate Professor,  
Osaka University

2014 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

#### 〈Keywords〉

Strongly Correlated  
Electron System,  
Synchrotron Light,  
Photoemission

■光物性測定器開発研究部門 Advanced Solid State Physics

## 電子構造の直接観測による 固体物性の発現機構の解明

Angle-Resolved Photoemission Study  
on Strongly Correlated Electron Materials

近年、強相関電子系とよばれる物質群が話題を集めています。これらの物質中では、電子の密度が非常に高いため電子同士が互いに強く相互作用しあっていて、固体物理学の基本理論であるバンド理論では電子の運動を説明できません。そして従来理論の予想を遥かに超えたきわめて多彩で面白い物性、例えば高温超伝導、巨大磁気抵抗、非フェルミ液体などが出現することが最近の研究でわかつてきました。このような、強相関電子系の物質は、電子の電荷・ спин・軌道を制御することで、これまでのエレクトロニクスを凌駕するスピントロニクス、強相関エレクトロニクスの電子デバイスになる可能性を秘めており次世代のエレクトロニクスを担う物質として期待されています。


これらの物性は、物質のフェルミ準位のごく近傍の電子状態が担っていて、その電子状態を観測することは物性発現機構の理解、そして新物性の発見には欠かせません。われわれのグループは、UVSOR-Ⅲのシンクロトロン光を使って、強相関伝導系物質の分光実験を行うことで、電子状態を直接観測する研究を行っています。シンクロトロン光は、テラヘルツ・遠赤外からX線まで切れ目のない連続な光であり、かつ高輝度でかつ偏光特性に優れており、実験室とは違ったまったく新しい分光実験を行うことができます。また強相関電子系物質では、電子の電荷に加えて、スピントリニティに大きく寄与します。そこで世界に先駆けて、固体中の電子の運動だけでなく、そのスピントリニティの情報まで同時に取得できる分光装置の開発を行っています。

このように新奇機能性を生み出す電子構造を観測するためのシンクロトロン光を使った新しい分光法を開発し、様々な物質の物性の発現機構の解明を目指しています。


#### 参考文献

- 1) K. Tanaka, W.S. Lee, D.H. Lu, A. Fujimori, T. Fujii, Risdiana, I. Terasaki, D.J. Scalapino, T.P. Devereaux, Z. Hussain, Z.-X. Shen, "Distinct Fermi-momentum-dependent energy gaps in deeply underdoped Bi2212." *Science* **314**, 1910-1913 (2006).
- 2) W.S. Lee, I.M. Vishik, K. Tanaka, D.H. Lu, T. Sasagawa, N. Nagaosa, T.P. Devereaux, Z. Hussain, Z.-X. Shen, "Abrupt onset of a second energy gap at the superconducting transition of underdoped Bi2212." *Nature* **450**, 81-84 (2007).

Strongly correlated electron materials has attracted more attentions in the last few decades because of their unusual and fascinating properties such as high-Tc superconductivity, giant magnetoresistance, heavy fermion and so on. Those unique properties can offer a route toward the next-generation devices. We investigate the mechanism of the physical properties as well as the electronic structure of those materials by using angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES), a powerful tool in studying the electronic structure of complex materials, based on synchrotron radiation.



High energy resolution angle-resolved photoemission spectroscopy beamline BL7U at UVSOR synchrotron.



## ■電子構造研究部門 Electronic Structure

# 物質分子科学のための新しい分光法の開発

Exploitation of Novel Spectroscopic Methods  
for Material and Surface Science

横山 利彦(教授)

YOKOYAMA, Toshihiko

1983年東京大学理学部卒業、  
1987年同大学大学院理学系  
研究科博士課程中退、博士  
(理学)。1987年広島大学理学  
部助手、1993年東京大学大学  
院理学系研究科助手、1994  
年同講師、1996年同助教授  
を経て、2002年1月より現  
職。2007年4月～2013年3月  
分子スケールナノサイエンス  
センター長、2011年4月～現在  
物質分子科学研究領域主  
幹、2014年9月～2016年3月、  
2018年4月～現在機器セン  
ター長併任。

TEL: 0564-55-7345

FAX: 0564-55-7448

mail: yokoyama@ims.ac.jp

1983 B.S.The University of  
Tokyo

1985 M.S. The University of  
Tokyo

1990 Ph.D. The University of  
Tokyo

1987 Research Associate,  
Hiroshima University

1993 Research Associate,  
The University of Tokyo

1994 Lecturer, The University  
of Tokyo

1996 Associate Professor,  
The University of Tokyo

2002 Professor, Institute for  
Molecular Science

Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies

### 〈Keywords〉

X-Ray Absorption  
Spectroscopy,

Surface & Thin Film  
Magnetism,

Ambient Pressure  
Hard X-Ray  
Photoelectron  
Spectroscopy

現代の物質科学は高性能だけでなく安全安心などさまざまな観点から調和のとれた物質材料の創製を求められており、物質材料・素子の特性を詳細に評価・解析し、よりよい物質材料設計を行う必要があります。そのため、物質材料を解析する手法の空間分解能や時間分解能がますます求められています。我々は、主に大型加速器から放射されるX線(シンクロトロン放射光)を用いた分光学的手法に基づいた新しい測定手法の開発とその応用に取り組んでいます。

我々は、2017年に大気圧下でのX線光電子分光測定に世界で初めて成功しました。光電子分光法は、通常高真空中での測定が必須ですが、エネルギーの大きい硬X線を用いることなどで、1気圧までの測定が可能な光電子分光装置が開発できました。これを用いて、燃料電池の動作下での状態解析により性能の失活機構や被毒の原因究明などを行っています。

また、X線自由電子レーザーを用いた高速時間分解軟X線吸収分光測定を手掛けており、100フェムト秒以下の時間分解能で磁性薄膜の高速磁化反転ダイナミクス解析を行い、元素による磁化反転時間の相違の検証などに成功しています。


For the developments of novel functional materials, it is quite important to exploit simultaneously new analytical methods based on advanced technology. Novel materials and devices often require spatial and/or time resolved analysis to optimize their qualities. In our group, we have been exploiting spectroscopic methods for material and surface science using mainly synchrotron radiation (SR) and partly lasers.

The present first subject is the exploitation of ambient pressure hard x-ray photoelectron spectroscopy (HAXPES) and its application to polymer electrolyte fuel cells (PEFC) under working conditions. In 2017, we succeeded in the HAXPES measurement under real ambient pressure of  $10^5$  Pa for the first time in the world. We are investigating working PEFC by the technique for the elucidation of degradation and/or poisoning mechanisms of PEFC to improve its performance with longer life time.


The second subject is the ultrafast (<100 fs) time resolved soft x-ray absorption measurements of spin dynamics in magnetic thin films in order to understand element-specific magnetization reversal mechanisms.

### 参考文献

- 1) "Quick Operando Ambient Pressure Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy for Reaction Kinetic Measurements of Polymer Electrolyte Fuel Cells" T. Nakamura, Y. Takagi, S. Chaveanghong, T. Uruga, M. Tada, Y. Iwasawa And T. Yokoyama, *J. Phys. Chem. C* **124**, 17520 (2020).
- 2) "X-ray photoelectron spectroscopy under real ambient pressure conditions" Y. Takagi, T. Nakamura, L. Yu, S. Chaveanghong, O. Sekizawa, T. Sakata, T. Uruga, M. Tada, Y. Iwasawa and T. Yokoyama, *Appl. Phys. Exp.* **10**, 076603 (2017).
- 3) "Dynamics of Photoelectrons and Structural Changes of Tungsten Trioxide Observed by Femtosecond Transient XAFS" Y. Uemura, D. Kido, Y. Wakisaka, H. Uehara, T. Ohba, Y. Niwa, S. Nozawa, T. Sato, K. Ichiyanagi, R. Fukaya, S. Adachi, T. Katayama, T. Togashi, S. Owada, K. Ogawa, M. Yabashi, K. Hatada, S. Takakusagi, T. Yokoyama, B. Ohtani, and K. Asakura, *Angew. Chem. Int. Ed.* **55**, 1364 (2016).
- 4) "Anharmonicity and Quantum Effects in Thermal Expansion of an Invar Alloy" T. Yokoyama and K. Eguchi, *Phys. Rev. Lett.* **107**, 065901 (2011).
- 5) "Magnetic circular dichroism near the Fermi level" T. Nakagawa and T. Yokoyama, *Phys. Rev. Lett.* **96**, 237402 (2006).



Ambient pressure hard x-ray photoelectron spectroscopic system. (a) Apparatus installed at SPring-8 Beamline 36XU. (b) Au 4f HAXPES of Au(111) at a real ambient pressure of  $10^5$  Pa. (c) S 1s HAXPES of the anode Pt and Pt<sub>3</sub>Co electrodes of aged (fresh) and degraded polymer electrolyte fuels cells under working conditions. The Pt<sub>3</sub>Co electrode is found to be more tolerant against S than the Pt electrode. (d) Quick HAXPES measurements of the cathode Pt of the polymer electrolyte fuels cells upon abrupt change of the cathode-anode voltage from 0.4 to 1.2 V. The time resolution is 500 ms.



## ■電子構造研究部門 Electronic Structure

# 固体表面における分子集合体の特異的な構造物性・化学的機能・量子ダイナミクスの探求

Unique Structures, Physicochemical Properties and Quantum Dynamics of Molecular Aggregates at Solid Surfaces

## 杉本 敏樹(准教授)

SUGIMOTO, Toshiki

2007年京都大学理学部卒、  
2011年東京大学大学院工学  
系研究科物理工学専攻博  
士課程修了、博士(工学)。  
日本学術振興会特別研究員  
(DC2-PD)、京都大学大学院  
理学研究科化学専攻助教、  
JSTさきがけ研究員を経て  
現職。2016年科学技術振  
興機構さきがけ研究者(革  
新的触媒領域)兼務(2020  
年3月まで)。2019年科学技  
術振興機構さきがけ研究者  
(革新的光技術領域)兼務  
(2023年3月まで)。

TEL: 0564-55-7280

mail:  
toshiki-sugimoto@ims.ac.jp

2007 B.S., Kyoto University

2011 Ph.D., The University of  
Tokyo (Doctor of  
Engineering)

Research Fellowship  
for Young Scientists  
(DC2-PD), Japan  
Society for the  
Promotion of Science

2012 Assistant Professor,  
Kyoto University

2016-PRESTO Researcher  
2020 (innovative catalysis),  
Japan Science and  
Technology Agency

2018-  
Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

2019-  
PRESTO Researcher  
(innovative photonic  
technology),  
Japan Science and  
Technology Agency

〈Keywords〉

Water Molecule,  
Molecular Spectroscopy,  
Surface Science

固体の表面は固体の内部とは異なる構造を有しているため、物性や化学機能、量子ダイナミクス等を支配する電子の状態は表面と内部とでは全く異なったものになります。この固体表面は気相や液相にある原子・分子が固体と出会う重要な場を提供しています。原子や分子が表面に吸着して固体と相互作用する際には、気相や液相では発現しない新奇な物性や化学機能が創発されることがしばしばあります。こうした固体表面における特異な現象は、我々の身近なところでは「触媒・腐食・接着などの化学反応」や「光触媒・燃料電池・太陽電池などのエネルギー変換」において実生活とも密接に関わっています。

私たちは、水素、メタン、水分子などの身近な軽分子に興味を持ち、実用物質の不均一な表面やナノレベルで構造を規定・制御したモデル固体表面に吸着・凝集した分子集合体がどのようなメカニズムで特異的な構造物性や化学機能、量子ダイナミクスを発現させているのかを解明することを目指しています<sup>1-5)</sup>。多体の相互作用によって発現する複雑な固体表面現象を素過程のレベルから微視的に明らかにするために、赤外光や可視光に加えて紫外光やX線といった様々なエネルギー領域の光(連続光・パルスレーザー光)や電子線、走査型顕微鏡を用いた最先端の表面分光研究・物理化学研究に挑戦しています(Figs.1, 2)。また、従来の実験方法では観測自体が不可能であった“水素(水素結合ネットワーク中のプロトン)の局所構造”を可視化するための“革新的な表面顕微分光計測法”を開発することにも世界に先駆けて挑戦しています。

水分子の集合体が関与する固体表面現象は、物理学・化学・工学・生物学・地学といった広い範囲の分野において基礎・応用の両観点で極めて重要な研究対象です。私たちは、22世紀につながる人類の知見・基礎学理を構築することを目指し、このように学術的・実学的に興味深い固体表面現象をナノレベルの目線で解き明かす基礎研究を展開しています。

## 参考文献

- 1) K. Shirai, G. Fazio, T. Sugimoto et al., Water-assisted hole trapping at highly curved surface of nano-TiO<sub>2</sub> photocatalyst, *J. Am. Chem. Soc.* **140**, 1415 (2018).
- 2) T. Sugimoto et al., Inelastic Electron Tunneling Mediated by Molecular Quantum Rotator, *Phys. Rev. B* **96**, 241409(R) (2017).
- 3) T. Sugimoto et al., Emergent high-Tc ferroelectric ordering of strongly correlated and frustrated protons in heteroepitaxial ice film, *Nature Physics* **12**, 1063 (2016).
- 4) K. Shirai, T. Sugimoto et al., Effect of Water Adsorption on Carrier Trapping Dynamics at the Surface of Anatase TiO<sub>2</sub> Nanoparticles. *Nano Lett.* **16**, 1323 (2016).

Surfaces and interfaces are the places where the spatially isolated electrons in molecules meet delocalized ones in substrates such as metals. Under such circumstances, molecules behave very differently from those in gas and liquid phases. Unexpected molecular processes sometimes take place at surfaces and interfaces. There are many important applications where surfaces/interfaces play an important role, such as photovoltaic application for energy conversion and catalytic application for chemical reaction. These all depend on specific many-body complex interactions that are not always fully understood. Our ultimate aim is to elucidate such cooperative interactions at the molecular level.

By using state-of-the-art molecular spectroscopy in combination with sophisticated surface scientific techniques, we have elucidated unique structures, physical properties, chemical functions, and quantum dynamics of hydrogen, water molecules and their assemblies at surfaces/interfaces of solid materials<sup>1-5)</sup>. In addition, we are challenging to develop innovative microspectroscopy with atomic resolution for directly observing the local structure of protons in the unique hydrogen-bond network of water molecular aggregates at solid surfaces/interfaces.




Fig. 1 Infrared-visible sum-frequency-generation (SFG) spectroscopy of water molecules on solid surface<sup>3)</sup>.




Fig. 2 Unimolecular inelastic-electron-tunneling (IET) spectroscopy of quantum rotator on solid surface<sup>2)</sup>.

- 5) T. Sugimoto et al., Nuclear Spin Dynamics of Molecular Hydrogen Adsorbed on Solid Surfaces –Interdisciplinary Surface Electromagnetic Process-. *J. Phys. Soc. Jpn.* **71**, 668 (2016).



## ■分子機能研究部門 Molecular Functions

# 有機太陽電池 Organic Solar Cells

### 平本 昌宏(教授)

HIRAMOTO, Masahiro

1984年大阪大学大学院基礎工学研究科化学系博士課程中退、84年分子科学研究所文部技官、88年大阪大学工学部助手、97年大阪大学大学院工学研究科准教授を経て、2008年より現職。専門:有機半導体の光電物性と太陽電池、デバイス応用。

TEL: 0564-59-5537

mail: hiramoto@ims.ac.jp

1984 Osaka University,  
Faculty of Engineering  
Science

1986 Ph.D. (Engineering)  
Osaka University

1984 Institute for Molecular  
Science, Technical  
Associate

1988 Faculty of Engineering,  
Osaka Univ., Research  
Associate

1997 Faculty of Engineering,  
Osaka Univ., Associate  
Professor

2008 Professor, Institute for  
Molecular Science

Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies

### 〈Keywords〉

Organic Semiconductors,  
Organic Solar Cells,  
ppm-Doping

エネルギー問題の解決は科学者の責務です。特に、我が国において、エネルギー資源がない状況は、明治維新から現在に至るまで全く変わっておらず、先の大戦、3.11の原子力災害のような、悲劇的で大きな歴史の転換は、常にエネルギーをめぐって起こっています。太陽電池は我が国のエネルギー自給の切り札となります。また、「エネルギーを制するものは世界を制する」との言葉にあるように、石油に代わって、21世紀の世界の基幹産業になります。

以上の考えに基づき、平本グループでは、次世代太陽電池の有力候補である、有機太陽電池の研究を行っています。

有機太陽電池は、最近スマホ画面にもなっている有機ELの太陽電池版です。有機太陽電池は、軽量なフレキシブルシートの形で、印刷によって新聞のように大量安価に作れ、屋根、壁、窓にはりつけたり、自動車にベンキのように塗って使うなど、これまでのシリコン太陽電池とはちがつた全く新しい使い方になります。

平本は、1991年に、有機ブレンド接合(図1)のコンセプト<sup>1)</sup>を世界に先がけて提案し、有機太陽電池はこの構造をつかっています。また、1990年に、有機タンデム接合を世界で初めて提案し<sup>2)</sup>、近年の最高変換効率は有機タンデム接合セルによるものです。

有機太陽電池の分野でブレイクスルーを起こすには、有機半導体の物性物理学の深い理解に基づいて、太陽光によって生じる電流、電圧を大きくしていく必要があります<sup>3),5)</sup>。最近、有機単結晶太陽電池の研究で大きな成果を発表しました<sup>4)</sup>。若い人たちが、この研究に加わっていただくことを期待しています。

### 参考文献

- 1) M. Hiramoto, H. Fujiwara, M. Yokoyama, "Three-layered organic solar cell with a photoactive interlayer of codeposited pigments", *Appl. Phys. Lett.*, **58**, 1062-1064 (1991).
- 2) M. Hiramoto, M. Suezaki, M. Yokoyama, "Effect of thin gold interstitial-layer on the photovoltaic properties of tandem organic solar cell", *Chem. Lett.*, **1990**, 327-330 (1990).
- 3) M. Hiramoto, M. Kikuchi, S. Izawa, "Parts-per-Million-Level Doping Effects in Organic Semiconductor Films and Organic Single Crystals", *Adv. Mater.*, **30**, 1801236 (15 pages) (2018) (Invited Progress Report).
- 4) C. Ohashi, S. Izawa, M. Hiramoto et al., "Hall effect in bulk-doped organic single crystal", *Adv. Mater.*, **29**, 1605619 (2017).
- 5) N. Shintaku, M. Hiramoto, S. Izawa, "Effect of trap-assisted recombination on open-circuit voltage loss in phthalocyanine/fullerene solar cells", *Org. Electron.*, **55**, 69-74 (2018).

Organic solar cells have been intensively studied due to many advantages like flexible, printable, light, low-cost, fashionable, etc. In 1991, Hiramoto invented "blended junction" (Fig. 1)<sup>1)</sup> and "tandem junction"<sup>2)</sup> of organic solar cells, which are fundamental concepts in the present organic solar cells. We have been focused on the establishment of "bandgap science for organic solar cells."<sup>3)</sup> We believe that the following features are indispensable. (i) A ppm-level doping strategy should be applied to sub-ppm purified organic semiconductors for the complete removal of uncontrollable doping by oxygen from the air. (ii) Complete pn-control, i.e., the observation that every single and blended organic semiconductor shows both n- and p-type characteristics by impurity doping alone, should be achieved. (iii) Doping in the bulk of organic single crystals without grain boundaries is necessary for precise clarification of the nature of the doping effects.

Recently, we have succeeded the fabrication of ppm-level doped organic single crystals and measurements of their Hall effects using our original ultra-slow deposition technique at a rate of 10<sup>-9</sup> nm/s (Fig. 2)<sup>4)</sup>. This is a foundation for the first organic single crystal solar cells.

We fervently hope that young researchers will take up the challenge of working in the interdisciplinary field of organic solar cells to help develop the next generation of cells for renewable energy.




Fig. 1 Concept of blended junction.




Fig. 2 ppm-doped organic single crystal (AFM) formed by ultra-slow deposition of 10<sup>-9</sup> nm/s having a rotating shutter.



## ■分子機能研究部門 Molecular Functions

# 固体核磁気共鳴法による生体分子・分子材料の解析 Solid-State NMR for Molecular Science

西村 勝之(准教授)  
NISHIMURA, Katsuyuki

1994年兵庫県立姫路工業大学理学部(現・兵庫県立大学)卒業、1999年同大学大学院理学研究科博士課程終了、博士(理学)。米国立高磁場研究所、フロリダ州立大学博士研究員、横浜国立大学工学研究院助手を経て、2006年4月より現職。  
TEL: 0564-55-7415  
FAX: 0564-55-7415  
mail: nishimur@ims.ac.jp

1994 B.S. Himeji Institute of Technology  
1999 Ph.D. Himeji Institute of Technology

1999 Postdoctoral Fellow,  
Florida State University,  
National High Magnetic Field Laboratory  
2001 Assistant Professor,  
Yokohama National University  
2006 Associate Professor,  
Institute for Molecular Science

Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

〈Keywords〉

Solid State NMR,  
Biomolecules,  
Developments

核磁気共鳴法(NMR)は原子核の持つ磁気モーメントが磁場中で小さい磁石として振舞う性質を利用して、測定対象にラジオ波領域の電磁波を照射することにより非破壊で物質内部の分子の詳細な構造や運動性に関する原子分解能での情報を得ることができます。固体NMRは物理学者によってその基礎が築かれ、物理化学者によって化学的情報を得る手段として方法論が発展してきました。固体NMRは結晶や液晶から、粉末のようなアモルファス試料や粘性の高い液状試料まで非常に多様な物質に対して適用可能であり、特に生体分子への適用が注目されています。

当研究グループでは分子に関する様々な情報を得るための新規固体NMR測定法の開発を行っています。NMRで観測する内部相互作用には、静磁場に対する分子の相対角度を変化させる空間項の変調および、特定の強度、時間間隔でのラジオ波照射により核スピニ角運動量項への外部摂動を与えることが可能です。そのため、これらの外部摂動を適切に組み合わせる実験をデザインして特定の内部相互作用を選択的に消去、復活させることができます。それら内部相互作用の精密な観測、解析により原子間距離や角度情報等の分子の幾何情報を得ることが出来ます。さらに緩和時間やスペクトル線形解析から特定の時間領域の分子運動性を同定することが可能です。


これまで、分子の立体構造決定に有効な精密原子間距離測定法の原理的な問題の解析<sup>1)</sup>、低発熱型感度向上法<sup>2)</sup>、および角度測定法の開発<sup>3)</sup>を行いました。さらに脂質との相互作用により機能する膜タンパク質として、インフルエンザウイルスA由来の<sup>1</sup>Hチャンネル<sup>4)</sup>、膜表在性タンパク質fosfオリパーゼC-δ1脂質結合ドメインの機能発現機構解析<sup>5)</sup>、アルツハイマー病に関与するアミロイドβの脂質膜上で形成される会合体の構造解析<sup>6)</sup>などを行ってきました。さらに絹<sup>7)</sup>などの生体高分子材料、合成高分子複合体の構造解析<sup>8)</sup>など所内外の複数の研究機関と共同研究も行っています。

### 参考文献

- 1) K. Nishimura\*, A. Naito. "REDOR in Multiple Spin System", *Modern Magnetic Resonance*, Springer, The Netherlands (2006).
- 2) K. Nishimura\*, A. Naito, *Chem. Phys. Lett.* **380**, 569-576 (2003).
- 3) K. Nishimura\*, A. Naito, *Chem. Phys. Lett.* **402**, 245-250 (2005).
- 4) K. Nishimura, S. Kim, L. Zhang, T. A. Cross, *Biochemistry*. **41**, 13170-13177 (2002).
- 5) N. Uekama, T. Aoki, T. Maruoka, S. Kurisu, A. Hatakeyama,

In order to elucidate functions of molecules, characterizations of the molecules are essential. There are varieties of important molecules, which are insoluble to any solvents and functional at amorphous state. Solid-state NMR enables to obtain variety of information at atomic resolution without damages of molecules and significant restrictions. Thus, solid-state NMR is one of the essential tools for the characterizations of those molecules.

We have been working for methodology developments of solid-state NMR such as the analyses of error factors of precise distance measurements<sup>1)</sup>, the developments of techniques for sensitivity enhancement without sample heating<sup>2)</sup> and 2D correlation techniques to obtain orientational information of molecules<sup>3)</sup>. In addition, as studies for structural biology, we have been working for functional and structural characterizations of membrane proteins and peptides such as <sup>1</sup>H channel from influenza virus A<sup>4)</sup>, a peripheral membrane protein of phospholipase C-δ1 PH domain<sup>5)</sup>, and amyloid-β oligomers induced on lipid membranes<sup>6)</sup>. Furthermore, as studies for material science, we have been working for characterizations of variety of molecular materials such as silk<sup>7)</sup>, and supramolecules based on synthetic polymers<sup>8)</sup> through collaborations with several research groups.



Outline of our studies.

S. Yamaguchi, M. Okada, H. Yagisawa, K. Nishimura\*, S. Tuzi\*, *Biochim. Biophys. Acta* **1788**, 2575-2583 (2009).

6) M. Yagi-Utsumi, K. Kato, and K. Nishimura\*, *PlosONE* **11**, 0146405 (1-10) (2016).

7) T. Asakura, T. Ohota, S. Kometani, K. Okushita, K. Yazawa, Y. Nishiyama, K. Nishimura, A. Aoki, F. Suzuki, H. Kaji, A. Ulrich, M. Williamson, *Macromolecules* **48**, 28-36 (2015).

8) N. Ousaka, F. Mamiya, Y. Iwata, K. Nishimura, and E. Yashima, *Angew. Chem. Int. Ed.* **56**, 791-795 (2017).



## ■生体分子機能研究部門 Biomolecular Functions

# 生体分子機械の作動原理、設計原理の徹底的理解 Operational and Design Principles of Biological Molecular Machines

### 飯野 亮太(教授)

IINO, Ryota

1995年京都大学工学部卒、  
1997年京都大学大学院工学  
研究科修了、2000年名古屋大  
学大学院理学研究科単位取  
得退学、2003年博士(理学)。  
2000年～2005年科学技術振  
興機構研究员、2005年～2011  
年大阪大学産業科学研究所  
特任助手、助手、助教、2011年～  
2014年東京大学大学院工学研  
究科講師、准教授を経て2014年  
6月より現職。

mail: iino@ims.ac.jp

1995 B.E. Kyoto University

1997 M.E. Kyoto University

2003 Ph.D. Nagoya University

2000 Research Associate,  
Japan Science and  
Technology Cooperation

2002 Research Associate,  
Japan Science and  
Technology Agency

2005 Specially-appointed  
Assistant Professor,  
Osaka University

2006 Assistant Professor,  
Osaka University

2011 Lecturer, The University  
of Tokyo

2013 Associate Professor,  
The University of Tokyo

2014- Professor, Okazaki  
2018 Institute for Integrative  
Bioscience

2014 Professor, Institute for  
Molecular Science

Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies

#### 〈Keywords〉

Molecular Machines,  
Molecular Motors,  
Protein Engineering,  
Single-Molecule Analysis

生命活動は進化の過程で創られた分子機械が支えています<sup>1)</sup>。タンパク質できた生体分子機械は、2016年ノーベル化学賞で話題となった人工分子機械よりも遥かに優れた機能を発揮しますが、人工分子機械のように人間が自在に設計することはまだできていません。私たちは、個々の生体分子機械の動きや形を観る、天然にない生体分子機械を創る方法を開発する、といったアプローチで、その作動原理と設計原理を明らかにします。

**1. 生体分子機械に学ぶ:**私たちは生体分子機械の作動原理を解明します。生体分子機械の代表例は、入力エネルギーを一方向性の運動に変換する分子モーターです。私たちはリニア分子モーター<sup>2-8)</sup>や回転分子モーター<sup>9-11)</sup>を研究しています。例えば、バイオ燃料の原料となる結晶性多糖を分解するキチナーゼ<sup>3-5)</sup>、V-ATPase<sup>9-12)</sup>は一方向に運動するリニア分子モーターです。駆動力はATPではなくレールである多糖の分解のエネルギーで、ミオシン、キネシン等の従来のリニア分子モーターとは作動原理が全く異なります。また回転分子モーターV-ATPase<sup>9-12)</sup>、力学的回転を介してATPの化学エネルギーとイオンの電気化学ポテンシャルを相互変換することができます。これらは人工分子機械には達成できない高度な機能です。

**2. 生体分子機械を創る:**私たちは天然に存在しない新しい生体分子機械を創ることにチャレンジしています<sup>13),14)</sup>。生体分子機械には基本構造がよく似たものが存在します。AAA+ファミリーはその代表例です<sup>10)</sup>。網羅的変異体作製とロボットによる自動化<sup>13)</sup>、異種分子、人工分子とのハイブリッド化<sup>14)</sup>、計算科学による合理設計を駆使し、V-ATPase、キネシンなどを積極的に改造して多彩な機能を発揮する設計原理を理解します。

**3. 生体分子機械の機能を調べる、形を調べる:**私たちは1分子計測法を生体分子機械の機能解析に駆使します<sup>15-17)</sup>。プラズモニックナノプローブを用いた高速・高位置決定精度1分子計測の開発等を行っています。また、共同研究で、生体分子機械の形を調べる構造解析も行っています。

#### 参考文献


- 1) Iino R, et al., *Chem. Rev.* **120**: 1-4 (2020).
- 2) Nakamura A, et al., *J. Biol. Chem.* **295**: 14606-14617 (2020).
- 3) Nakamura A, et al., *Nat. Commun.* **9**: 3814 (2018).
- 4) Visootsat A, et al., *J. Biol. Chem.* **295**: 1915-1925 (2020).
- 5) Nakamura A, et al., *PCCP* **20**: 3010-3018 (2018).
- 6) Nakamura A, et al., *J. Biol. Chem.* **291**: 22404-22413 (2016).
- 7) Isojima H, Iino R, et al., *Nat. Chem. Biol.* **12**: 290-297 (2016).
- 8) Ando J, et al., *Sci. Rep.* **10**: 1080 (2020).
- 9) Tsunoda J, et al., *Sci. Rep.* **8**: 15632 (2018).
- 10) Iino R, et al., *Curr. Opin. Struct. Biol.* **31**: 49-56 (2015).
- 11) Ueno H, Minagawa Y, et al., *J. Biol. Chem.* **289**: 31212-31223 (2014).
- 12) Iida T, et al., *J. Biol. Chem.* **294**: 17017-17030 (2019).
- 13) Visootsat A, et al., *ACS Omega* **5**: 26807-26816 (2020).
- 14) Baba M, et al., *PNAS* **113**: 11214-11219 (2016).
- 15) Ando J, et al., *ACS Photonics* **6**: 2870-2883 (2019).
- 16) Ando J, et al., *Biophys. J.* **115**: 2413-2427 (2018).
- 17) Uchihashi T, et al., *Nat. Commun.* **9**: 2147 (2018).

Activity of life is supported by molecular machines made of proteins<sup>1)</sup>. Protein molecular machines are far superior to synthetic molecular machines in many aspects. We elucidate operation and design principles of protein molecular machines.

**1. Understand biomolecular machines:** Molecular motors are representative of the protein molecular machines. Molecular motors generate mechanical forces and torques driving unidirectional motions from the energy of chemical reaction or the potential energy. We are studying linear<sup>2-8)</sup> and rotary motors<sup>9-11)</sup>. Especially, we focus on new molecular motors such as chitinase<sup>3-5)</sup>, cellulase<sup>2,6)</sup> and V-ATPase.

**2. Engineer biomolecular machines:** Many biomolecular machines have similar structures, implying same evolutionary origin. AAA+ family is one of the representatives<sup>10)</sup>. To understand their design principles, we engineer protein molecular machines by using saturation mutagenesis, robot-based automation<sup>13)</sup>, hybridization<sup>14)</sup>, and computational design.

**3. Investigate functions and structures of biomolecular machines:** Our study is based on state-of-the-art single-molecule techniques<sup>15-17)</sup>. We are developing single-molecule methods such as high-speed and high-localization precision measurements with plasmonic nanoprobes. We also determine crystal structures of biomolecular machines by X-ray crystallography.



Protein molecular machines



## ■錯体触媒研究部門 Complex Catalysis

# 有機分子変換を駆動・制御する 新しい反応システムの構築 Development of Heterogeneous Catalysis toward Ideal Chemical Processes

## 魚住 泰広(教授)

UOZUMI, Yasuhiro

1984年北海道大学薬学部卒、

1990年博士(薬学)。日本学術

振興会特別研究員、北海道

大学教務職員、同助手、米国

コロンビア大学研究員、京都

大学講師、名古屋市立大学

教授を経て2000年より現職。

TEL: 0564-59-5571

FAX: 0564-59-5574

mail: uo@ims.ac.jp

1984 B.S. Hokkaido University

1990 Ph.D. Hokkaido University

1988 JSPS fellow

1988 Research Associate, Hokkaido University

1990 Assistant Professor, Hokkaido University

1994 Research Associate, Columbia University

1995 Lecturer, Kyoto University

1997 Professor, Nagoya City University

2000 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2002- Professor (adhoc), Kyoto University

2007- Research team leader.

2017 RIKEN

2010- Professor (adhoc), Tokyo Institute of Technology

2018- ACCEL Project Leader,

2019 RIKEN

2014- Distinguished Professor, Three George University

2003- Research Project Leader, JST CREST Project on Green Catalysis

2008- Research Project Leader, NEDO Project on Green Chemical Processes

2011- Deputy Research Project Leader, JST CREST Project on Element Strategy

2014- Research Project Leader, JST ACCEL Project on Hyper-Active Catalysis

## 〈Keywords〉

Transition Metal Catalysis,

Green Chemistry,

Organic Synthesis


人類が化学を体系づける遙か太古の昔から生命は精緻な化学分子変換を実現しています。それら生命化学反応は中性、常圧、常温、水中で高い選択性を伴って進行します。我々は理想的な化学反応システムの創出を目指し、生命化学工程を司る酵素の構造的模倣ではなく、化学反応の駆動原理、駆動システムを生命から学びとることを出発点としました。すなわち酵素はしばしば遷移金属活性中心を持ち、タンパクからなる疎水性ポケットの中で化学反応を駆動します。そこで我々は両親媒性高分子や両親媒性分子集合体が水中でこそ創りだす疎水性反応場を利用し、そこに遷移金属触媒(錯体触媒やナノ粒子触媒)を埋め込むことで完全水系媒体中での精密な有機分子変換工程を達成しています。中でも高分子マトリクス内への固定化と水中での触媒反応実施を前提に設計された独自の光学活性配位子-パラジウム錯体を導入した両親媒性高分子触媒は、アリル位置換反応やSuzuki反応において高い選択性を水中不均一条件下で実現しています。また高分子固定化白金ナノ触媒ではアルコール類の酸化反応が触媒的に水中で酸素ガスのみで実現されます。

有機分子は元来「油」であり水には馴染みません。水中で高分子触媒を用いて有機化学反応を実施すると、疎水性有機分子は自ずから高分子マトリクス内に入り込んで行き高濃度状態で触媒の近傍に集まり、高効率で触媒反応が駆動されます。すなわち外部からのエネルギーなどに依らず、分子が持つ性質そのものを駆動力とする反応システムです。

## 参考文献

- 1) Takao Osako, Kaoru Torii, Shuichi Hirata, Yasuhiro Uozumi "Chemoselective Continuous-Flow Hydrogenation of Aldehydes Catalyzed by Platinum Nanoparticles Dispersed in an Amphiphilic Resin" *ACS Catal.* **7**, 7371-7377 (2017).
- 2) Go Hamasaka, Tsubasa Muto, Yoshimichi Andoh, Kazushi Fujimoto, Kenichi Kato, Masaki Takata, Susumu Okazaki, Yasuhiro Uozumi "Detailed Structural Analysis of a Self-Assembled Vesicular Amphiphilic NCN-Pincer Palladium Complex by Wide-Angle X-Ray Scattering and Molecular Dynamics Calculations" *Chem. Eur. J.* **23**, 1291-1298 (2017).
- 3) Heeyoel Baek, Maki Minakawa, Yoichi M. A. Yamada, Jin Wook Han, Yasuhiro Uozumi "In-Water and Neat Batch and Continuous-Flow Direct Esterification and Transesterification by a Porous Polymeric Acid Catalyst" *Sci. Rep.* **6**, 25925 (2016).
- 4) Yoichi M. A. Yamada, Yoshinari Yuyama, Takuma Sato, Shigenori Fujikawa, Yasuhiro Uozumi "A Palladium-Nanoparticle and Silicon-Nanowire-Array Hybrid: A Platform for Catalytic Heterogeneous Reactions" *Angew. Chem. Int. Ed.* **53**, 127-131 (2014).
- 5) Yoichi M. A. Yamada, Shaheen M. Sarkar, Yasuhiro Uozumi "Amphiphilic Self-Assembled Polymeric Copper Catalyst to
- Parts per Million Levels: Click Chemistry," *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 9285-9290 (2012).
- 6) Yoichi M. A. Yamada, Shaheen M. Sarkar, Yasuhiro Uozumi, "Self-Assembled Poly(imidazole-palladium): Highly Active, Reusable Catalyst at Parts per Million to Parts per Billion Levels," *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 3190-3198 (2012).
- 7) Shaheen M. Sarkar, Yoichi M. A. Yamada, Yasuhiro Uozumi, "A highly Active and Reusable Self-Assembled Poly(Imidazole/Palladium) Catalyst: Allylic Arylation/Alkenylation," *Angew. Chem. Int. Ed.* **50**, 9437-9441 (2011).
- 8) Go Hamasaka, Tsubasa Muto, Yasuhiro Uozumi, "Molecular-Architecture-Based Administration of Catalysis in Water: Self-Assembly of an Amphiphilic Palladium Pincer Complex," *Angew. Chem. Int. Ed.* **50**, 4876-4878 (2011).
- 9) Yasuhiro Uozumi, Yutaka Matsuura, Takayasu Arakawa, Yoichi M. A. Yamada Asymmetric Suzuki-Miyaura Coupling in Water with a Chiral Palladium Catalyst Supported on an Amphiphilic Resin *Angew. Chem. Int. Ed.* **48**, 2708-2710 (2009).
- 10) Yoichi M. A. Yamada, Takayasu Arakawa, Heiko Hocke, Yasuhiro Uozumi, "A Nanoplatinum Catalyst for Aerobic Oxidation of Alcohols in Water," *Angew. Chem. Int. Ed.* **46**, 704-706 (2007).
- 11) Yasuhiro Uozumi, Yoichi M. A. Yamada, Tomohiko Beppu, Naoshi Fukuyama, Masaharu Ueno and Takehiko Kitamori, "Instantaneous Carbon-Carbon Bond Formation Using a Microchannel Reactor with a Catalytic Membrane," *J. Am. Chem. Soc.* **128**, 15994-15995 (2006).

Our research interests lie in the development of transition metal-catalyzed reaction systems toward ideal (highly efficient, selective, green, safe, simple, etc.) organic transformation processes. In one active area of investigation, we are developing the heterogeneous aquacatalytic systems. Various types of catalytic organic molecular transformations, e.g. carbon-carbon bond forming cross-coupling, carbon-heteroatom bond forming reaction, aerobic alcohol oxidation, etc., were achieved in water under heterogeneous conditions by using amphiphilic polymer-supported transition metal complexes and nanoparticles, where self-concentrating behavior of hydrophobic organic substrates inside the amphiphilic polymer matrix played a key role to realize high reaction performance in water.





木山 儀恵(准教授)  
MOMIYAMA, Norie

2000年名古屋大学工学部卒。  
2005年シカゴ大学大学院化学  
科博士課程修了Ph.D..米国  
ハーバード大学博士研究員  
(Damon Runyon Cancer  
Research Foundation Post  
Doctoral Research Fellow)、  
東北大学大学院理学研究科  
助手、助教を経て2014年6月  
より現職。

TEL: 0564-59-5531  
mail: momiyama@ims.ac.jp

2000 B.S. Nagoya University  
2005 Ph.D. The University of  
Chicago  
2005 Postdoctoral Fellow,  
Harvard University  
2006 Assistant Professor,  
Tohoku University  
2014 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science  
Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

〈Keywords〉

Organic Synthesis,  
Molecular Catalyst,  
Non-Covalent Interaction

■錯体触媒研究部門 Complex Catalysis

## キラル分子・キラル機能性物質の デザイン・合成・機能創出

Design, Synthesis, and Functionalization of Chiral Molecules

物質がその鏡像と重ね合わすことができない性質を「キラリティ」といい、そのような性質をもつ分子を“キラル分子”と呼びます。「キラリティ」は、様々な物質の性質を進展させる要素として知られています。物質にキラリティを組み込むことは、その機能の飛躍的な向上に繋がり、夢の物質を創り出す第一歩となります。私たちのグループでは、キラル機能性物質開発への応用展開を最終目標に、現在、その基盤づくりに取り組んでいます。独自のキラル分子をデザインし、その合成に向けて独自の合成手法を開発し、独自に合成したキラル分子の新たな機能の創出をめざして、日々研究を進めています。

私たちはこれまでに、複数の水素結合供与部位を有するキラル分子触媒の開発に成功しました。このキラル分子は、複数あるコンフォメーションのうち、ひとつの特有のコンフォメーションのみをとります。さらに、このキラル分子が、キラルな小分子を供給する分子性触媒として機能することを見出しました。この結果は、数千から数万の分子量を有する酵素の機能が、分子量が数百程度の人工キラル分子により簡単に実現できることを示唆しています。

私たちは、キラル分子をデザインし、開発した反応を駆使して、新たな可能性を秘めたキラル分子の創成に挑戦しています。様々な解析手法を用いて、合成した分子の未知の振る舞いを解明し、分子に特有の性質を見出すことで、新たな機能を有するキラル物質を創り出していきたいと考えています。


参考文献

- 1) C. Jongwohan, Y. Honda, T. Suzuki, T. Fujinami, K. Adachi, N. Momiyama, "Brønsted Acid-Initiated Formal [1,3]-Rearrangement Dictated by  $\beta$ -Substituted Ene-Aldimines" *Org. Lett.* **21**, 4991-4995 (2019).
- 2) N. Momiyama, H. Tabuse, H. Noda, M. Yamanaka, T. Fujinami, K. Yamanishi, A. Izumiseki, K. Funayama, F. Egawa, S. Okada, H. Adachi, M. Terada, "Molecular Design of a Chiral Brønsted Acid with Two Different Acidic Sites: Regio-, Diastereo-, and Enantioselective Hetero-Diels-Alder Reaction of Azopyridinecarboxylate with Amidodienes Catalyzed by Chiral Carboxylic Acid-Monophosphoric Acid" *J. Am. Chem. Soc.* **138**, 11353-11359 (2016).
- 3) N. Momiyama, H. Okamoto, J. Kikuchi, T. Korenaga, M. Terada, "Perfluorinated Aryls in the Design of Chiral Brønsted Acid Catalysts: Catalysis of Enantioselective [4+2] Cycloadditions and Ene-Reactions of Imines with Alkenes by Chiral Mono-Phosphoric Acids with Perfluoroaryls" *ACS Catal.* **6**, 1198-1204 (2016).
- 4) N. Momiyama, K. Funayama, H. Noda, M. Yamanaka, N. Akasaka, S. Ishida, T. Iwamoto, M. Terada, "Hydrogen

"Chirality" is a special property that a substance cannot be superimposed with its mirror image, and a molecule with such a property is called "chiral molecule." "Chirality" is known as a factor that advances the properties of various substances. Incorporating chirality into substances leads to a dramatic improvement in their function and is the first step to create dream substances. We are working on creating the fundamental research with the ultimate goal of application to the development of chiral functional materials. We are designing our own chiral molecule, developing our own synthetic method toward its synthesis, and aiming at creating new functions of uniquely synthesized chiral molecules.

We have successfully developed a chiral molecular catalyst with multiple hydrogen bond donor sites. This chiral molecule takes only one specific conformation out of multiple conformations. In addition, we found that this chiral molecule functions as a molecular catalyst to supply chiral small molecules. This result suggests that the function of enzymes with molecular weights of several thousands to tens of thousands can be easily realized by artificial chiral molecules with molecular weights of several hundreds.

We believe that our challenges create chiral molecules, which have new possibilities by designing chiral molecules and making use of the developed reactions. We are planning to elucidate the unknown behavior of synthesized molecules by using various analytical methods and to create chiral substances with new functions by finding properties peculiar to molecules.



X-ray structure of our recent development

Bonds-Enabled Design of a *C*<sub>1</sub>-Symmetric Chiral Brønsted Acid Catalyst" *ACS Catal.* **6**, 949-956 (2016).

5) N. Momiyama, T. Narumi, M. Terada, "Design of a Brønsted Acid with Two Different Acidic Sites: Synthesis and Application of Aryl Phosphinic Acid-Phosphoric Acid as a Brønsted Acid Catalyst" *Chem. Commun.* **51**, 16976-16979 (2015).

6) N. Momiyama, T. Konno, Y. Furiya, T. Iwamoto, M. Terada, "Design of Chiral Bis-phosphoric Acid Catalyst Derived from (*R*)-3,3'-Di(2-hydroxy-3-arylphenyl) binaphthol: Catalytic Enantioselective Diels-Alder Reaction of  $\alpha,\beta$ -Unsaturated Aldehydes with Amidodienes" *J. Am. Chem. Soc.* **133**, 19294-19297 (2011).



■錯体物性研究部門 Functional Coordination Chemistry

## 開殻電子系分子を基に 新しい光・電子・磁気物性を開拓する

Creation of Novel Photonic-Electronic-Magnetic Functions  
Based on Molecules with Open-Shell Electronic Structures

草本 哲郎(准教授)

KUSAMOTO, Tetsuro

2003年東京大学理学部卒、  
2010年東京大学大学院理学  
系研究科博士後期課程修了、  
博士(理学)。ソニー株式会社、  
日本学術振興会特別研究員  
(DC1)、理化学研究所特別  
研究員および基礎科学特別  
研究員、東京大学大学院理  
学系研究科特任助教、東京  
大学大学院理学系研究科  
助教を経て現職。

mail: kusamoto@ims.ac.jp

2003 B.S. The University of  
Tokyo

2010 Ph.D. The University of  
Tokyo

2005 Sony Corporation

2010 Postdoctoral Fellow,  
RIKEN

2012 Project Assistant  
Professor, The University  
of Tokyo

2013 Assistant Professor,  
The University of Tokyo

2019 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

〈Keywords〉

Radical

Open-Shell Electronic States

Photonic-Electronic-  
Magnetic Properties

水(H<sub>2</sub>O)や窒素(N<sub>2</sub>)、ベンゼン(C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)に代表されるように、一般的な分子は偶数個の電子を持ち、閉殻電子構造を有しています。一方でラジカルと呼ばれる奇数個の電子を有する分子は開殻電子構造を有し、超伝導体になつたり磁石になつたりと、閉殻電子構造では実現が困難な化学的・物理的性質を発現します。私たちの研究グループでは、ラジカルや有機-無機複合物質である金属錯体など開殻電子構造を有する新しい分子性物質を合成し、これまでにないユニークな機能を創出することを目指し、研究を進めています。

私たちはラジカルが示す発光特性に着目しています。発光性の分子が有機EL等の高性能発光デバイスの鍵物質として盛んに研究されている一方で、ラジカルは発光しない物質として考えられ、その発光特性は未開拓研究分野となっていました。この未開拓領域を切り拓くべく、私たちは分子の構造を適切にデザインし、高い化学安定性を有する発光性ラジカルPyBTMを開発しました。PyBTMを基として新しい発光性ラジカルや発光性開殻金属錯体を様々に合成し、「開殻電子系ならではの電子の振舞いが、どのような新しい光特性を生み出すのか?」を調べています。最近では、ラジカルの発光色が磁場によって大きく変化することを世界で初めて発見しました。これらの研究成果は、基礎科学の発展のみならず、例えば発光デバイスを省エネ化するための新方法の提案など、応用科学の発展にも貢献しています。

その他、開殻電子系錯体を一次元的・二次元的に規則的配列させた結晶を作製し、結晶中を動き回る電子、あるいは動き回りたいのに動けなくてうずうずしている電子が示す電気・磁気特性を調べています。結晶という小さな粒の中からこれまで誰も考えもしなかったような壮大な科学が生まれることを夢見て、日々研究を進めています。

### 参考文献


- 1) T. Kusamoto, C. Ohde, S. Sugiura, S. Yamashita, R. Matsuoka, T. Terashima, Y. Nakazawa, H. Nishihara, S. Uji, "An Organic Quantum Spin Liquid with Triangular Lattice: Spinon Fermi Surface and Scaling Behavior" *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **95**, 306-313 (2022).
- 2) S. Kimura, M. Uejima, W. Ota, T. Sato, S. Kusaka, R. Matsuda, H. Nishihara, and T. Kusamoto "An Open-shell, Luminescent, Two-Dimensional Coordination Polymer with a Honeycomb Lattice and Triangular Organic Radical" *J. Am. Chem. Soc.* **143**, 4329-4338 (2021).
- 3) S. Kimura, T. Kusamoto, S. Kimura, K. Kato, Y. Teki, and H. Nishihara "Magnetoluminescence in a Photostable, Brightly Luminescent Organic Radical in a Rigid Environment" *Angew. Chem. Int. Ed.* **57**, 12711-12715 (2018).

The molecules with open-shell electronic states can exhibit unique properties, which are difficult to achieve for conventional closed-shell molecules. Our group develops new open-shell organic molecules (= radicals) and metal complexes to create novel photonic-electronic-magnetic functions.

While conventional closed-shell luminescent molecules have been extensively studied as promising components for organic light-emitting devices, the luminescent properties of radicals have been much less studied because of its rarity and low chemical (photo-)stability. We have developed a novel luminescent organic radical PyBTM, which is highly stable at ambient condition and in the photoexcited state. We have also discovered that (i) PyBTM-doped molecular crystals exhibit photoluminescence with a room-temperature emission quantum yield of 89%, which is exceptionally high in radicals, and (ii) the doped crystals show drastic changes in the emission spectra by applying a magnetic field. This is the first observation of the magnetoluminescence in organic radicals. Our studies provide novel and unique insights in molecular photonics, electronics, and spintronics, and also contribute to developing applied science for light-emitting devices.

Our group focuses on frustrated spins in molecular crystals. The anisotropic assembly of open-shell molecules in crystalline states can afford unusual electronic states attributed to the frustrated spins, providing exotic electrical and magnetic properties.

- (a) Molecular structure of PyBTM and its characteristics.
- (b) Schematic photoexcitation-emission processes.
- (c) Emission in CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.
- (d) Emission of PyBTM-doped molecular crystals.
- (e) Controlling emission by magnetic field.



- 4) Y. Hattori, T. Kusamoto, and H. Nishihara "Luminescence, Stability, and Proton Response of an Open-Shell (3,5-Dichloro-4-pyridyl)bis(2,4,6-trichlorophenyl)methyl Radical" *Angew. Chem. Int. Ed.* **53**, 11845-11848 (2014).



## 3次元空間をデザインする有機合成化学 Design and Synthesis of Three-dimensional Organic Structures

瀬川 泰知(准教授)  
SEGAWA Yasutomo

2005年東京大学工学部化学生命工学科卒、2007年東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻修士課程修了、2009年東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻博士課程修了、博士(工学)。2008年～2009年日本学術振興会特別研究員(DC1)、2009年～2013年名古屋大学物質科学国際研究センター助教、2013年～2020年名古屋大学大学院理学研究科特任准教授およびJST ERATO伊丹分子ナノカーボンプロジェクトグループリーダー・研究総括補佐を経て、2020年4月より現職。

TEL: 0564-59-5587  
mail: segawa\_at\_ims.ac.jp

2005 B.S. The University of Tokyo

2009 Ph.D. The University of Tokyo

2009 Associate Professor, Nagoya University

2013 Designated Associate Professor, Nagoya University

Group Leader and Project Coordinator, JST ERATO Itami Molecular Nanocarbon Project

2020 Associate Professor, Institute for Molecular Science

Associate Professor, The Graduate University for Advanced Studies

### 〈Keywords〉


π-Conjugated Molecules,  
Molecular Topology,  
3D Network Polymer

芳香族化合物は、その構造によって多彩な電子的性質をもちます。有機合成化学の発展とともに、デザインして精密に合成できる分子の種類が増えている一方で、芳香族化合物はそれだけでは機能を十分に発揮することはできず、3次元的に集合することで半導体などの材料として利用できます。しかし集積様式は分子の形のわずかな違いに左右されるために予測が難しく、特に結晶状態を精密にデザインすることは未だ困難です。


当研究グループでは、トポロジーや空間対称性といった幾何学的手法を積極的に取り入れることによって、従来の有機合成化学では実現困難だった「3次元空間を駆使する有機合成化学」に挑戦します。具体的には以下の研究を行います。

- ・3次元幾何構造をもつ有機共有結合結晶の合成と機能解明
- ・分子の概念を拡張する新たな分子トポロジーの確立
- ・電子回折結晶構造解析の有機機能性材料開発への活用
- 「パズルのように分子を作る」の理念のもとに、従来の有機合成化学の限界を超えた物質創製に取り組んでいきます。

Aromatic compounds are potentially useful as functional electronic materials. However, the design and control of three-dimensional molecular assembly are still very difficult, especially for the crystal engineering of organic molecules. This group aims to create novel topological and reticular organic structures by using synthetic organic chemistry and geometric insight. To achieve our purpose, this group will start electron-diffraction crystallography (MicroED) for the rapid structure determination of three-dimensional covalent organic frameworks.



- 1) Design and synthesis of  $\pi$ -conjugated organic molecules
  - 2) Development of novel molecular topology
  - 3) Construction of 3D network polymers
- 1) Knot" *Science*, **365**, 272-276 (2019).
- 6) Yasutomo Segawa, David R. Levine, and Kenichiro Itami, "Topologically Unique Molecular Nanocarbons" *Acc. Chem. Res.*, **10**, 2760-2767 (2019).
- 7) Guillaume Povie, Yasutomo Segawa, Taishi Nishihara, Yuhei Miyachi, and Kenichiro Itami "Synthesis and Size-Dependent Properties of [12], [16], and [24]Carbon Nanobelts" *J. Am. Chem. Soc.*, **140**, 10054–10059 (2018).
- 8) Tetsushi Yoshidomi, Tomohiro Fukushima, Kenichiro Itami, and Yasutomo Segawa, "Synthesis, Structure, and Electrochemical Property of a Bimetallic Bis-2-pyridylidene Palladium Acetate Complex" *Chem. Lett.*, **46**, 587–590 (2017).
- 9) Guillaume Povie, Yasutomo Segawa, Taishi Nishihara, Yuhei Miyachi, and Kenichiro Itami, "Synthesis of a Carbon Nanobelt" *Science*, **356**, 172–175 (2017).
- 10) Yasutomo Segawa and Douglas W. Stephan, "Metal-free Hydrogenation Catalysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons" *Chem. Commun.*, **48**, 11963–11965 (2012).
- 11) Yasutomo Segawa, Makoto Yamashita, and Kyoko Nozaki, "Boryllithium: Isolation, Characterization, and Reactivity as a Boryl Anion" *Science*, **314**, 113–115 (2006).



## 新規な機能を有する金属タンパク質の構造と機能 Bioinorganic Chemistry of Metalloproteins Responsible for Signal Transduction

### 青野 重利(教授)

AONO, Shigetoshi

1982年東京工業大学工学部卒、1987年同大学大学院理工学研究科博士課程修了、博士(工学)。日本学術振興会特別研究員、ジョージア大学博士研究員、東京工業大学助手、北陸先端科学技術大学院大学助教授を経て2002年5月より現職。

TEL: 0564-59-5575  
FAX: 0564-59-5576  
mail: aono@ims.ac.jp

1982 B.S. Tokyo Institute of Technology  
1987 Ph.D. Tokyo Institute of Technology

1988 Postdoctoral Fellow, University of Georgia

1989 Assistant Professor, Tokyo Institute of Technology

1994 Assistant Professor, Japan Advanced Institute of Science and Technology

2002 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, Okazaki Institute for Integrative Bioscience (-2018.3)

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2018 Professor, Exploratory Research Center on Life and Living Systems

#### 〈Keywords〉

Bioinorganic Chemistry,  
Metalloproteins,  
Sensor Protein

遷移金属イオンや遷移金属含有補欠分子族を活性中心とする金属タンパク質は、生物の物質代謝やエネルギー代謝において中心的な役割を果たしているのみならず、細胞内情報伝達にも深く関わっていることが知られています。生物は様々な外部環境変化に対応し、生体内の恒常性を維持するための精緻なシステムを有しています。このようなシステムは、外部環境の変化を感じるためのセンシングシステムと、感知した情報に対応して細胞内の恒常性維持に必要な応答反応に関与するレスポンスレギューターシステムから構成されています。このようなシステムの中には、遷移金属イオンが関与しているシステムも多く存在しています。代表的な例として、酸素、一酸化炭素、一酸化窒素等の気体分子のような、単純タンパク質では応答不可能なシグナルに対する応答システムがあります。これらのシステムでは、分子中に遷移金属イオンを含む金属タンパク質がセンサー分子として機能することにより、遺伝子発現、走化性制御、セカンドメッセンジャー分子の合成・分解を介した代謝制御などの様々な生理機能制御に関与しています。また、遷移金属イオンそのものがシグナル分子として機能することにより、生理機能制御に必須な遷移金属イオンの細胞内濃度を適正に維持するために必要な分子マシンリー(金属イオン取り込み・排出システム、細胞内金属輸送システム等)の発現制御、金属タンパク質の生合成制御など、様々な生理機能が制御されています。


我々は、構造生物学、遺伝子工学、分子生物学、および各種分光学的な実験手法を駆使することにより、シグナルセンシングやシグナル伝達に関与する新規な金属タンパク質の構造機能相関解明、および細胞内遷移金属イオンの恒常性維持の分子機構解明を目的として研究を進めています。

#### 参考文献

- 1) "Heme controls the structural rearrangement of its sensor protein mediating bacterial survival", M. Nishinaga, H. Sugimoto, Y. Nishitani, S. Nagai, S. Nagatoishi, N. Muraki, T. Toshia, K. Tsumoto, Sh. Aono, Y. Shiro, and Hitomi Sawai, *Commun. Biol.* 2021, **4**, 467 (12 pages) (2021).
- 2) "Structural characterization of thermoglobin from a hyperthermophilic bacterium *Aquifex aeolicus*", N. Muraki, K. Takeda, D. Nam, M. Muraki, and S. Aono, *Chem. Lett.* 2021, **50**, 603-606 (2021).
- 3) "Structural basis for heme transfer reaction in heme uptake machinery from *Corynebacteria*" N. Muraki, C. K., Y. Okamoto, T. Uchida, K. Ishimori, and S. Aono, *Chem. Commun.* **55**, 13864-13867 (2019).
- 4) "Structural characterization of HypX responsible for CO biosynthesis in the maturation of NiFe-hydrogenase" N. Muraki, K. Ishii, S. Uchiyama, S. G. Itoh, H. Okumura, and S. Aono, *Commun. Biol.* **2**, 385 (2019).
- 5) "Protein Dynamics of the Sensor Protein HemAT as Probed by Time-Resolved Step-Scan FTIR Spectroscopy," A. Pavlou, H. Yoshimura, S. Aono, E. Pinakoulaki, *Biophys. J.* **114**, 584-591 (2018).
- 6) "Probing the role of the heme distal and proximal environment in ligand dynamics in the signal transducer protein HemAT by time-resolved step-scan FTIR and resonance Raman spectroscopy," A. Pavlou, A. Loullis, H. Yoshimura, S. Aono, E. Pinakoulaki, *Biochemistry*, **56**, 5309-5317 (2017).

Transition metal ions and metalloproteins play crucial roles in signal transduction processes in addition to their traditional roles in energy and substance metabolisms. Many responses to metals occur transcriptionally or post-transcriptionally. The metal-responsive transcription factors control the expression of genes encoding proteins responsible for metal homeostasis in cells including metal ions uptake/efflux, intracellular metal trafficking, and biogenesis of metalloproteins. Metal-responsive signal transduction pathways emanating from metal sensing at the cell membrane are also responsible for biological regulation in response to metals. Metal-based sensor proteins are utilized to sense external signals that cannot be sensed by simple sensor proteins without any prosthetic group, in which transition metal ions or metal-containing prosthetic groups act as the active center of signal sensing.

My research interests are focused on the elucidation of the structural and functional relationships for metal-dependent proteins working in biological signal-transduction systems including metal-based sensor proteins, transition metal ion-sensing transcriptional regulators, and protein machineries responsible for metal ions homeostasis in both prokaryotes and eukaryotes.



X-ray structure of HypX that catalyzes CO biosynthesis for the assembly of the active site in NiFe-hydrogenase. CoA, which is shown in a stick model, is bound in the cavity (gray mesh in (a)). There are two open window (A and B in (b)) on the protein surface.



## 加藤 晃一(教授)

KATO, Koichi

1986年東京大学薬学部卒。  
1991年同大学院薬学系研究科博士課程修了、博士(薬学)。東京大学助手・講師、名古屋市立大学大学院薬学研究科教授を経て2008年4月より現職。  
TEL: 0564-59-5225  
FAX: 0564-59-5225  
mail: kkato@ims.ac.jp

1986 B.S. The University of Tokyo  
1991 Ph.D. The University of Tokyo  
1991 Assistant Professor, The University of Tokyo  
1997 Lecturer, The University of Tokyo  
2000 Professor, Nagoya City University  
2008 Professor, Okazaki Institute for Integrative Bioscience (-2018.3)  
Professor, Institute for Molecular Science  
Professor, The Graduate University for Advanced Studies  
2013- Project Leader, JSPS Grant in Aid for Scientific Research on Innovative Areas "Dynamical ordering of biomolecular systems for creation of integrated functions" (-2018)  
2018- Professor, Exploratory Research Center on Life and Living Systems

Director, Exploratory Research Center on Life and Living Systems (-2022.3)

〈Keywords〉

Biomolecule,

Dynamical Ordering,

NMR

■生体分子機能研究部門 Biomolecular Functions

# 生命分子システムの動的秩序形成と高次機能発現の仕組みの探究


Dynamical Ordering of Biomolecular Systems for Creation of Integrated Functions

生命現象の特質は、システムを構成する多数の分子素子がダイナミックな離合集散を通じて秩序構造を形成し、外的環境との相互作用を行いつつ、自律的に時間発展していくことがあります。前世紀末期に勃興したオミクスアプローチは生命体を構成する分子素子に関する情報の網羅的集積を実現しました。しかしながら、それらの生命素子が自律的に柔軟かつロバストな高次秩序を形成するメカニズムを理解することは、これから生命科学の重要な課題です。私たちは、生物学・化学・物理学の分野横断的な研究を通じて、内的複雑性を秘めた生命分子素子が動的な秩序を形成して高次機能を発現する仕組みを分子科学の観点から解き明かすことを目指しています。

さらに、生命分子システムのデザインルールを取り入れた人工自己組織化システムの創生に資することを目的とした研究も行っています。生命超分子集合体は、外部環境の変動や超分子集合体間のコミュニケーションを通じて時空間的発展を遂げています。生命分子システムの有するこうした特徴の本質を深く理解し、それを積極的に人工超分子系の設計に取り入れることは、分子科学におけるパラダイムシフトをもたらすものと考えています。

Living systems are characterized as dynamic processes of assembly and disassembly of various biomolecules that are self-organized, interacting with the external environment. The omics-based approaches developed in recent decades have provided comprehensive information regarding biomolecules as parts of living organisms. However, fundamental questions still remain unsolved as to how these biomolecules are ordered autonomously to form flexible and robust systems. Biomolecules with complicated, flexible structures are selforganized through weak interactions giving rise to supramolecular complexes that adopt their own dynamic, asymmetric architectures. These processes are coupled with expression of integrated functions in the biomolecular systems.


Toward an integrative understanding of the principles behind the biomolecular ordering processes, we conduct multidisciplinary approaches based on detailed analyses of dynamic structures and interactions of biomolecules at atomic level, in conjunction with the methodologies of molecular and cellular biology along with synthetic and computational technique.



Formation of supramolecular machinery through dynamic assembly and disassembly of biomolecules

## 参考文献

- 1) Yagi, H., Yanaka, S. and Kato, K., "Structural and functional roles of the N-glycans in therapeutic antibodies," *Comprehensive Glycoscience, 2nd edition (J. Barchi ed.)*, Elsevier (Oxford), vol.5, pp.534-542 (2021).
- 2) Yanaka, S., Yogo, R. and Kato, K., "Biophysical characterization of dynamic structures of immunoglobulin G," *Biophys. Rev.*, **12**, 637-645 (2020).
- 3) Yagi, H., Yanaka, S. and Kato, K., "Structure and dynamics of immunoglobulin G glycoproteins," *Glycobiophysics (Y. Yamaguchi and K. Kato ed.)*, Springer Nature Singapore, pp.219-235 (2018).
- 4) Satoh, T. and Kato, K., "Structural aspects of ER glycoprotein quality-control system mediated by glucose tagging," *Glycobiophysics (Y. Yamaguchi and K. Kato ed.)*, Springer Nature Singapore, pp.149-169 (2018).
- 5) Kato, K., Yagi, H. and Yamaguchi, T., "NMR characterization of the dynamic conformations of oligosaccharides," *Modern Magnetic Resonance, 2nd Edition (G.A. Webb ed.)*, Springer International Publishing, pp.737-754 (2018).
- 6) Kato, K. and Satoh, T., "Structural insights on the dynamics of proteasome formation," *Biophys. Rev.*, **10**, 597-604 (2018).



## 生命のリズムを化学する Biological Rhythm & Dynamics, through Chemistry

### 秋山 修志(教授)

AKIYAMA, Shuji

1997年京都大学工学部卒、  
1999年京都大学大学院工学  
研究科修士課程修了、2002年  
京都大学大学院工学研究科  
分子工学専攻博士課程修了、  
博士(工学)。日本学術振興  
会特別研究員、理化学研究所  
基礎科学特別研究員、科学  
技術振興機構さきかけ「生命  
現象と計測分析」研究員(専  
任)、名古屋大学大学院理学  
研究科講師／准教授を経て  
2012年4月より現職。2013年4  
月より協奏分子システム研究  
センター長。

TEL/FAX: 0564-55-7363  
mail: akiyamas@ims.ac.jp

1997 B. Tech. Kyoto Univ  
1999 M. Tech. Kyoto Univ  
2002 Ph.D. Kyoto Univ  
2001 JSPS Research Fellow  
2002 JSPS Postdoctoral  
Research Fellow  
2003 RIKEN Special  
Postdoctoral Researcher  
2005 PRESTO Researcher of JST  
2008 Junior Associate  
Professor, Nagoya  
University  
2011 Associate Professor,  
Nagoya University  
2012 Professor, Institute for  
Molecular Science  
Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies

Professor, The Graduate  
University for Advanced  
Studies  
2013 Director, Research  
Center of Integrative  
Molecular Systems  
  
〈Keywords〉  
Circadian Clock,  
Cyanobacteria,  
Temperature Compensation

「概日(体内)時計」という言葉を意識するのはどうのようなときでしょうか。渡航や帰国後に頻発する眠気、だるさ、夜間の覚醒…、これら時差ボケの症状は、我々が生物時計の奏でる24時間周期のリズムのもとで生活していることの証です。私たちの研究グループでは——生命が地球の自転周期(24時間)をどのようにしてその内に取り込んだのか——それを分子科学的に解明するという壮大な研究テーマに挑戦しています。

シアノバクテリアの生物時計は、3種の時計タンパク質(KaiA, KaiB, KaiC)とATPを混ぜ合わせることで試験管内に再構成され(Kaiタンパク質時計)、24時間を正確に刻むことができます。一方、時を刻む仕組みの分子科学的的理解は進んでいません<sup>1)</sup>。その一つは「安定した遅さ」の根源で、既存概念の積み上げでは、タンパク質分子という素材で24時間という「遅いダイナミクス」が実現されている理由を説明できません。もう一つの謎が周期の温度補償性です。これは生物時計に普遍的に見いだされる特徴で、時計の発振周期が温度の影響をほとんど受けません。遅い反応は大きな活性化エネルギーを有し、温度の上昇に従って著しく加速されるのが一般的です。生物時計のからくりに迫るためにには、「遅いダイナミクス」と「温度補償性」という一見排他的な2つの性質を同時に説明しなければならないのです<sup>1)</sup>。


私たちの研究グループでは、Kaiタンパク質時計の生化学的な活性測定<sup>2)-5)</sup>はもとより、X線結晶構造解析<sup>2)-4)</sup>や溶液散乱<sup>5)</sup>を相補的に利用した動的構造解析、蛍光等による分子動態計測や同調実験、計算機を用いた実験データのシミュレーション<sup>4)</sup>などを行うことで、分子時計の実態解明に取り組んでいます。このような研究活動を通じて、多くの皆さんに生物、化学、物理、制御工学、計算科学を巻き込んだタンパク質時計研究のフロンティアを体験して頂ければと思います。

#### 参考文献

- 1) S. Akiyama, "Structural and dynamic aspects of protein clocks: How can they be so slow and stable?" *CMLS* **69**, 2147-2160 (2012).
- 2) Y. Furuike et al., "Regulation Mechanisms of the Dual ATPase in KaiC" *PNAS* **119**, e2119627119 (2022).
- 3) Y. Furuike et al., "Elucidation of Master Allostery Essential for Circadian Clock Oscillation in Cyanobacteria" *Sci. Adv.* **8**, eabm8990 (2022).
- 4) J. Abe et al., "Atomic-scale Origins of Slowness in the Cyanobacterial Circadian Clock" *Science* **349**, 312-316 (2015).
- 5) Y. Furuike et al., "Cross-scale Analysis of Temperature Compensation in the Cyanobacterial Circadian Clock System" *Commun. Phys.* **5**, 75 (2022).

Circadian (approximately 24 h) clocks are endogenous time-keeping systems encapsulated in living cells, enabling organisms to adapt to daily fluctuation of exogenous environments on the Earth. These time-keeping systems, found ubiquitously from prokaryotes to eukaryotes, share the three characteristics. First, the circadian rhythmicity of the clocks persists even without any external cues (self-sustainability). Second, the period is little dependent on ambient temperature (temperature compensation). Third, the phase of the clock can be reset by external stimuli such as lightning, humidity, or temperature so as to be synchronized to the external phase (synchronization).

KaiC, a core protein of the circadian clock in cyanobacteria, undergoes rhythmic structural changes over approximately 24 h in the presence of KaiA and KaiB (Kai oscillator). This slow dynamics spanning a wide range of both temporal and spatial scales is not well understood, and is central to a fundamental question: What determines the temperature-compensated 24 h period?<sup>1)</sup> The Kai oscillator reconstitutable *in vitro* is advantageous for studying its dynamic structure through a complementary usage of both X-ray crystallography<sup>2)-4)</sup> and solution scattering<sup>5)</sup>, its transient response and synchronization by using physicochemical techniques, and its molecular motion through a collaborative work with computational groups<sup>4)</sup>. Our mission is to explore the frontier in molecular science of the cyanobacterial circadian clock from many perspectives.



#### Three Major Characteristics

1. Self-sustained 24 hour oscillation  
自律的に約24時間の周期での振動
2. Constant period (24 h) over wide range of temperature (Temperature Compensation)  
周期が温度に依存しない (温度補償性)
3. Synchronization (jet lag)  
同調能 (位相調節、時差ボケ)

One of the major goals is to provide a model that simultaneously explains above three characteristics.

生物時計の研究における究極的目標とは、上記3つの特性を余すことなく説明するモデルを構築することである。

Towards a Unified View of Temperature-compensated 24 h Period in Biological Clock System.



## 倉持 光(准教授)

KURAMOCHI, Hikaru

2007年東京工業大学理学部卒、2013年東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻博士課程修了、博士(理学)。理化学研究所基礎科学特別研究員、理化学研究所光量子工学研究領域研究員、科学技術振興機構さきがけ研究員を経て2020年4月より現職。

TEL: 0564-55-7419

mail: hkuramochi@ims.ac.jp

2007 B.S. Tokyo Institute of Technology

2013 Ph.D. Tokyo Institute of Technology

2013 Special Postdoctoral Researcher, RIKEN

2016 Research Scientist, RIKEN

2017 PRESTO Researcher, 2021 Japan Science and Technology Agency

2020 Associate Professor, Institute for Molecular Science

Associate Professor, The Graduate University for Advanced Study

### 〈Keywords〉

Ultrafast Spectroscopy,  
Chemical Reaction Dynamics,

Ultrashort Pulse Generation  
and Control

## ■階層分子システム解析研究部門 Trans-Hierarchical Molecular Systems

# 先端的レーザー分光法による 凝縮相分子の機能・構造・ダイナミクスの探究

Elucidation of Function, Structure, and Dynamics of Condensed-Phase Molecular Systems by Advanced Ultrafast Laser Spectroscopy

化学反応は反応座標を横軸とするエネルギーダイアグラムなど、単純化されたモデルを用いてしばしば記述されます。しかし、実際の反応は多次元的なポテンシャルエネルギー曲面上を分子が縦横無尽に駆け巡ることで進むため、その詳細は複雑を極めます。こうした多次元ポテンシャルエネルギー曲面上において分子がどのように振る舞いどのようにして反応生成物に至るのか、その一部始終を明らかにすることは化学反応を理解する本質であり、強く望まれています。特に生体分子を始めとする巨大な自由度を持つ機能性複雑分子に対しこれを実現することは新規材料の創成に向けた重要な知見をも与えることから、現代化学における最重要課題の一つです。

これに対し、私たちは最先端の光技術に基づいた新しい分光計測手法を開発・駆使することで凝縮相分子の反応ダイナミクスの観測とその解明に取り組んでいます。特に、サブ10フェムト秒(1フェムト秒 =  $10^{-15}$ 秒)クラスの極短パルスレーザー光を用いる独自の超高速分光法・非線形分光法により反応に伴った分子の電子状態や構造の変化を極限的な時間分解能で時々刻々と追跡し、複雑分子系の反応性や機能発現を決定づけるその精緻な分子機構を明らかにすることを目的としています。また、こうした極限分光計測を單一分子レベルで実現することにより、分子1つ1つに固有かつ多様な反応性とその起源を解き明かすことにも取り組んでいます。このように、私たちは独自の方法論に基づいて分子の反応をあたかも手に取り目で見たかのように理解することで、化学反応の研究に新たな道を開くことを目指しています。

Chemical reactions of polyatomic molecular systems proceed on complex potential energy surfaces (PESs) having a vast degree of freedom of nuclear coordinates. For understanding and manipulating molecular mechanisms underlying the chemical reactions, it is desirable to map out the PESs and visualize how the molecules evolve thereon, from the reactant all the way down to the product. To achieve this holy grail in chemistry, we develop advanced ultrafast spectroscopic techniques based on state-of-the-art optical technology and study the chemical reaction dynamics of the condensed-phase molecules. In particular, we exploit ultrafast nonlinear spectroscopy based on sub-10-fs pulses and track the change of the electronic/vibrational structure throughout the chemical reaction with exquisite temporal resolution. We also develop a novel methodology and light source to probe ultrafast dynamics of single molecules in the condensed phase at room temperature, with the aim to understand chemical reaction dynamics at the single-molecule level. Our particular interest rests on elucidating sophisticated molecular mechanisms that underlie the reactions of functional molecular systems such as proteins, molecular assemblies, and metal complexes. On the basis of new insights that can be gained from our advanced spectroscopic approaches, we aim to establish a new avenue for the study of chemical reaction dynamics.




Fig. a. Schematic illustration of the chemical reaction dynamics on complicated multidimensional potential energy surfaces (PESs). We aim to visualize how the molecules migrate on these PESs to yield the product and unveil the sophisticated molecular mechanisms underlying the chemical reactions of functional molecules.

Fig. b. Setup for advanced ultrafast spectroscopy based on sub-10-fs pulses.

### 参考文献

- 1) H. Kuramochi, S. Takeuchi, T. Tahara, *Rev. Sci. Instrum.* **87**, 043107 (2016).
- 2) T. Fujisawa, H. Kuramochi, H. Hosoi, S. Takeuchi, T. Tahara, *J. Am. Chem. Soc.* **138**, 3942-3945 (2016).
- 3) H. Kuramochi, S. Takeuchi, K. Yonezawa, H. Kamikubo, M. Kataoka, T. Tahara, *Nat. Chem.* **9**, 660-666 (2017).
- 4) H. Kuramochi, S. Takeuchi, H. Kamikubo, M. Kataoka, T. Tahara, *Sci. Adv.* **5**, eaau4490 (2019).
- 5) H. Kuramochi, S. Takeuchi, M. Iwamura, K. Nozaki, T. Tahara, *J. Am. Chem. Soc.* **141**, 19296-19303 (2019).
- 6) H. Kuramochi, T. Tahara, *J. Am. Chem. Soc.* **143**, 9699-9717 (2021).



## 分子を使った新しいエレクトロニクスを開拓する Open up Future Electronics by Organic Molecules

### 山本 浩史(教授)

YAMAMOTO, Hiroshi

1993年東京大学理学部化学科卒業、1998年同大学大学院理学系研究科博士課程修了、博士(理学)、1998年学習院大学理学部物理学科助手、1999年理化研究所基礎科学特別研究員、2000年同研究員、2007年同専任研究員を経て、2012年4月より現職。分子科学研究所装置開発室長を兼任中。

TEL: 0564-55-7334

FAX: 0564-55-7325

mail: yhiroshi@ims.ac.jp

1993 B.S. The University of Tokyo

1998 Ph.D. The University of Tokyo

1998 Research Associate, Gakushuin University

1999 Special postdoctoral fellow, RIKEN

2000 Research Scientist, RIKEN

2007 Senior Research Scientist, RIKEN

2012 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2012 Visiting Professor, Tokyo Institute of Technology (-2019.3)

2015 Visiting Professor, Tohoku University (-2020.3)

#### 〈Keywords〉


Molecular Conductors,  
Organic Superconducting Transistors,  
Supramolecular Nanowires,  
Organic Spintronics

新しいエレクトロニクスの担い手として有機分子が注目を集めています。軽くて曲げられるトランジスタとして最近盛んに研究されている有機トランジスター(Organic Field Effect Transistor = OFET)や、ディスプレイ用途に使われている有機発光素子などがその代表例と言えるでしょう。我々の研究室では、有機分子による新しいエレクトロニクスの創成を目指して、これまでとは違った独創的なデバイスを提案・実現していくと研究に取り組んでいます。現在主に取り組んでいるのは、有機エレクトロニクスの中でも非常に特異な性質をもつ「強相関π電子」を使ったトランジスターの開発です。強相関電子というのは、電子間のクーロン相互作用が強く働き、通常の伝導電子とは異なる振る舞いをする電子系のことです。ほんの少し電子濃度を増やしたり減らしたりするだけで、急に電子が固まって絶縁体になったり、急に流れ出して金属になりました。不思議なことに、 $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ などの銅酸化物高温超伝導体の伝導電子もまた、この強相関電子に属することが分かっています。そしてFET構造の仕組みを利用して有機物界面の「強相関電子」の濃度を変化させてやると、上に述べたような現象が実際に起こって、絶縁体を金属や超伝導にスイッチ(相転移)させることができます。我々は世界で初めて、こうした相転移をOFET界面において観測することに成功し、デバイスのスイッチング性能を飛躍的に向上させることに成功しました。また最近は、超伝導のON/OFFを光で制御したり、歪みの効果で超伝導転移を制御したりするデバイスの開発も達成しています。このようなデバイスは将来量子コンピューターの中で使われる可能性があるほか、その動作様式を丹念に調べることによって、まだ分かっていないことが多い強相関電子系超伝導の発現機構解明のための糸口を与えてくれることが期待されています。このような研究に加えて、最近はキラル分子を用いたスピニ偏極電流の生成に関する研究にも取り組んでいます。


#### 参考文献

- 1) M. Suda, Y. Thathong, V. Promarak, H. Kojima, M. Nakamura, T. Shiraogawa, M. Ehara and H. M. Yamamoto "Light-driven Molecular Switch for Reconfigurable Spin Filters" *Nature Commun.*, **10**, 2455 (2019).
- 2) M. Suda, R. Kato, and H. M. Yamamoto "Light-induced superconductivity using a photo-active electric double layer" *Science*, **347**, 743-746 (2015).
- 3) H. M. Yamamoto, M. Nakano, M. Suda, Y. Iwasa, M. Kawasaki and R. Kato "A strained organic field-effect transistor with a gate-tunable superconducting channel" *Nature Commun.* **4**, 2379/1–2379/7 (2013).

Organic molecules are attracting recent attention as new ingredients of electronic and spintronic circuits. Their functionalities have been developed considerably, but are still to be explored and advanced. Our group focuses on a development of organic electronics in the next era by providing new mechanism and concepts of the device operation and fabrication. For example, an electronic phase transition is utilized for the ON/OFF switching of our field-effect-transistor (FET). This special FET is called an organic Mott-FET, where the conduction electrons in the organic semiconductor are solidified at the OFF state because of Coulomb repulsion among carriers. However, these solidified electrons can be melted by applying a gate voltage, and show an insulator-to-metal transition so-called Mott-transition to be switched to the ON state. Because of this phase transition, a large response of the device can be achieved, resulting in the highest device mobility ever observed for organic FETs. At the same time, Mott-transition is known for its relevance to superconductivity. Not only in organic materials but also in inorganic materials such as cuprates, Mott-transition is frequently associated with superconducting phase at low temperature. Indeed, our organic FET shows an electric-field-induced superconducting transition at low temperature. Besides these studies, we are also engaged in development of novel spintronics devices based on chiral organic molecules.



Light-induced superconductivity at an organic interface. Self-assembled monolayer (SAM) of photochromic molecule can react with UV light to form electric field across the interface. This electric field invites excess carriers that induces superconductivity from Mott-insulating state.



## ■階層分子システム解析研究部門 Trans-Hierarchical Molecular Systems

# タンパク質分子の新規デザイン De novo Design of Protein Molecule

### 古賀 信康(准教授)

KOGA, Nobuyasu

2001年神戸大学理学部卒、  
2006年神戸大学大学院自然  
科学研究科修了、博士(理学)。  
神戸大学博士研究員、京都大  
学博士研究員、日本学術振興  
会海外特別研究員、ワシントン  
大学博士研究員を経て2014年

4月より現職。

TEL: 0564-55-7379

mail: nkoga@ims.ac.jp

2001 B.S. Kobe University

2006 Ph.D. Kobe University

2003 JSPS Predoctoral  
Research Fellow

2006 Postdoctoral Fellow,  
Kobe University

2007 Postdoctoral Fellow,  
Kyoto University

JSPS Postdoctoral  
Fellow for Research  
Abroad University of  
Washington

2009 Postdoctoral Fellow,  
University of Washington

2014 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science

Associate Professor,  
The Graduate University  
for Advanced Studies

2018 Associate Professor,  
Exploratory Research  
Center on Life and  
Living Systems

### 〈Keywords〉

Protein Design,

Protein Folding,

Structural Biology

タンパク質分子は、アミノ酸配列に従ってほどけた紐のような状態から自発的に折りたたまり特異的な3次元立体構造を形成した後に、その3次元立体構造に基づき機能を発現することで、生命システムにおけるパートとして様々な生命現象を生み出しています。現在私達が見ている自然界のタンパク質の姿は、自然が何十億年という時間をかけて精巧に創り上げた、いわば“完成品”であり、それらを解析するのみではタンパク質分子の動作メカニズムの本質を明らかにすることは困難です。そこで私達は、立体構造形成や機能発現に関する様々な仮説を立て、それらを基にタンパク質分子を計算機上でデザインし、そのデザインしたタンパク質分子が実際にどのように振る舞うのかを生化学実験によって調べるというアプローチで研究を行っています。

私達は「アミノ酸配列はどのような原理により折りたたみ後の構造を決定しているのか?」という問題に取り組んできました。この問題が解明されれば、アミノ酸配列に基づいて折りたたむ立体構造を予測することも、またその逆に、望みの機能を発現する立体構造に折りたたむアミノ酸配列を自在にデザインすることも可能になります。これまでの研究において、アミノ酸配列の詳細というよりも、 $\alpha$ ヘリックス、 $\beta$ ストランド、ループの長さや形状といった主鎖構造が3次構造の決定に重要であることを発見し、これらの発見を基にタンパク質デザイン技術を開発することで、様々なタンパク質構造のデザインに成功しました。今後は、このデザイン技術を発展させることで、望みの機能を持つタンパク質をデザインする技術の確立を目指します。


### 参考文献

- 1) M. Mitsumoto, K. Sugaya, K. Kazama, R. Nakano, T. Kosugi, T. Murata, N. Koga, State-Targeting Stabilization of Adenosine A<sub>2A</sub> Receptor by Fusing a Custom-Made De Novo Designed  $\alpha$ -Helical Protein, *Int. J. Mol. Sci.*, **22**, 12906 (2021).
- 2) N. Koga, R. Koga, G. Liu, J. Castellanos, G. T. Montelione, D. Baker, Role of backbone strain in de novo design of complex  $\alpha/\beta$  protein structures, *Nature Communications*, **12**, 3921 (2021).
- 3) R. Koga, M. Yamamoto, T. Kosugi, N. Kobayashi, T. Sugiki, T. Fujiwara, N. Koga, Robust folding of a de novo designed ideal protein even with most of the core mutated to valine, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **117**, 31149-31156 (2020).
- 4) R. Koga, N. Koga, Consistency principle for protein design, *Biophysics and Physicobiology*, **16**, 304-309 (2019).
- 5) Y. Lin, N. Koga, R. Tatsumi-Koga, G. Liu, A. F. Clouser, G. T. Montelione, D. Baker, Control over overall shape and

Protein molecules spontaneously fold into unique three-dimensional structures specified by their amino acid sequences from random coils to carry out their functions. Many protein studies have been performed by analyzing naturally occurring proteins. However, it is difficult to reach fundamental working principles of protein molecules only by analyzing naturally occurring proteins, since they evolved in their particular environments spending billions of years. In our lab, we explore the principles by computationally designing protein molecules completely from scratch and experimentally assessing how they behave.

Protein design holds promise for applications ranging from catalysis to therapeutics. There has been considerable recent progress in computationally designing proteins with new functions. Many protein design studies have been conducted using naturally occurring protein structures as design scaffolds. However, since naturally occurring proteins have evolutionarily optimized their structures for their functions, implementing new functions into the structures of naturally occurring proteins is difficult for most of cases. Rational methods for building any arbitrary protein structures completely from scratch provide us opportunities for creating new functional proteins. In our lab, we tackle to establish theories and technologies for designing any arbitrary protein structures precisely from scratch. The established methods will open up an avenue of rational design for novel functional proteins that will contribute to industry and therapeutics.

### OUR DESIGNS FOR VARIOUS PROTEIN TOPOLOGIES



size in de novo designed proteins, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **112**, E5478-5485 (2015).

6) N. Koga, R. Tatsumi-Koga, G. Liu, R. Xiao, T. B. Acton, G. T. Montelione and D. Baker, Principles for designing ideal protein structures, *Nature*, **491**, 222-227 (2012).



## ■繊細計測研究部門 Supersensitive Measurements

# 新しい光学顕微鏡でナノ物質の励起状態と キラリティを探る

Exploring Excited States and Chirality of Nanomaterials  
with Novel Optical Microscopes

岡本 裕巳(教授)

OKAMOTO, Hiromi

1983年東京大学理学部卒、

1985年同大学大学院理学系

研究科博士課程中退、1991年

博士(理学)。1985年分子科学

研究所助手、1990年東京大学

理学部助手、1993年同助教授

を経て、2000年11月より現職。

研究室主任、およびメソスコ

ピック計測研究センター長。

TEL: 0564-55-7320

FAX: 0564-54-2254

mail: aho@ims.ac.jp

1983 B.S. The University of Tokyo

1991 Ph.D. The University of Tokyo

1985 Research Associate,  
Institute for Molecular Science

1990 Research Associate,  
The University of Tokyo

1993 Associate Professor,  
The University of Tokyo

2000 Professor, Institute for Molecular Science

Professor, The Graduate University for Advanced Studies

2012 Dean, School of Physical Sciences, The Graduate University for Advanced Studies (to 2014)

2016 Deputy Director General

2017 Director, Center for Mesoscopic Sciences

### 〈Keywords〉

Near-Field Optical Microscopy,

Plasmons,

Chirality

従来の光学顕微鏡では、光の波長(可視光で $0.5 \mu\text{m}$ 程度)より小さい形を見ることができませんが、近接場光学顕微鏡という新しい方法によってナノメートルの物質の観察が可能になりました。ナノサイズ物質のカラー写真(スペクトル情報)を撮ることができ、また100兆分の1秒単位の極めて短い時間内に起きる変化を、一刻、場所ごとに調べることもできます。私たちは、貴金属でできたナノ物質で、物質の特性に深く関わる「波動関数」がこの方法で観察できることを見いたしました。更に、円偏光という螺旋の性質を持つ光で近接場計測をすることで、キラリティ(右手と左手のように、鏡像の関係にあるが同一ではない形を持つこと)の性質を、ナノ物質について場所ごとに調べることもできるようになりました。このようにナノ物質の新しい性質を光で調べ、制御する基礎的な研究を行っています。


貴金属ナノ微粒子がある一定の構造で集合させて配列構造を作ると、光を照射したときに、局所的に非常に強い光(金属微粒子のない場合に比べて、最大数百万倍)が発生する場合があると考えられています。通常の光学顕微鏡ではこのような光の場を観察することはできませんが、私たちは近接場光学顕微鏡を用いて、発生した強い光の場を、実際にイメージとして観察しました。例えば微粒子が2個連結した構造では、粒子間の隙間に強い光が発生しているのが観察され、これは理論による予測に良く一致します。また、同じ近接場光学顕微鏡を用いた実験で、ナノサイズの孔を通ってくる光が、孔に金属板で蓋をすると、かえって強くなるという、奇妙な現象を見いたしました。解析の結果、貴金属の微粒子が光を集め特異な性質が、この現象に深く関わることがわかつきました。

### 参考文献

- 1) H. Okamoto, T. Narushima, Y. Nishiyama, and K. Imura, "Local Optical Responses of Plasmon Resonances Visualised by Near-Field Optical Imaging," *Phys. Chem. Chem. Phys.* **17**, 6192-6206 (2015).
- 2) H. Okamoto, "Local optical activity of nano- to microscale materials and plasmons," *J. Mater. Chem. C* **7**, 14771-14787 (2019)
- 3) S. Hashiyada, T. Narushima, and H. Okamoto, "Imaging Chirality of Optical Fields near Achiral Metal nanostructures Excited with Linearly Polarized Light," *ACS Photon.* **5**, 1486-1492 (2018).
- 4) K. Imura, K. Ueno, H. Misawa, and H. Okamoto, "Anomalous Light Transmission from Plasmonic Capped Nano-Apertures," *Nano Lett.* **11**, 960-965 (2011).

With the conventional optical microscope, we cannot observe shapes of matters smaller than the wavelength of light ( $\sim 0.5 \mu\text{m}$  for visible light). Observation of nanomaterials became feasible with a new method of optical microscopy, called near-field optical microscopy. It enabled taking color photographs (i.e., spectral information) of nanomaterials. It also enabled observing dynamical behavior on the extremely short ( $10^{-14} \text{ s}$ ) timescale at each position on the nanomaterial. With this new microscopic method, we investigate fundamental characteristics of nanomaterials. We found that wave functions of noble metal nanostructures can be visualized. By adopting circularly polarized light, properties of chirality (non-superimposable feature of a matter on its mirror image) became accessible at each local position on nanomaterials.

We succeeded in visualizing the local field as an image with near-field optical microscopy. In the dimeric gold nanoparticles, strong optical field was observed at the interstitial site between the two particles. During the near-field measurement of gold nanodisk, we found a unique phenomenon that light coming through a nano-sized hole is enhanced when the hole is capped with a nanodisk. The result was interpreted as arising from the nature of noble metal particles to collect light.



Near-field optical images of various gold nanostructures.  
A: Single gold nanorod (length 540 nm). The amplitude of the wave function is visualized. B: Dimers of spherical gold nanoparticles (diameter 100 nm). Strong optical fields are observed in the interstitial sites. C: Island-like assembly of gold nanospheres (diameter 100 nm). Strong field is localized in the rim part. D: Chirality image of gold nanorectangle observed with circularly polarized light. Yellow and blue parts indicate opposite handedness of chirality. Although a rectangle is not chiral, strong local chirality is visualized in this image.



■広帯域相関計測解析研究部門 Broadband Multiscale Analysis

## 走査プローブ顕微鏡の先端技術を基軸とし、 ナノ分子科学の最前線を切り開く Open a New Frontier of Nano-Science Using State-of-the-Art Scanning Probe Microscopy

熊谷 崇(准教授)  
KUMAGAI, Takashi

2006年立命館大学理工学部  
応用化学科卒、2010年マックス・  
プランク固体研究所研究生、  
2011年京都大学大学院理学研  
究科化学専攻博士課程修了、  
博士(理学)。2008年日本学  
術振興会特別研究員(DC1)。  
2011年日本学术振興会  
海外特別研究員(フリッツ-  
ハーバー研究所)。2013年  
フリッツ-ハーバー研究所グ  
ループリーダー。2016年科学  
技術振興機構さきがけ研究者  
兼務(2020年まで)。2020年  
北海道大学客員准教授。2020  
年4月より現職。

TEL: 0564-55-7410  
mail: kuma@ims.ac.jp

2006 B.S. Ritumeikan  
University  
2011 Ph.D. Kyoto University  
2008 JSPS Research Fellow,  
Kyoto University  
2011 JSPS Research Fellow,  
Fritz-Haber Institute  
2013 Group leader,  
Fritz-Haber Institute  
2020 Associate Professor,  
Institute for Molecular  
Science(additional post)  
2020 Guest Professor,  
Hokkaido University


### 〈Keywords〉

Scanning Probe Microscopy,  
Nanoscale Spectroscopy,  
Single-Molecule Chemistry

個々の分子を直接観察し、それらを自在に操ることは分子科学における夢の実験の一つです。1980年代に発明された走査プローブ顕微鏡はこの夢を実現する究極的な単分子計測へと発展し、物理、化学、生物、そして医療にわたる幅広い分野で飛躍が期待されているナノサイエンス・ナノテクノロジーの中心的技術として現在も進化を続けています。10億分の1メートルというとても小さな「ナノの世界」は科学者の知的好奇心をくすぐる興味深い物理・化学現象が見られる学術研究のフロンティアであるだけでなく、21世紀における革新的な超微小デバイスやエネルギー変換技術の創出など現代社会の課題に貢献できる大きな可能性を秘めています。

私たちは、走査プローブ顕微鏡の先端計測を基軸とし、ナノ分子科学の最前線を切り開くことを目指した研究を行っています。プラズモニクスと呼ばれるナノスケールの光を操る技術と走査プローブ顕微鏡を融合させることによってナノ物質や一分子の構造とダイナミクスを分光学的に直接調べる新しい計測技術を開発しました。これによって原子・分子レベルの時空間極限における究極的な顕微分光を実現し、局所的な構造の不均一性とゆらぎの中から生まれる分子システム特有の機能の本質を解き明かす研究を目指しています。


Single-molecule chemistry studied by scanning probe microscopy. The figure illustrates the experiment on the direct observation of single-molecule tautomerization in porphycene.<sup>5),6)</sup>



It has been a dream in molecular science to directly observe single molecules and control them at will. Scanning probe microscopy invented in 1980s has achieved this dream and has evolved as an ultimate tool for single-molecule chemistry in the last few decades. The family of scanning probe microscopy still rapidly develops to be a core technology in diverse areas of nano-science and technology. Small "nano-world (10<sup>-9</sup> m)" is not only a frontier of academic researches where intriguing physical and chemical phenomena are observed, but also has big potentials for creation of innovative technologies in the 21st century which can contribute to significant challenges in human society.

We aim at opening up a new frontier of nanoscale molecular science using state-of-the-art scanning tunneling and atomic force microscopy. We challenge the development of ultimate optical spectromicroscopy in real-time and space at the atomic/molecular level, and elucidate fundamental mechanisms how local structural inhomogeneities and fluctuations in molecular systems determine their unique functions.

Direct observation of quantum dynamics. The figure shows scanning tunneling microscope image of single silver atom and porphycene molecules, where the double hydrogen transfer reaction occurring via quantum tunneling is directly visualized.<sup>4)</sup>



### 参考文献

- 1) S. Liu, M. Müller, Y. Sun, I. Hamada, A. Hammud, M. Wolf, T. Kumagai, Resolving the Correlation between Tip-Enhanced Resonance Raman Scattering and Local Electronic States with 1 nm Resolution. *Nano Lett.* **19**, 5725–5731 (2019).
- 2) H. Böckmann, S. Liu, M. Müller, A. Hammud, M. Wolf, T. Kumagai, Near-Field Manipulation in a Scanning Tunneling Microscope Junction with Plasmonic Fabry-Pérot Tips. *Nano Lett.* **19**, 3597–3602 (2019).
- 3) H. Böckmann, S. Gawinkowski, J. Waluk, M.B. Raschke, M. Wolf, T. Kumagai, Near-Field Enhanced Photochemistry of Single Molecules in a Scanning Tunneling Microscope Junction. *Nano Lett.* **18**, 152–157 (2018).
- 4) M. Koch, M. Pagan, M. Persson, S. Gawinkowski, J. Waluk, T. Kumagai, Direct Observation of Double Hydrogen Transfer via Quantum Tunneling in a Single Porphycene Molecule on a Ag(110) Surface. *J. Am. Chem. Soc.* **139**, 12681–12687 (2017).
- 5) J. N. Ladenthin, T. Frederiksen, M. Persson, J. C. Sharp, S. Gawinkowski, J. Waluk, T. Kumagai, Force-induced tautomerization in a single molecule. *Nature Chemistry* **8**, 935–940 (2016).
- 6) T. Kumagai, F. Hanke, S. Gawinkowski, J. Sharp, K. Kotsis, J. Waluk, M. Persson, L. Grill, Controlling intramolecular hydrogen transfer in a porphycene molecule with single atoms or molecules located nearby. *Nature Chemistry* **6**, 41–46 (2014).
- 7) T. Kumagai, A. Shiotari, H. Okuyama, S. Hatta, T. Aruga, I. Hamada, T. Frederiksen, H. Ueba, Hydrogen relay reactions in real space. *Nature Materials* **11**, 167–172 (2012).



## 錯体化学に立脚した自己集合分子システム Self-Assembling Molecular Systems Based on Coordination Chemistry

藤田 誠(卓越教授)

FUJITA, Makoto

1980年千葉大学工学部卒。

1982年同工学研究科修士

課程修了。1987年東工大

博士(工学)。相模中央化学

研究所研究員、千葉大学

助手、同講師、同助教授、分子

科学研究所助教授、名古屋

大学教授を経て、2002年より

東京大学大学院工学系研

究科教授、2018年4月より

現職を兼任。

TEL: 0564-55-5580

mail: mfujita@ims.ac.jp

1980 BSc Chiba University

1982 MSc Chiba University

1982- Researcher, Sagami  
1988 Chemical Research  
Center.

1987 Ph.D. Tokyo Institute of  
Technology

1988- Assist. Prof. to Assoc.  
1997 Prof., Chiba University.

1997- Assoc. Prof., Inst. for  
1999 Molecular Science (IMS)

1999- Professor, Nagoya  
2002 University.

2002- Professor, The University  
of Tokyo


2018- Distinguished Professor,  
Institute for Molecular  
Science

〈Keywords〉

Self-Assembly,  
Nano-Space,  
Coordination Chemistry

本研究室では、「金属配位による自己集合」をキーワードに新しい物質と機能の創成に挑んでいます。これまでに、適度な結合力をもち、結合形成に明確な方向性と結合数を持つ配位結合(金属イオンと有機分子の相互作用)を自己集合の駆動力として活用することで、人工系でありながら安定かつ精密な3次元構造が狙いどおりに構築できることを数多く提示してきました。現在ではこのような手法でつくられるナノスケールの物質群、とりわけ内部空間を持つ中空化合物の自己集合に着目して、ナノスケール材料の新しい設計と合成、ならびにその特異な機能の開拓(新しい反応の創出や物性の探索、自己集合の機構解明など)を研究しています。最近では、 $M_{30}L_{60}$ や $M_{48}L_{96}$ 組成にも及ぶ巨大中空錯体の構築にも成功しています。また、自己集合による細孔性錯体の合成と、結晶空間での機能創出にも取り組んでいます。ごく最近、細孔性錯体に溶液状態から吸収された有機化合物が、細孔内で平衡の位置に収まる現象に着目し、「試料の結晶化を必要としないX線構造解析手法(結晶スponジ法)」を開発しました。革新的な構造解析技術として、アカデミアのみならず、微量成分の迅速構造決定を必要とする創薬や食品などの産業分野からも高い注目を集めています。

Our laboratory is exploring the construction of new molecular materials through metal-directed self-assembly. By using coordination bonds with appropriate bond energy and well-defined geometries as the driving force of self-assembly, a variety of three-dimensional architectures have been constructed at will. Among these nanostructures, we are particularly interested in hollow frameworks with a large inner space, where new properties and functions are developed. Recent outstanding results include the self-assembly of gigantic  $M_{30}L_{60}$  and  $M_{48}L_{96}$  spherical complexes. We are also interested in reproducing solution reactions within the pore of self-assembled porous complexes. In due course, we have recently developed a new X-ray technique that does not require the crystallization of target compounds (crystalline sponge method). This innovative analysis method is attracting considerable interests of not only academia but also industries such as pharmaceuticals and foods companies.



X-ray structure of  $M_{48}L_{96}$  complex.

### 参考文献

- 1) Q.-F. Sun, J. Iwasa, D. Ogawa, Y. Ishido, S. Sato, T. Ozeki, Y. Sei, K. Yamaguchi, and M. Fujita, "Self-Assembled  $M_{24}L_{48}$  Polyhedra and Their Sharp Structural Switch upon Subtle Ligand Variation" *Science* **328**, 1144-1147 (2010).
- 2) D. Fujita, K. Suzuki, S. Sato, M. Yagi-Utsumi, Y. Yamaguchi, N. Mizuno, T. Kumazaka, M. Takata, M. Noda, S. Uchiyama, K. Kato, and M. Fujita "Protein encapsulation within synthetic molecular hosts" *Nat. Commun.* **3**, 1093 (2012).
- 3) Y. Inokuma, S. Yoshioka, J. Ariyoshi, T. Arai, Y. Hitota, K. Takada, S. Matsunaga, K. Rissanen, M. Fujita, "X-ray analysis on the nanogram to microgram scale using porous complexes" *Nature* **495**, 461-466 (2013).
- 4) D. Fujita, Y. Ueda, S. Sato, H. Yokoyama, N. Mizuno, T. Kumazaka, M. Fujita, "Self-assembly of  $M_{30}L_{60}$  Icosidodecahedron" *Chem* **1**, 91-101 (2016).
- 5) D. Fujita, Y. Ueda, S. Sato, N. Mizuno, T. Kumazaka, M. Fujita, "Self-Assembly of Tetrahedral Goldberg Polyhedra from 144 Small Components" *Nature* **540**, 563-566 (2016).



## 多次元分光計測法による新奇物性開拓 Exploring Novel Physical Properties by Multi-Dimensional Spectroscopy

木村 真一(教授(クロスマント))  
KIMURA, Shin-ichi

1988年東北大学理学部物理第二学科卒、1991年東北大学大学院理学研究科物理学第二専攻博士課程修了、博士(理学)。1991年日本学术振興会特別研究員(PD)、1993年神戸大学助手、1993年分子科学研究所助手、1998年神戸大学助教授、2002年分子科学研究所助教授／准教授、2013年大阪大学教授、2020年分子科学研究所教授(クロスマントメント)。  
mail: kimura@ims.ac.jp

1988 B.S. Tohoku University  
1991 Ph.D. Tohoku University  
1991 JSPS Postdoctoral Fellow, Tohoku University  
1993 Research Associate, Kobe University  
1993 Research Associate, Institute for Molecular Science  
1998 Associate Professor, Kobe University  
2002 Associate Professor, Institute for Molecular Science  
2013 Professor, Osaka University  
2020 Professor, Institute for Molecular Science (Cross Appointment)

### 〈Keywords〉


Condensed Matter,  
Biological Materials,  
Optical Property,  
Synchrotron Radiation,  
Electron-Energy-Loss Spectroscopy

固体の特徴的な物性である電気伝導や磁石としての性質、さらには抵抗なく電流が永久に流れ続ける超伝導、また生命の営みの元となっている酸化還元反応や光合成など、物性の出現や生命現象に現れる化学反応の起源は、物質中のミクロな世界である電子の電荷やスピノの動き、格子・分子の振動、またはそれらの間の量子力学的な相互作用です。つまり、これらのミクロな情報を、空間・時間・運動量・スピノ方向・エネルギーの全て(多次元)に対して観測し可視化することができれば、物性や生命現象の起源を知るばかりでなく、新たな機能性の予測や創造も可能になります。

このミクロな情報を可視化するためには、光や電子などの量子ビームを使った方法が有効です。特に、相互作用した電子(準粒子)の観測には、光電子分光や赤外・テラヘルツ分光が有効です。そこで、これまで得られなかつた新しい情報を得るために、電子線加速器から発生するシンクロトロン光やレーザーを使った新たな分光法やイメージング手法を開発しています。また、電気伝導やスピノ波、格子振動などの集団励起の観測には、電子線を使った電子エネルギー損失分光法が有効であり、スピノ偏極高輝度電子源を使った新しい分光法の開発に着手しています。

このように、私達は、シンクロトロン光や高輝度電子源などの量子ビームを、物質の機能性の起源を見る新しい「目」として用いることで、これまで見えなかった電子状態の変化を可視化し、そこで得られた情報を元にして新しい機能性の創造を目指しています。

Physical and chemical properties of solids, such as conductivity, magnetism, superconductivity, chemical reactions, and life phenomena, such as redox and photosynthesis, originate from microscopic electronic and vibrational properties in materials and their quantum mechanical interactions. Revealing microscopic information such as electronic states not only provides us with information on the origin of physical properties and life phenomena, but also leads to the expectation and creation of new functionalities. To visualize the change of the microscopic state, we also develop novel spectroscopic techniques using synchrotron radiation, high brilliant electron beams, and other so-called quantum beams. Based on the obtained information of electronic structures, we aim to develop novel physical properties of new materials.



Resonant electron-energy-loss spectroscopy (rEELS) apparatus developed by our group. The apparatus consists of a high-brilliant spin-polarized electron gun and a photoelectron spectrometer.

### 参考文献

- 1) S. Kimura, T. Kawabata, H. Matsumoto, Y. Ohta, A. Yoshizumi, Y. Yoshida, T. Yamashita, H. Watanabe, Y. Ohtsubo, N. Yamamoto, X. Jin, "Bulk-Sensitive Spin-Resolved Resonant Electron Energy-Loss Spectroscopy (SR-rEELS): Observation of Element- and Spin-Selective Bulk Plasmons", *Rev. Sci. Instrum.* **92**, 093103 (2021).
- 2) P. N. Nguyen, H. Watanabe, Y. Tamaki, O. Ishitani, S. Kimura, "Relaxation dynamics of [Re(CO)<sub>2</sub>(bpy)(P(OEt)<sub>3</sub>)<sub>2</sub>](PF<sub>6</sub>) in TEOA solvent measured by time-resolved attenuated total reflection terahertz spectroscopy", *Sci. Rep.* **9**, 11772 (2019).
- 3) Y. Ohtsubo, Y. Yamashita, K. Hagiwara, S. Ideta, K. Tanaka, R. Yukawa, K. Horiba, H. Kumigashira, K. Miyamoto, T. Okuda, W. Hirano, F. Iga, S. Kimura, "Non-trivial surface states of samarium hexaboride at the (111) surface", *Nat. Commun.* **10**, 2298 (2019).
- 4) K. Hagiwara, Y. Ohtsubo, M. Matsunami, S. Ideta, K. Tanaka, H. Miyazaki, J. E. Rault, P. Le Fèvre, F. Bertran, A. Taleb-Ibrahimi, R. Yukawa, M. Kobayashi, K. Horiba, H. Kumigashira, K. Sumida, T. Okuda, F. Iga, S. Kimura, "Surface Kondo effect and non-trivial metallic state of the Kondo insulator YbB<sub>12</sub>", *Nat. Commun.* **7**, 12690 (2016).
- 5) S. Kimura, T. Iizuka, H. Miyazaki, A. Iriizawa, Y. Muro, T. Takabatake, "Electronic-Structure-Driven Magnetic Ordering in a Kondo Semiconductor CeOs<sub>2</sub>Al<sub>10</sub>", *Phys. Rev. Lett.* **106**, 056404 (2011).



■特別研究部門(物質分子科学研究領域 電子構造研究部門) Advanced Molecular Science

## 有限の厚さをもつ固液界面のオペランド分子科学研究 Operando Molecular Science in Liquid-Solid Interfaces of Finite Thickness

大西 洋(教授(クロスアボット))  
ONISHI, Hiroshi

1985年東京大学理学部化学科卒、1987年東京大学大学院理学系研究科化学専攻修士課程修了、1993年東京大学博士(理学)。1989年東京大学助手、1997年東京大学助教授、1999年神奈川科学技術アカデミープロジェクトリーダー、2004年神戸大学教授、2021年分子科学研究所教授(クロスアポイントメント)。  
mail: oni@ims.ac.jp

1985 B.S. The University of Tokyo  
1989 Assistant Professor, The University of Tokyo

1993 Ph.D. The University of Tokyo  
1997 Associate Professor, The University of Tokyo  
1999 Project Leader, Kanagawa Academy of Science and Technology  
2004 Professor, Kobe University

2021 Professor, Institute for Molecular Science (Cross Appointment)

〈Keywords〉

Interfaces,  
Reaction Kinetics,  
Catalysis,  
Operando Spectroscopy,  
Scanning Probes

気体と固体が接する界面でおきる化学反応の研究(Gerhard Ertl, 2007年)にノーベル化学賞が授与されてから15年が経過しました。二つの物質が接触する場所である界面の研究を新しいステージに導くために、界面が有限の厚さ(0.001–1 μm)をもつことを明確に意識して、ひとつひとつの分子(サイズ0.01 μm)を見ていく分子論的な視座と、より大きな空間スケール(0.1–1 μm)で界面の両側を見る連続体的な視座の両方をあわせもつことが求められます(図)。このような問題意識のもとで、界面が機能を発揮している状態での計測評価(これをオペランド計測といいます)を進めるために、世界最先端の計測評価技術を活用していきます。

具体的には(1)太陽光と水を使って水素をつくる光触媒と(2)低摩擦を実現する潤滑油をターゲットに選んで研究をはじめます。光触媒は50年ほど前に日本で発明された技術であり、高性能な光触媒を日本の研究者が次々に見出してきました。水から水素をつくる効率は50年前には考えられなかったほど高くなりましたが「どうして効率を高くすることができたのか?」がわかつてないので、より効率の高い光触媒を設計するための指針がありません。


試行錯誤に頼って開発をすすめざるを得ない事情は潤滑油でも同じです。蒸気圧の低い有機溶媒(長鎖の炭化水素など)にごく微量の添加剤(濃度100 ppmのカルボン酸など)を加えると、低摩擦の状態を長く維持できる潤滑油になります。潤滑油に生分解性(微生物などによって自然に分解される性質)を付与するために、炭化水素を別の化合物(エステルなど)に置き換えることが求められています。しかし「微量の添加剤がどうやって摩擦をやわらげているのか?」がわからないので、生分解性潤滑油に有効な添加剤の分子設計が進みません。水と光触媒が接する界面や、潤滑油と固体が接する界面をオペランド計測する方法を工夫してこれらの問い合わせておきます。

### 参考文献


- 1) 大西洋, タンタル酸アルカリ光触媒:金属カチオンドーピングによる量子収率向上メカニズム. 触媒 2021, **63**, 108-114.
- 2) 大西洋, 液中ピコニュートン力学測定による液体構造計測へのアプローチ. 顕微鏡 2016, **51**, 67-71.
- 3) T. Kosaka, Y. Teduka, T. Ogura, Y. Zhou, T. Hisatomi, H. Nishiyama, K. Domen, Y. Takahashi, H. Onishi, "Transient Kinetics of O<sub>2</sub> Evolution in Photocatalytic Water-Splitting Reaction" ACS Catalysis 2020, **10**, 13159-13164.
- 4) S. Xue, A. Sasahara, H. Onishi, "Atom-Scale Imaging of TiO<sub>2</sub>(110) Surface in Water by Frequency-Modulation Atomic Force Microscopy" The Journal of Chemical Physics 2020, **152**, 054703 (7 pages).
- 5) S. Moriguchi, T. Tsujimoto, A. Sasahara, R. Kokawa, H. Onishi, "Nanometer-Scale Distribution of Lubricant Modifier on Iron Films: A Frequency-Modulation Atomic Force Microscopy Study Combined with Friction Test" ACS Omega 2019, **4**, 17593-17599.
- 6) H. Imada, K. Kimura, H. Onishi, "Water and 2-Propanol Structured on Calcite (104) Probed by Frequency-Modulation Atomic Force Microscopy" Langmuir 2013, **29**, 10744-10751.

We are proud of our international-compatible studies of liquid-solid interfaces, e.g. photocatalysts for artificial photosynthesis and lubricants for smooth tribology. Characterization with frequency-modulation AFM, time-resolved ATR-IR spectroscopy, soft X-ray absorption, and microelectrode-based amperometry are being developed. We are pleased to collaborate with researchers in academic and industrial organizations to reveal science behind material conversion and energy dissipation at liquid-solid interfaces.

A new era of molecular science at interfaces should be revealed in liquid-solid interfaces of finite thickness (Figure). The molecular interface is the place of reaction where molecules of interest collide with or interact with other molecules. We need to observe individual molecules there. On the other hand, the molecular interface is connected to liquid and solid. Materials and energy come from/to the two condensed phases, since functional interfaces are always open to the environment. In addition, operando characterization is definitely required for investigating the interface in its working state.



Liquid-Solid Interface of Finite Thickness



## マイクロ固体フォトニクスの研究 Micro Solid-State Photonics

### 平等 拓範(特任教授) TAIRA, Takunori

1983年福井大学卒、1985年福井大学大学院修士課程修了、同年三菱電機(株)LSI研究所研究員、1989年福井大学工学部助手、1998年2月分子科学研究所准教授、2018年10月より理化学研究所グループディレクター、2019年4月より現職。2004年平成16年度文部科学大臣賞、2008年(財)光産業技術振興協会第24回櫻井健二郎氏記念賞、2010年米国光学会フェロー、2012年国際光学会フェロー、2014年米国電気電子学会フェロー、2018年IAPLEフェロー、2019年レーザー学会フェロー。TEL: 0564-55-7346 FAX: 0564-53-5727 mail: taira@ims.ac.jp

1983 B.A. Fukui University  
1985 M.Sc. Fukui University  
1996 Ph.D. Tohoku University

1985-Researcher: LSI Research and Development Laboratory, Mitsubishi Electric Corp.,  
1989 Research Associate: Fukui University.

1993 Visiting Researcher: Ginzon Laboratory, Stanford University

1998 Associate Professor: National Institutes of Natural Sciences, Institute for Molecular Science

2006 Invited Professor: Pierre & Marie Curie University (Paris VI), Paris, France.

2011 Invited Professor, University Joseph Fourier, Grenoble, France.

2013 Invited Professor, ENSCP-Chimie ParisTech, Paris, France.

2018 Group Director, RIKEN SPring-8 Center

2019 Project Professor, Institute for Molecular Science

OSA, SPIE, IEEE, IAPLE, and LSJ Fellow

#### Keywords

Solid-State Lasers,  
Nonlinear Optics,  
Micro Solid-State Photonics

光の波長と同程度のミクロンオーダーで物質・材料の性質を制御する事で光波を高度に操る“マイクロ固体フォトニクス”に関する研究を展開しています。マイクロドメイン制御で物質に新たな光機能が発現でき、マイクロ共振器による高コヒーレント光・高輝度光発生が望めるようになりました<sup>1-5)</sup>。そして新材料レーザーセラミックスの発掘、非線形素子の開発を含めた物質・材料研究の成果としてマイクロチップレーザーによる世界初の自動車のエンジン点火<sup>6-8)</sup>、真空紫外の波長118 nm<sup>9)</sup>からコヒーレンス長に合せマイクロドメイン分極を制御する擬似位相整合(QPM)による新たな非線形素子の開発もあり波長11 μmまでの赤外<sup>4),10)</sup>、さらに波長0.1-0.8 mm<sup>11),12)</sup>とTHz波からミリ波に至る広帯域な高効率波長変換などを実証してきました。そして近年、中間層を介した表面活性接合(il-SAB)に成功する事で一体型多ディスクレーザー構造が可能となり可能性が広がりました<sup>13)</sup>。この接合による分布面冷却(DFC)多ディスクまたはチップ利得媒質構造は、小型高利得構成で、高出力・高強度レーザーが望めます。一方、多数の薄板水晶を張り合わせたQPM-水晶は高耐性で有るだけで無く固体材料での真空紫外までの波長変換素子となり得ます<sup>14)</sup>。このように物質・材料を制御する手法を極める事で、モジュール化された小型集積レーザー(TILA)による極限的な高輝度固体レーザーが望め、理研と連携し卓上XFEL<sup>11),15),16)</sup>を可能とするレーザー駆動電子加速を推進させることで分子科学に新展開をもたらすだけで無く、TILAコンソーシアム<sup>17)</sup>と連携する事でイノベーション創出にも貢献できると期待しています(Fig. 1)<sup>18),19)</sup>。




Fig. 1 TILA consortium toward “Laser Science and Innovation” by micro solid-state photonics.

#### 参考文献

- 1) T. Taira, et al., *Opt. Lett.* **16** (24) 1955 (1991).
- 2) T. Taira, et al., *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* **3** (1) 100 (1997).
- 3) T. Taira, *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* **13** (3) 798 (2007).
- 4) T. Taira, *Opt. Mater. Express* **1** (5) 1040 (2011).
- 5) Y. Sato, et al., *Scientific Reports* **7**, 10732 (2017).
- 6) H. Sakai, et al., *Opt. Express* **16** (24) 19891 (2008).
- 7) M. Tsunekane, et al., *IEEE J. Quantum Electron.* **46** (2) 277 (2010).
- 8) T. Taira, et al., *The 1st Laser Ignition Conference '13, OPIC '13, Yokohama, April 23-26, LIC3-1 (2013).*
- 9) R. Bhandari, et al., *Opt. Express* **21** (23) 28849 (2013).
- 10) M. Miyazaki, et al., *Phys. Chem. Chem. Phys.* **11**, 6098 (2009).
- 11) S. Hayashi, et al., *Scientific Reports* **4**, 5045 (2014).
- 12) S.W. Jolly, et al., *Nature Commun.* **10** (2591), 1 (2019).
- 13) L. Zheng, et al., *Opt. Mater. Express* **7** (9), 3214 (2017).
- 14) H. Ishizuki, et al., *Opt. Mater. Express* **8** (5), 1259 (2018).
- 15) N.H. Matlis, et al., *Nuclear Inst. and Methods in Physics Research A*, **909**, 27 (2018).
- 16) [https://www.riken.jp/en/research/labs/rsc/innov\\_light\\_src/laser\\_drive\\_electron\\_accel\\_tech/](https://www.riken.jp/en/research/labs/rsc/innov_light_src/laser_drive_electron_accel_tech/)
- 17) <https://tila.ims.ac.jp/en/>
- 18) Y. Sano et. al., *Materials*, **11**, 1716 (2021).
- 19) H. Ohba et. al., *IEEJ Journal*, **142**, 77 (2022).

# 共同利用・共同研究をささえる最先端の研究設備

State-of-the-art facilities supporting cutting-edge research

研究施設

## 極端紫外光研究施設 UVSOR Synchrotron Facility

光は、その波長によって、赤外線、可視光線、紫外線、極端紫外線、X線、と様々な名前で呼ばれます。この様々な波長域の光からユーザーが望む波長の光を取り出すことのできる装置がシンクロトロン光源です。高エネルギーの電子ビームが高磁場中で発するシンクロトロン光は、あらゆる波長域において高強度で指向性が高く、分子科学を始め幅広い研究分野で利用されています。分子科学研究所の極端紫外光研究施設は1983年に稼働を始めたシンクロトロン光源ですが、幾度かの改良を経て、現在でも、極端紫外線から赤外線・テラヘルツ波に至る低エネルギーのシンクロトロン光源として世界最高水準の高輝度性を誇っています。その特性を活かして、物質の機能性の起源である電子状態の直接観測が行われています。UVSORという愛称で世界的に知られ、国内のみならず世界各地から利用者を受け入れています。

Light is called with various names such as infrared, visible, ultraviolet, vacuum-ultraviolet and X-ray, depending on its wavelength. A synchrotron light source is capable of producing light in the ultra-wide wavelength range from infrared to X-rays.

Synchrotron light radiated by high energy electrons traveling in a strong magnetic field is intense and highly collimated. It is widely used in various research fields including molecular science. In IMS, a synchrotron light source has been operational since 1983. After several upgrades, it is still the brightest in the world among low energy synchrotron light sources. By utilizing its excellent performance, the electronic structure that is the origin of the functionalities of solids is directly observed. This facility is called UVSOR and is used by many researchers not only from our country but also from overseas.



UVSOR施設


先端電子構造評価法として  
BL6Uに光電子運動量顕微  
鏡装置が導入された

Photoelectron momentum  
microscope was launched  
at beamline BL6U as state-of-  
the-art instrument to evaluate  
the electronic structure



さまざまな材料のナノ構造を  
視覚化・元素識別するための  
走査型透過X線顕微鏡装置

Scanning transmission  
X-ray microscope for visualizing  
nanostructures of various  
materials with elemental resolution



CCD単結晶X線解析計  
CCD X-ray Diffractometer



高周波・高磁場電子スピン共鳴装置  
High-frequency ESR Spectrometer

## 機器センター Instrument Center

機器センターは分子スケールナノサイエンスセンターと分子制御レーザー開発研究センターの汎用機器を統合して、平成19年4月に新たに発足しました。機器センターでの主たる汎用機器は山手地区のNMR、質量分析装置、粉末X線回折装置、円二色性分光装置、明大寺地区のESR、SQUID磁束計、X線回折装置(粉末、単結晶)、波長可変ピコ秒レーザーシステム、蛍光分光装置、紫外可視近赤外分光装置などです。また大学連携研究設備ネットワーク事業を推進し、各種講習会の実施や、機器利用の予約・課金webシステムを提供し、全国的な汎用機器の共同利用を支援しています。令和4年度から文科省マテリアル先端リサーチインフラ事業を通して、施設利用と協力研究による多くの先端機器利用が可能です。

Instrument Center was established in 2007 by integrating two research centers in IMS. The main instruments maintained in YAMATE campus are: NMR, MALDI, X-ray diffractometers, etc; in MYODAIJI: ESR, SQUID, SEM, Spectrometers (FTIR, UV-vis, ESCA, ARUPS), etc. The center organizes the Inter-University Network for Common Utilization of Research Equipments and participates in the program of Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan supported by MEXT.

## 研究施設

### 装置開発室 Equipment Development Center

装置開発室では、分子科学研究に必要な様々な実験装置の製作・開発を行っています。機械、エレクトロニクス、微細加工などの設備を有し、高度な技術・技能を有する技術者が配属されています。研究所創設当初から、所内外の研究者と密接に連携し、独創的な研究を可能とする様々な実験装置の開発を手掛けてきました。将来の分子科学研究を支えるために、より先進的な技術の習得にも積極的に取り組んでいます。研究者や学生に対して機械加工や電子回路工作に関する講習会を開催し、技術の普及にも努めています。

Equipment development center provides technical services to support advanced molecular sciences with new equipments. Machining, electronics, micro-patterning, and 3D-printing facilities are maintained by skilled technical staffs who help researchers design and fabricate state-of-the-art equipment.



## 岡崎共通研究施設

### 計算科学研究センター Research Center for Computational Science

我が国唯一の分子科学分野の理論計算科学研究のための共同利用施設です。先導的な学術研究の発信はもとより、岡崎地区の3研究所と全国の分子科学とバイオサイエンスの研究者に対して、大学等では不可能な大規模計算を実行できるハード環境と様々なプログラムソフトを提供しています。平成29年10月からは従前の2システムを統合化した総理論演算性能が4PFlopsの「高性能分子シミュレータ」の運用を開始し、大規模な計算が実行できる環境を提供しています。

Research Center for Computational Science provides state-of-the-art computational resources to academic researchers in molecular science and related fields, e.g. quantum chemistry, molecular simulations, and solid state physics. The computer systems consist of NEC LX406R-2, LX110Rh-1 and LX108Th-4G. Total performance is 4PFlops.



# 私たちの使命 Our Mission

## 国内外の研究者への共同研究・共同利用支援に関する事業 Serving as a core organization for domestic and international collaborations

国内外の研究者が分子研での共同研究・施設利用を実施しています。

分子科学研究所は、共同利用機関としてユニークかつ高度・先端的な施設・機器を整備・公開し、それら研究資源を積極的に利用し所内研究者と国内外の研究者が協働推進する「共同研究」、特定の課題に関する討論を深め新しい発展を探るプラットフォームとしての「研究会」、そして所外研究者が各々固有の研究遂行の上で主体的にそれら研究資源を利用する「施設利用」を共同利用の柱として提供しています。

最も利用者の多い「施設利用」ではUVSOR、機器センター、計算科学研究センターなどの施設・機器を分子科学領域の研究者に広く利用して頂いています。またメソスコピック計測研究センターなどの研究センターにおけるユニークかつ先端的な研究資源の利用推進、各種測定法や物質合成手法などの開発支援、装置開発室における周辺機器・機材のデーターメイト製作などを通じて関連領域コミュニティーの研究推進を支えます。さらに各研究領域やセンターにおける研究資源を利用しながら所内の教員と複数の所外研究者との連携の下で行う「課題研究」および所内の教員と一対一で共同研究を行う「協力研究」を広く実施しています。コロナ禍によって開催数が減少した「研究会」もon-web研究会の開催支援を充実させポスト・コロナ、ウィズ・コロナへの対応を進めています。

また「大学連携研究設備ネットワーク」や「マテリアル先端リサーチインフラ」の拠点機関として、分子科学領域における先端的研究設備の相互利用による共同研究の促進にも取り組んでいます。



### ■共同利用研究実施一覧 2021年度

実施内容	件数	人数
共同研究	114	349
(内 訳) 課題研究	1	4
協力研究	113	345
研究会	7	7
(内 訳) 研究会	4	4
所長招へい	1	1
若手研究活動支援	2	2
施設利用	647	2,741
(内 訳) UVSOR	214	1,057
機器センター	147	454
装置開発室	8	38
計算科学研究センター	278	1,192
合 計	768	3,097

### ■共同利用国際研究 International Joint Research

UVSORをはじめ、所内の最先端施設・装置を海外の研究者に利用開放し、共同利用・共同研究を行っています。105件実施(2021年度リモートによる打ち合わせ、実験等)

IMS opens up state-of-the-art facilities including UVSOR for collaborative and/or joint researches. 105 projects by remote (FY2021)

## 大学連携研究設備ネットワークの構築 Inter-University Network for Common Utilization of Research Equipments (EqNW)

分子科学研究所は、広く国内の研究者がインターネットを通じて大学の研究設備を有効に活用するための組織である「大学連携研究設備ネットワーク」による設備相互利用と共同研究の促進」事業の中核機関を務めています。本ネットワークには、全国の大学や企業を含めた約300の機関が参加しており、2,700台以上の研究設備の利用案内とそのうち750台以上の設備についての利用予約・課金システムを運用しています。14,000名を超える研究者がユーザーとして登録されており、年間170,000件以上の利用実績があります。一部は依頼計測も可能です。自分で高価な装置を購入することなく先端測定が行える研究支援事業として広く有効に活用されています。

- More than 14,000 registered users
- Mutual utilization among national universities (since FY2007)
- Open for private universities, public institutes, private companies (more than 300 organizations)

大学連携研究設備ネットワーク  
<https://chem-eqnet.ims.ac.jp/>



大学連携研究設備ネットワークの概念

## マテリアル先端リサーチインフラ Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan

令和4年度から文科省マテリアル先端リサーチインフラ事業を通して、施設利用と協力研究による多くの先端機器利用が可能です。

The center organizes the Inter-University Network for Common Utilization of Research Equipments and participates in the program of Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan supported by MEXT.



分子科学を中心とした基礎科学研究の振興に資する人事施策を検討、共同利用機関としての新たな取り組みを始めています。

Institute for Molecular Science (IMS) has strengthened its personnel affairs measures as an Inter-University Research Institute by the following new approaches, to contribute to the promotion of the basic research mainly in molecular science field.

大学の研究活動の活性化に貢献する施策として、新しい人事交流制度を開始しました。

具体的には、以下の2制度を試行し、分子科学分野のトップレベル研究の支援と、研究者層の厚みを増強するための支援を行います。

### 特別研究部門

1. 分子科学分野において最先端の科学を切り拓く世界的研究者を「卓越教授」として招聘し、研究に専念できる環境を提供します。

2. 分子科学分野において独創的な研究を行っている大学教員をクロスアポイントメントで招聘し、分子研の先端設備を使った研究に集中的に取り組む場を提供します。

### Division of Advanced Molecular Science

1. IMS invites Distinguished Professor who leads world-class unique research in the field of molecular science, and provides environment to devote themselves to research.

2. IMS invites Adjunct Professors from universities and institutes, who leads a unique research in molecular science utilizing state-of-the-art facilities of IMS, by Cross-Appointment system.

分子科学研究所と企業などからの資金によって運営するオープンイノベーション拠点とし  
産官学の共同研究を実施します。

Institute for Molecular Science (IMS) has launched a division for research collaboration to commercialize the latest technology by running a project with industrial funding along with the government support. As a center of open innovations, we will expand it and strengthen the cooperative relationship among Industry, Academia and Government.

分子科学研究所では、分子科学の研究の切り口を増やし、研究分野の裾野を広げる取り組みの一つとして、複数の企業等外部機関からの会費により運営するオープンイノベーションの拠点「社会連携研究部門」を設置することといたしました。本研究部門では、日本における超小型レーザー技術によるイノベーションを図ることとし、産学官を交えた知識集積型のレーザー研究開発イノベーション拠点「小型集積レーザーコンソーシアム(TILA : Tiny Integrated Laser)」を形成し、本趣旨に賛同する複数の企業等外部機関と緊密に連携を取りながら、新たな産学連携研究の創出を目指します。

Division of Research, Innovation and Collaboration has been established in Institute for Molecular Science as one of the projects to open up the new aspects of researches on molecular science and to expand the range of the research fields. The division is a center of open innovations and run by membership fees from outside organizations such as commercial enterprises. TILA, Tiny Integrated Laser, Consortium has been formed in the division with the aim of making innovations based on ultra-small laser technologies in Japan. TILA Consortium is an industry-academia-government, knowledge-intensive innovation center of research and development on lasers and cooperates closely with the outside organizations which approve of the above purpose and is intended for creating new industry-academia joint researches.

**TILA 小型集積レーザーコンソーシアム**

あかるい未来を描く 超小型パワーレーザー

超小型レーザーという今までどこで見ても見ることのない新しい技術を実現しています。

超小型イノベーションを実現するための技術開発を行っています。

超小型やハンドheldレーザーを実現...新しい未来を目指します。

TILAコンソーシアム（当館）は、社会連携研究部門を実施することです。

超小型レーザーに関する研究を実施する各種の権利を譲り受けられます。

コンソーシアムは、企業などからも一度まとめて申請できますのでお問い合わせください。

当館の場合は、社会連携研究部門の研究機関、電子申請の場合は、社会連携研究部門の研究機関を選びることができます。

お問い合わせください。お問い合わせください。

超小型レーザーを実現するための技術開発を行っています。

超小型やハンドheldレーザーを実現...新しい未来を目指します。

**小型集積レーザーコンソーシアム(TILA)**

<https://tila.ims.ac.jp/>

## 世界に広がるネットワークの構築 Constructing a world-wide research network

分子科学研究所は、国際的な分子科学研究の中核拠点としても積極的な役割を果たしています。

### 国際共同研究拠点の形成、若手研究者的人材育成 International Collaboration Programs

分子科学研究所は創設以来、多くの国際会議の開催、多数の外国人研究員の受け入れ、および国際共同研究事業の積極的な推進など、国際的に開かれた研究所としての役割を担ってきました。国際共同研究を更に推進するために、平成16年度より独自の国際共同研究事業を開始しています。この事業では、(1) 分子研国際インターンシッププログラム、(2) 分子研国際若手研究者招へいプログラム等の特長ある国際共同を推進しています。アジア各国および欧米の研究教育拠点等と学術交流協定を締結し、国際共同を重点化しています。



IMS has accepted many foreign scientists and hosted numerous international conferences since its establishment and is now widely recognized as a leading institute that promotes firm international collaborations. In 2013, IMS initiated a new program to further promote international collaboration. As a part of this new program, IMS has been promoting the IMS International Internship Program for Foreign Graduate Students and the IMS International Fellowship Program for Young Foreign Researchers, through several foreign nominating institutions and universities.

### 学術国際交流協定に基づく交流(12機関) International Exchange Agreements (12 organizations)

#### フランス

フランス国立パリ高等化学学校

#### France

École Nationale Supérieure de Chimie de Paris

#### ドイツ

ベルリン自由大学

#### Germany

Freie Universität Berlin

ペーター・グリュンベルグ研究所

Peter Grünberg Institute

マックス・プランク協会フリッツ・ハーバー研究所  
(物理化学領域)

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft

#### フィンランド

オウル大学

#### Finland

University of Oulu

#### タイ

タイ国立ナノテクノロジー研究センター

#### Thailand

National Nanotechnology Center, National Science and Technology Development Agency

#### インド

インド工科大学カーンプル校

#### India

Indian Institute of Technology Kanpur

#### 中国

固体表面物理化学国家重点実験室、廈門大学

#### China

State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces (PCOSS), Xiamen University

#### 台湾

中央研究院原子與分子科学研究所

#### Taiwan

Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica

国立陽明交通大学

National Yang Ming Chiao Tung University(NYCU), Taiwan

#### 韓国

韓国化学会物理化学ディビジョン

#### Korea

Physical Chemistry Division, Korean Chemical Society

成均館大学

Sungkyunkwan University

### 総研大の交流(5機関) Exchange Programs of SOKENDAI (5 Universities)

#### タイ

チュラロンコーン大学 理学部

#### Thailand

Chulalongkorn University / Faculty of Science

カセサート大学 理学部

Kasetsart University / Faculty of Science

ヴィダヤシリメディー科学技術大学院大学

Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)

#### マレーシア

マラヤ大学 理学部

#### Malaysia

University of Malaya / Faculty of Science

#### ドイツ

イエナ大学固体物理学研究所

#### Germany

Friedrich Schiller University Jena / Institute for Solid State Physics

# 充実した研究環境が育む分子科学の担い手

Excellent environment nurtures next generation of molecular scientists

人材育成・大学院教育

本研究所は、分子科学における最先端の研究を推進するだけではなく、学生の教育を行い、明日の分子科学を担っていく人材を育成することにも力を入れています。

## 総合研究大学院大学

SOKENDAI The Graduate University for Advanced Studies

分子科学研究所は、次代を担う若手研究者の育成にも積極的に取り組んでおり、大学や民間で活躍する多くの卒業生を輩出しています。

The graduate students of the Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) take molecular science classes, including chemical science, physical science, material science, and bioscience.



### 研究所で学ぶためには Admissions

分子科学研究所で学ぶためには、総合研究大学院大学へ入学していただくことになります。

\*すでに大学院に在籍している学生の方は「特別共同利用研究員」として分子研で学ぶことが出来ます。

If you wish to study at IMS, you need to apply for admission to SOKENDAI.



### 総合研究大学院大学とは? About SOKENDAI?

総合研究大学院大学(総研大)は昭和63年に、全国の大学共同利用機関を基盤機関として、新しい理念と組織の下に創設された学部を持たない大学院のみの大学です。本部を神奈川県葉山町に置き、学生のみならず研究者



自身の総合性と学際性を高めることを目指して、海外インターンシップ、学生セミナー、国際シンポジウム、共同研究等々のユニークな活動を本部で行いつつ、平素の授業や研究活動は各基盤研究機関において行っています。

SOKENDAI [The Graduate University for Advanced Studies] was founded on October 1, 1988 as one of the national universities of Japan. The headquarter is located in Shonan Village (Hayama-cho, Miura-gun) in Kanagawa Prefecture, Japan. Each department is housed in its parental institute.

### 出身者進路状況 Career after graduation



2021年12月現在 計274名 Total: 274 (updated in December 2021)

## 特別共同利用研究員

他の大学に所属している修士、博士の学生の方々を「特別共同利用研究員」として受け入れ、研究指導を行っています。全国から毎年20名程度の学生の方々が分子研に滞在し、研究に取り組んでいます。

受け入れ大学(過去10年)： 北海道大学、茨城大学、宇都宮大学、千葉大学、東京大学、東京工業大学、新潟大学、信州大学、静岡大学、名古屋大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、北陸先端科学技術大学院大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、愛媛大学、九州大学、名古屋市立大学、早稲田大学 他



# 広く社会に「科学の芽」を育む

Promoting widespread awareness of science in the society

社会との交流



## 分子科学フォーラム

### Molecular Science Forum

豊田理化学研究所との共催で"分子科学フォーラム"を年4回開催しています。国内外の著名な研究者を講師にお迎えし、分子科学をはじめとして様々な分野の研究をわかりやすく紹介して頂いています。

## 国研セミナー

### Knowledge Enhancement Workshop for Science Teachers

岡崎市の科学技術・理科教育振興事業の一環として、岡崎3研究所と岡崎南ロータリークラブとの協力事業の一つとして行われているセミナーです。岡崎市内の小・中学校の理科教員を対象として、岡崎3研究所の研究者が講師となって昭和60年から始まり、毎年行われています。

## 見学受入れ

### Campus Tour

研究所を多くの方に知って頂くため、見学の受入れを行っています。体験型展示室をはじめ、最先端の研究施設等を毎年たくさんの方に見学いただいています。2021年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、大規模な受入れは中止しましたが、オンライン見学も含め、少人数の見学者にお越しいただきました。



## メディアによる情報発信

### Public Relations

最新の研究成果や各種募集をホームページに掲載しています。また、分子研が発行している出版物についても、ホームページよりご覧いただけます。

<https://www.ims.ac.jp/>



## 出前授業

### Collaboration with Okazaki City Education Board

学校では普段体験できないことを体験してもらい、科学に対しての夢を持つてもらうために、主に岡崎市内の中学校を対象として、岡崎3研究所の研究者が講義・実験を行っています。

## スーパーサイエンスハイスクール

### Super Science Highschool

文部科学省が指定した科学技術・理科・数学教育を重点的に行う高等学校(スーパーサイエンスハイスクール)活動を、自然科学研究機構として支援しています。



## 一般公開

### Open Campus

研究所で行われている活動について、広く一般の方々に理解を深めていただくため、3年に1回一般公開を行っています。公開日(2024年度開催予定)は実験室の公開や講演会など様々なイベントを行います。

## ■自然科学研究機構 岡崎共通施設

## Common Facilities in Okazaki

### 岡崎情報図書館

#### Okazaki Library and Information Center

<http://www.lib.orion.ac.jp/>

岡崎情報図書館は、岡崎3研究所の図書、雑誌等を収集・整理・保存し、機構の職員、共同利用研究者等が利用できます。

#### [主な機能]

情報検索サービス  
Web of Science、  
SciFinder 等



In the Okazaki Library and Information Center, books and journals from three affiliated institutes (IMS, NIBB, NIPS) are collected, arranged, and stored for the convenient use of staff and visiting users.

#### [Available services]

◎ Online access to various journals and databases (Web of Science, SciFinder, etc) available.

### 岡崎コンファレンスセンター

#### Okazaki Conference Center

<http://www.orion.ac.jp/occ/>

学術の国際的及び国内的交流を図り、機構の研究、教育の進展に資するとともに、社会との連携、交流に寄与することを目的とした施設です。大隅ホール208名、中会議室112名、小会議室(2室)各50名の利用ができます。



The Okazaki Conference Center is a facility designed to promote international and domestic academic exchanges and contribute to the advancement of research and education in the three Okazaki institutes, as well as the promotion of social cooperation. An auditorium (Ohsumi Conference Hall), a middle room and two small rooms with seating capacities of 208, 112, and 50, respectively, are available.

### 岡崎共同利用研究者宿泊施設

#### Accommodation Facilities for Researchers

<http://www.occ.orion.ac.jp/lodge/>

日本全国及び世界各国の大学や研究機関から共同利用研究等のために訪れる研究者のための宿泊施設として共同利用研究者宿泊施設(三島ロッジ、明大寺ロッジ)があります。



For visiting researchers from universities and institutes within Japan and all over the world, we provide accommodations (Mishima Lodge and Myodaiji Lodge). Mishima Lodge is located in a quiet residential area about a ten-minute walk from each institute. Myodaiji Lodge is located on the same premise as the three institutes and is about a five-minute walk from each institute.

## 収支決算 Settlement of account

2021年度収支決算

収入		支出	
項目	金額(千円)	項目	金額(千円)
運営費交付金	2,289,408	人件費	1,010,976
施設整備費補助金	0	研究経費	561,273
補助金等収入 小計	37,177	共同利用経費	727,023
研究大学強化促進費補助金	33,366	教育研究支援経費	0
科学技術人材育成費補助金	0	一般管理費	4,442
先端研究設備整備費補助金	0	施設整備費	0
中小企業経営支援等対策費補助金	3,811	補助金等 小計	37,177
国立大学財務・経営センター施設費交付金	0	研究大学強化促進費補助金	33,366
自己収入	43,046	科学技術人材育成費補助金	0
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 小計	1,042,649	先端研究設備整備費補助金	0
産学連携等研究収入	938,897	中小企業経営支援等対策費補助金	3,811
寄附金	47,331	産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 小計	1,019,173
大学院教育経費収入	56,420	産学連携等研究費	927,079
目的積立金取崩額	0	寄附金事業費	35,673
科学研究費助成事業(直接経費)	391,720	大学院教育経費	56,420
収入合計	3,804,001	科学研究費助成事業(直接経費)	439,533
※千円未満の端数切捨てのため、小計・合計の値は各項目の合算値と一致しない場合がある。		支出合計	3,799,598

※千円未満の端数切捨てのため、小計・合計の値は各項目の合算値と一致しない場合がある。

2021年度外部資金獲得状況

項目	金額(千円)
科学研究費助成事業(直接経費)	508,495
共同研究費	40,380
受託研究費	859,124
研究費寄附金	31,394
合計	1,439,393

内訳詳細は「分子研リポート2021」を参照。

Settlement of account for FY2021 (unit of 1,000 JPY)

Income		Expenses	
item	amount	item	amount
Subsidies for Operating Expenses	2,289,408	Personnel	1,010,976
Equipment Development Subsidy	0	Research	561,273
Other Subsidies	37,177	Joint Research	727,023
Facility Grants	0	Supports for Education and Research	0
Self-Income	43,046	General Administration	4,442
Industry-Academia Collaboration Research and Donations	1,042,649	Facilities Expenses	0
Industry-Academia Collaboration Research	938,897	Other Subsidies	37,177
Donations	47,331	Industry-Academia Collaboration Research and Donations	1,019,173
Graduate School Income	56,420	Industry-Academia Collaboration Research	927,079
Reversal of Reserve for Specific Purposes	0	Donations	35,673
Grants-in-Aid Scientific Research "KAKENHI"**	391,720	Graduate School Expenses	56,420
total	3,804,001	Grants-in-Aid Scientific Research "KAKENHI"**	439,533
total		total	3,799,598

\*Direct Costs only.

Status of External Research funding for FY2021 (unit of 1,000 JPY)

item	amount
Grants-in-Aid Scientific Research "KAKENHI"**	508,495
Joint Research funds	40,380
Research grants	859,124
Research subsidies, donations, grants, etc.	31,394
total	1,439,393

\*\*Direct Costs only.

## 運営 (2022.5)

### ■顧問

研究所の研究、事業計画その他の管理運営に関して、所長の諮問に応じて助言等に当たります。外国人運営顧問に加えて、国内で運営顧問及び研究顧問を置いています。

#### [研究顧問]

北川 進 京都大学物質・細胞統合システム拠点拠点長、特別教授  
James M. Lisy  
Research Professor, University of Illinois Urbana-Champaign

#### [運営顧問]

菊池 昇 株式会社コンボン研究所代表取締役所長  
長我部 信行 株式会社日立製作所ライフ事業統括本部CSO  
瀧川 仁 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所協力研究員

#### [外国人運営顧問]

Matthias Weidemüller  
Vice-Rector, Ruprecht-Karls University Heidelberg  
David A Leigh  
Royal Society Research Professor & Sir Samuel Hall  
Chair of Chemistry, The University of Manchester

#### [産学連携研究アドバイザー]

菊池 昇 株式会社コンボン研究所代表取締役所長  
福田 伸 三井化学株式会社研究開発本部参与

### ■運営会議

研究教育職員の人事、共同利用・共同研究等研究所の運営に関する重要事項で、所長が必要と認めるものについて所長の諮問に応じます。

#### [運営会議委員]○…議長 ○…副議長

秋吉 一成 京都大学大学院工学研究科教授  
岩佐 義宏 東京大学大学院工学系研究科教授  
忍久保 洋 名古屋大学大学院工学研究科教授  
高橋 聰 東北大学多元物質科学研究所教授  
唯 美津木 名古屋大学大学院理学研究科教授  
芳賀 正明 中央大学理学部名誉教授  
福井 賢一 大阪大学大学院基礎工学研究科教授  
真船 文隆 東京大学大学院総合文化研究科教授  
○村越 敬 北海道大学大学院理学研究院教授  
吉澤 一成 九州大学先導物質化学研究所教授

○ 秋山 修志 協奏分子システム研究センター教授  
飯野 亮太 生命・錯体分子科学研究領域教授  
石崎 章仁 理論・計算分子科学研究領域教授  
江原 正博 理論・計算分子科学研究領域教授  
魚住 泰広 生命・錯体分子科学研究領域教授  
岡本 裕巳 メソスコピック計測研究センター教授  
解良 聰 光分子科学研究領域教授  
齊藤 真司 理論・計算分子科学研究領域教授  
山本 浩史 協奏分子システム研究センター教授  
横山 利彦 物質分子科学研究領域教授

運営会議に、次の人事選考部会及び共同研究専門委員会を置きます。

#### [人事選考部会]○…部会長

秋吉 一成(京大院教授) 飯野 亮太(分子研教授)  
芳賀 正明(中央大名誉教授) ○石崎 章仁(分子研教授)  
忍久保 洋(名大院教授) 秋山 修志(分子研教授)  
吉澤 一成(九大教授) 岡本 裕巳(分子研教授)  
福井 賢一(阪大院教授) 山本 浩史(分子研教授)

#### [共同研究専門委員会]○…委員長

高橋 聰(東北大教授) ○魚住 泰広(分子研教授)  
村越 敬(北大教授) 齊藤 真司(分子研教授)  
須藤 雄気(岡山大教授) 横山 利彦(分子研教授)  
深澤 愛子(京大教授) 古賀 信康(分子研准教授)  
唯 美津木(名大院教授) 榎山 儀恵(分子研准教授)  
大内 幸雄(東工大院教授) 岡崎 圭一(分子研准教授)

### ■学会等連絡会議

所長の要請に基づき学会その他の学術団体等分子科学コミュニティとの連絡、運営会議、研究施設運営委員会委員候補者等の推薦等に関することについて検討し、意見を述べます。

速水 真也(熊本大院教授) 吉村 一良(京大院教授)  
相田 美砂子(広大特任教授) 熊坂 崇(高輝度光科学研究センター  
蛋白質結晶解析推進室 室長)  
石谷 治(東工大院教授)  
辻 康之(京大名誉教授) 岩田 耕一(学習院大教授)  
小松崎 民樹(北大教授) 大島 康裕(東工大院教授)  
閔山 明(阪大院教授) 恩田 健(九大院教授)  
森 健彦(東工大院教授) 佐藤 啓文(京大院教授)

飯野 亮太(分子研教授)  
石崎 章仁(分子研教授)  
岡本 裕巳(分子研教授)  
解良 聰(分子研教授)  
小林 玄器(分子研准教授)

### ■教授会議

専任・兼任・併任・客員の教授及び准教授で構成し、研究及び運営に関する事項について所長を補佐します。

## 中期計画

文部科学大臣から提示された令和4年度から令和9年度までの第4期中期目標に対して、自然科学研究機構として第4期中期計画を立てました。分子科学研究所は研究者個人の自由な発想に基づく基礎学術研究を中心に据えた研究所です。研究の神髄は計画通りに行かない意外性にあります。そのため、分子科学研究を支えている種々の研究設備も、限定した目的のためのものではなく、学問の多様性に対応できるものになっています。以下は、このような背景で立案した分子科学の研究分野の中期計画(抜粋)です。分子科学分野において、計算科学手法の開発と活用、光を用いた先端的な研究手法や光源の開発、そして新規分子・物質の設計やそれらの高度集積化を通して、原子・分子・生命システムが示す多様な構造、物性、反応性、触媒能、エネルギー変換などの高次機能や動的構造を解明するとともに、新たな現象や有用な機能の設計と制御に取り組みます。先端的学術研究を次のような項目にわたって戦略的に推進します。

- ・機能性材料の物性評価と高度な電子状態理論による解析
- ・新規物性観測設備と先端的光源・分光法の開発
- ・凝縮相原子・分子系が示す量子力学現象、反応、物性及び秩序形成ダイナミクスの解明
- ・有機分子を基盤とした新しい反応システムや機能性デバイスの開拓
- ・分子システムの高次機能発現、作動原理、設計原理の探究

**Administration (2022.5)****■ Senior Scientific Advisors**

KITAGAWA, Susumu Distinguished Professor, Institute for Integrated Cell-Material Science (iCeMS)  
 James M. Lisy Research Professor, University of Illinois Urbana-Champaign

**■ Councillors**

KIKUCHI, Noboru Representative Directors, Genesis Research Institute, Inc.  
 OSAKABE, Nobuyuki CSO, Smart Life Business Management Division, Hitachi, Ltd.  
 TAKIGAWA, Masashi Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization

**■ Foreign Councillors**

Matthias Weidmüller Vice-Rector, Ruprecht-Karls University Heidelberg  
 David A Leigh Royal Society Research Professor & Sir Samuel Hall Chair of Chemistry, The University of Manchester


**■ Industry-Academia Collaboration Advisors**

KIKUCHI, Noboru Representative Directors, Genesis Research Institute, Inc.  
 FUKUDA, Shin Councilor, R&D Center, Mitsui Chemicals, Inc.



**■ Advisory Committee**

AKIYOSHI, Kazunari	Professor, Department of Polymer Chemistry, Kyoto University
IWASA, Yoshihiro	Professor, School of Engineering, The University of Tokyo
SHINOKUBO, Hiroshi	Professor, Graduate School of Engineering, Nagoya University
TAKAHASHI, Satoshi	Professor, Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University.
TADA, Mizuki	Professor, Graduate School of Science, Nagoya University
HAGA, Masaaki	Professor Emeritus, Faculty of Science and Engineering, Chuo University
FUKUI, Kenichi	Professor, Graduate School of Engineering Science, Osaka University
MAFUNE, Fumitaka	Professor, Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo
MURAKOSHI, Kei	Professor, Graduate School of Science, Hokkaido University
YOSHIZAWA, Kazunari	Professor, Institute for Materials Chemistry and Engineering, Kyushu University
AKIYAMA, Shuji	Professor, Institute for Molecular Science (Chair)
IINO, Ryota	Professor, Institute for Molecular Science
ISHIZAKI, Akihito	Professor, Institute for Molecular Science
EHARA, Masahiro	Professor, Institute for Molecular Science
UOZUMI, Yasuhiro	Professor, Institute for Molecular Science
OKAMOTO, Hiromi	Professor, Institute for Molecular Science
KERA, Satoshi	Professor, Institute for Molecular Science
SAITO, Shinji	Professor, Institute for Molecular Science
YAMAMOTO, Hiroshi	Professor, Institute for Molecular Science
YOKOYAMA, Toshihiko	Professor, Institute for Molecular Science

## 所内案内 Campus Map



## アクセス Access



### ■ 東京方面から

豊橋駅下車、名鉄(名古屋鉄道)に乗り換えて、東岡崎駅下車(豊橋→東岡崎間約20分)、南口より徒歩約7分。

### ■ 大阪方面から

名古屋駅下車、名鉄に乗り換えて、東岡崎駅下車(名鉄名古屋→東岡崎間約30分)、南口より徒歩約7分。

### ■ 中部国際空港から

名鉄空港線:中部国際空港駅から名古屋方面に乗り、神宮前で豊橋方面に乗り換え東岡崎で下車(中部国際空港→東岡崎間約60分)、南口より徒歩7分。

### ■ 自動車利用の場合

東名高速道路の岡崎ICを下りて国道1号線を名古屋方面に1.5km、市役所南東信号を左折。ICから約10分。

### From Tokyo

At Toyohashi Station, catch the Meitetsu train and get off at Higashi-Okazaki Station (approx. 20 min from Toyohashi to Higashi-Okazaki). Turn left at the ticket gate and walk south for approx. 7 min.

### From Osaka

At Meitetsu Nagoya Station, catch the Meitetsu train and get off at Higashi-Okazaki Station (approx. 30 min from Meitetsu Nagoya to Higashi-Okazaki). Turn left at the ticket gate and walk south for approx. 7 min.

### From Central Japan International Airport (Centrair)

Catch the Meitetsu train at Central Japan International Airport Station and get off at Higashi-Okazaki Station (approx. 60 min from the Central Japan International Airport Station to Higashi-Okazaki). Turn left at the ticket gate and walk south for approx. 7 min.

### By Car

Take the Okazaki Exit on the Tomei Highway. Approx. 1.5 km toward Nagoya, turn left at the City office S.E. turnoff (approx. 10 min from Okazaki Exit).